

法古錄



法古錄 地集

果部



大棗 杏仁

烏梅 白梅 梅實

柿乾 柿霜 柿蒂

梨

白菜

胡桃 殼皮 油胡桃

榧實

蓮子 石蓮 蓮房 鬚花

芡實

菱

桃仁 實 花 葉

栗 栗櫟

木瓜

枇杷葉

安石榴 皮 根 花

龍眼肉

海松子

荷葉 蒂

荸薺

甘蔗 白糖 沙糖

杏仁 實

陳皮 橘葉 橘核 橘實

山查

橄欖 核

枳椇子

荔枝 核 殼

落花生

藕 粉 莖 節

慈姑

甜瓜 瓜蒂

法古錄 果部目錄



西瓜

藜藿

柳子
藜藿皮殼



法古錄 果部

大棗 乾棗

本經治心腹邪氣安中養脾氣平胃氣通九竅助十二經補少氣少
 津液心身中不足大驚四肢重和百藥久服輕身延年 別錄曰補
 中益氣堅志強心除煩悶療心下懸除腸澼久服不饑 日華子曰
 潤心肺止嗽補五臟治虛損除腸胃癖氣和光粉燒治疳痢 李杲
 曰大棗氣味俱厚陽也溫以補不足甘以緩陰血故和陰陽調榮衛
 生津液 成無己曰邪在榮衛者辛甘以解之故用薑朮以和榮衛
 生發脾胃升騰之氣張仲景治奔豚用大棗滋脾土以平腎氣治水
 飲腸痛有十棗湯益土而勝水也 時珍曰素問言棗為脾之果脾
 病宜食之謂治病和藥東為脾經血分藥也若無故頓食則生虫損
 齒貽害多矣按王好古云中滿者勿食甘甘令人滿故張仲景建中



法古錄 果部 棗仁 桃仁 一

湯心下痞者。減錫朮。與甘草同例。此得用朮方矣。孟詵曰。小兒患
秋痢。與蛀糞食之。良之才曰。殺烏頭。附子。天雄。毒。大明曰。有齒
病。疳。病。蟲。蠱。人。不。宜。咬。朮。小。兒。尤。不。宜。食。又。忌。與。葱。同。食。令。人。五。臟
不。和。與。魚。同。食。令。人。腰。腹。痛。時。珍。曰。令。人。蒸。朮。多。用。糖。蜜。拌。過。久
食。最。損。脾。助。濕。熱。也。咬。朮。多。令。人。齒。黃。生。蟲。
生。秦。思。邈。曰。多。食。令。人。熱。渴。腦。脹。動。臟。腑。損。脾。元。助。濕。熱。
東。仁。別。錄。曰。治。腹。痛。邪。氣。孟。詵。曰。惡。氣。卒。疝。忤。道。士。陳。致。曰
常。服。東。仁。百。邪。不。復。干。也。

桃仁

呆曰。桃仁苦重於甘。氣薄味厚。沉而降。陰中之陽。手足厥陰經血分
藥也。苦以泄滯血。甘以生新血。故破凝血者用之。其功有四。治熱入
血室一也。泄腹中滯血二也。除皮膚血熱燥痒三也。行皮膚凝滯之

血四也 別錄曰止欬逆上氣消心下堅硬除卒暴擊血通月水止心
腹痛 元素曰治血結血閉血燥通潤大便破畜血 本經云去癥
瘕殺小蟲 孟詵曰殺三蟲 時珍曰主血滯風痺骨蒸肝癰寒熱
鬼疰疼痛產後血病 成無己曰肝者血之源血聚則肝氣燥肝若
急急食甘以緩之桃仁之甘以緩肝散血故張仲景抵當湯用之以
治傷寒畜血如狂小腹滿痛小便自利者又有當汗失汗熱毒深入
吐血及血結胸煩躁譫語者亦以此湯治之 時珍曰行血連皮尖生
用潤燥活血宜湯浸去皮尖炒黃用或麥麸同炒或燒存性各隨本
方獲仁者有毒不可食

桃實 思邈曰肺之果肺病宜食之 大明曰作脯食益顏色 詵曰

能發丹石毒生者尤損人 黃帝書曰食桃飽入水浴令人成淋及

寒熱病 時珍曰生桃多食令人膨脹及生癰瘡有損血益五果列

桃為下以此 瑞曰桃與蠶同食患心痛服术人忌食之

桃花 別錄曰除水氣破石淋利二便下三蟲 蘇恭曰消腫滿下

惡氣 時珍曰桃花性走泄下澤利大腸甚快用以治氣實人痢利

宿水痰飲積滯治風狂消腫滿大小便閉塞者則有功無害若久服

即耗人陰血損元氣豈能悅澤顏色耶

桃葉 時珍曰療傷寒時氣風痺無汗治頭風通大小便止霍亂腹

痛 別錄曰除尸蟲出瘡中小蟲 阮河南桃葉蒸法云連發汗汗

不出者死可蒸之如中風法燒地令熱去火以少水洒之布乾桃葉

于上厚二三寸安席葉上卧之溫覆得大汗被中傅粉極燥便瘥也

凡栢葉麥麩蚕沙皆可如此法用之

桃符 孟詵曰中惡精魅邪氣水煮汁服之 時珍曰典術云桃乃

西方之木五木之精仙木也味辛氣惡故能壓服邪氣制百鬼禮記



云王弼則巫祝以桃茆前引以辟不祥桃茆者桃枝作帚也博物志云桃根為印可以召鬼甄異傳云鬼但畏東南枝耳據此說則桃枝葉根核皆辟鬼崇產忤可信然也

杏仁

本經治欬逆上氣雷鳴喉痺下氣產乳金瘡寒心背豚 別錄曰驚癩心下煩熱風氣往來時行頭痛解肌消心下急滿痛殺狗毒之才曰解錫毒 元素曰杏仁氣薄味厚濁而沉墜降也陰也入手太陰經其用有三潤肺也消食積也散滯氣也故治肺熱治上焦風燥利胸膈氣逆潤大腸氣秘 甄權曰治腹痺不通發汗主濕病脚氣欬嗽上氣喘促 果曰杏仁散結潤燥除肺風熱欬嗽 杏仁下喘治氣也桃仁療狂治血也俱治大便秘當分氣血晝則便難陽氣也夜則便難陰血也故虛人便閉不可通泄脈浮者屬氣用杏仁陳皮



脉沉者属血用芫仁陳皮手陽明與手太陰為表裏膏門主往來
魄門主收閉為氣之通道故並用陳皮佐之 時珍曰杏仁能散能
降故解肌散風降氣行痰潤燥消積治傷損俱宜用之治瘡投毒用
其毒也 震亨曰杏仁性熱因寒者可用 思邈曰杏仁作湯如白
沫不解者食之令氣雍身熱湯經宿者動冷氣 聖景曰凡用杏仁
以湯浸去皮尖炒黃或用麩麩炒過 時珍曰治風寒肺病藥中亦
有連皮尖用者取其發散也 凡芫杏諸花皆五出若六出必芫仁
為其反常故有毒也 芫仁者殺人可以毒狗
杏實 思邈曰心之果心病宜食之曝脯食止渴去冷熱毒 別錄
曰生食多傷筋骨 頌曰杏之類梅者味酢類桃者味甘 宗奭曰
凡杏性皆熱小兒多食致瘡癰腸熱 高鵠曰多食動宿疾令人目
盲鬚眉落 源曰多食生痰熱昏精神產婦尤忌之

烏梅

本經下氣除熱煩滿安心止肢體痛偏枯不仁死肌去青黑痣餘
肉 別錄曰去痺利筋脉止下痢好唾口乾 藏器曰止渴調中去

痰治瘡癢止吐逆霍亂除冷熱痢 治虛勞骨蒸消酒毒令人得睡

和建茶乾薑為丸服止休息痢 時珍曰欬肺澀腸止久嗽瀉痢反

胃噎膈蛇厥吐利消腫涌痰殺虫解魚毒馬汗毒硫黃毒 好古曰

烏梅脾肺二經血分藥也能收肺氣治燥嗽肺欲收急食酸以收之

白梅 取大青梅以鹽汁漬之日晒夜漬十日成矣久乃上霜故曰

鹽梅霜梅 和景曰和藥點痣蝕惡肉生梅烏梅白梅功應相似

孟詵曰刺在肉中者爵傅之即出 日華子曰治刀箭傷止血研爛

傅之 江穎曰乳癰腫毒并爛貼之佳 蘇頌曰除痰 時珍曰治

中風驚癇喉痺痰厥僵仆牙關緊閉者取梅肉搗擦牙齦涎出即開

法古錄

果部

烏梅

栗

四



又治瀉痢煩渴霍亂吐下血血崩功同烏梅蓋烏梅白梅所主諸
病皆取其酸收之義惟張仲景治蛇厥烏梅丸及蟲匿方中用者取
蟲得酸即止之義稍有不同耳醫說治血痢久者梅肉研爛合臘
茶入醋一吸而安又惡瘡弩肉用烏梅燒研傳上一夜立盡
梅實 大明曰多食損齒傷筋蝕脾胃令人膈上痰熱服苗精人忌
食之食梅齒護者嚼胡桃肉解之時珍曰梅得木之全氣其味最
酸肝為木木瞻為甲木類相應也人之舌下有四竅兩竅通膽液故
食梅則津生故素問云味通於酸肝氣以津又云酸走筋筋病無多
食酸不然物之味酸者多何獨能生津耶

栗

思邈曰栗腎之果也腎病宜食之生食治腰脚不遂 宗奭曰栗之
補腎為其味鹹又滯其氣也 別錄曰益氣厚腸胃補腎氣令人耐

飢、菴恭曰療筋骨斷碎腫痛瘀血生嚼塗之有效 時珍曰栗於
五果屬水水潦之年則栗不熟類相應也有人內寒暴洩如注食煨
栗數十枚而愈腎主大便栗能通腎於此可驗 銑曰凡栗日中曝
乾食即下氣補益不瀉猶有木通氣不補益也火煨去汁亦殺水氣生
食則發氣若蒸炒熟食則壅氣凡患風水人不宜食味鹹生水也
宗奭曰小兒不可多食生則難化熟則滯氣膈食生蟲往之致病
栗楔 時珍曰一穗三顆其中扁者名栗楔 大明曰活血尤效每
日生食七枚破冷痲痺又生醫署惡刺出箭頭傳瘰癧腫毒痛

陳皮

本經治胸中痲熱逆氣利水殺久服去其下氣通神 別錄下氣止
嘔逆欬治氣衝胸中吐逆霍亂療脾不能消穀止洩除膀胱留熱傳
水起淋起利小便去寸白虫 權曰清痰涎治上氣欬嗽開胃去氣

痢破癥瘕痞癖 時珍曰療嘔噦反胃嘈雜時吐清水痰痞核瘡大
腸閉塞婦人乳癰入食料解魚腥毒 又曰橘皮苦能泄能燥辛能
散濕能和其治百病總是取其理氣燥濕之功同補藥則補同瀉藥
則瀉同升藥則升同降藥則降脾乃元氣之母肺乃攝氣之葉蓋故
橘皮為二經氣分之藥但隨所配而補瀉升降也 紫舌張氏云陳皮
枳殼利其氣而痰自下蓋此義也同杏仁治大腸氣悶同桃仁治大
腸血悶皆取其通滯也 早曰橘皮氣薄味厚陽中之陰也可升可
降為脾肺二經氣分藥留白則補脾胃去白則理肺氣同白朮則補
脾同甘草則補肺獨用則瀉肺損脾其體輕浮一能導胸中寒邪
二破滯氣三益脾胃加青皮減半用之去滯氣推陳致新但多用久
服能損元氣也 原曰橘皮能散能瀉能溫能補能化痰治嗽順
氣理中調脾快腸通五淋療酒病其功當在諸藥之上 好古曰橘

皮以色紅日久者為佳。故曰紅皮曰陳皮。去白者曰橘紅。蕪能除寒發表。理氣化痰。時珍曰：凡橘皮入和中理胃藥則留白，入下氣消痰藥則去白。治痰咳、童便浸晒，治痰積、薑汁炒，治下焦、鹽水炒，用核去皮炒。橘葉：震亨云：導胸膈逆氣入厥陰，行肝氣，消腫散毒，乳癰腸痛，用之行經。

橘核：大明治腎症腰痛，膀胱氣痛，腎冷炒研，溫酒服一錢，或酒煎服之。時珍曰：小腸疝氣及陰核腫痛，炒研五錢，酒煎服，或酒糊丸服。蓋橘核入足厥陰，與青皮同功，故治腰痛、瘡疝在下之病，不獨取象於核也。和劑局方治諸疝痛及內癢卵腫偏墜，或硬如石，或腫至潰，有橘核丸用之有效。

橘實：時珍曰：橘、柚、柑三者相類而不同。橘子小，其瓣味微酢，其皮薄而紅，味辛而苦。柚大于橘，其瓣味甘，其皮稍厚而黃，味辛而甘。柚大小皆如橙，甘瓣味酢，其皮最厚而黃，味甘而不甚辛，如此分之，即不

誤矣。藏器曰甘者潤肺，酸者聚痰。日華子云：止消渴，開胃除胸中膈氣。時珍曰：橘皮下氣消痰，其肉生痰，聚飲表裡之異如此。原曰：多食戀膈生痰，滯肺氣。如景曰：食之多痰，恐非並也。

青皮

時珍曰：青皮乃橘之未黃而青色者，治胸膈氣逆，脇痛，小腹疝痛，消乳腫，疏肝膽，瀉肺氣。又曰：青皮古無用者，至宋時醫家始用之。其色青，氣烈，味苦而辛，治之以醋，所謂肝欲散，急食辛以散之，以酸泄之以苦降之也。陳皮浮而升，入脾肺氣分；青皮沉而降，入肝膽氣分。一體二用，物理自然也。小兒消積，多用青皮，最能發汗，有汗者不可用。頌曰：氣滯下食，破積結及膈氣。元素曰：青橘皮氣味俱厚，沉而降，陰也。入厥陰少陽經，破堅癖，散滯氣，去下焦諸濕，治左脇肝經積氣。杲曰：青皮乃足厥陰引經之藥，能引食入太陰之倉，破滯劑。

堅皆治在下之病。有滯氣則破滯氣，無滯氣則損真氣。好古曰：陳皮治高，青皮治低，與枳殼治胸膈，枳實治心下同。息震亨曰：青皮乃肝膽二經氣分藥，故人多怒有滯氣，腸下有積，積或小腹疼痛，用之以疏通二經行其氣也。若二經實者，當先補而後用之。又云：疏肝氣，加青皮炒黑則入血分也。嘉謨曰：久瘧熱甚，必結癖塊，宜多服清脾湯，內有青皮疏利肝邪，則癖自不結也。醋炒用。

柿音士

白柿

柿霜

時珍曰：白柿即乾柿生霜者。其法用火抄去皮，捻扁，日晒夜露至乾，納瓮中，待生白霜，乃取出。今人謂之柿餅。亦曰柿花，其霜即柿霜。

柿乾 說曰：補虛勞不足，消腹中宿血，瀋中厚腸，健脾胃氣。大明

曰：開胃潤腸，消痰止渴，治吐血，潤心肺，療肺痿，心熱欬嗽，潤聲喉殺

虫。藏器曰：溫補多食去面黧。時珍曰：治反胃，咯血，淋腸，痔



漏下血 又曰柿乃脾肺血分之果也其味甘而氣平性濡而能收故有健脾澀腸治嗽止血之功柿霜乃其精液入肺病上焦葉尤佳劉掾云曾患臟毒下血以乾柿燒灰飲服而愈

柿霜 時珍曰清上焦心肺熱生津止渴化痰寧嗽治咽喉口舌瘡痛

柿蒂 時珍曰欬逆者氣自膈下冲脉直上至咽膈作呃或寒逆之聲也欬逆有傷寒吐下後及久病後產後老人虛人陰氣大虧陽氣暴逆自下焦逆至上焦而不能出者有傷寒失下及平人痰氣抑遏而然者當視其虛實陰陽或溫或補或泄熱或降氣或吐或下可也古方單用柿蒂煮汁飲之取其苦溫能降逆氣也濟生柿蒂散加以丁香生薑之辛熱以開痰散鬱蓋從治之法而昔人亦常用之收効矣

治呃逆用原個荔枝七個皮肉核殼俱全火煨透研末以柿蒂煎湯調服甚效