

夾斑

活幼心法大全卷五

明清江聶尚恒久吾父著

備用緊要諸症方論

痘有夾斑而出者。有紅赤點而無頭粒。多隨出而隨沒。又有夾丹而出者。紅赤成片如雲頭而突起。此皆毒火浮游散漫於皮膚之間也。遇此者不必驚惶。但用元參升麻湯一二劑。散其游火。其斑丹自退。

元參升麻湯

元參

去蘆

升麻

去散小根
各二錢

甘草

八分

防風

荆芥



南京中醫藥大學圖書館藏

夾麻

倒靨

在內不出為伏出而復入為陷膿時不起為倒陷膿脂不結亦為倒靨

表虛故痒

牛旁子

各六分

水煎溫服

有夾麻疹而出者。用前方加桔梗。酒炒黃岑。各六分。令其

疹先退。痘疹自當起發。

痘瘡初見一二日。細小四五日。漸大頂平。至六七日。脚

漸潤。頂愈平。陷其色全白。形如豆殼者。名曰倒靨。此氣

血大虛而漿不行也。宜用前參歸鹿茸湯。加官桂。白朮

川芎

各八分

南木香

四分

大便溏泄者。兼用參朮散。痘痒

者。表虛也。此為危症。宜用參芪實表湯。

參歸鹿茸湯



鹿茸酒塗炙去毛勿用酥蜜炙黃芪一錢五分當歸身酒洗

一錢炙甘草六分人參一錢二分官桂川芎白木分

五分南木香四分

參朮散

白朮用裏白無油去蘆刮去皮炒一兩人參白茯苓皮砂仁炙

草去蘆苡仁炒熟揀淨家蓮子去心炒真神曲炒山查肉各五

錢肉豆蔻麵裹煨熟去麵切細訶子煨去核廣陳皮洗淨

去筋膜晒南木香三錢以上共研極細末每用二錢各四錢

清米飲調食前溫服兒有不肯服者入稀粥內和服



亦可

參芪實表湯

與平和湯意亦相形

蜜炙黃芪

一錢五分

人參

一錢

炙甘草

官桂

防風

白芷

各八分

當歸

川芎

桔梗

厚朴

各六分

南木香

三分

生薑一片同煎溫服

一方外治痘痒用荆芥穗爲末紙裹緊搓糊貼紙頭令不散仍焙乾燈上燃之却於桌上敲去灰指定痒痘頭用荆芥火點痒處一下患者自以爲妙每痒痘悉點之立止



痘。痒。必。定。屬。虛。管。櫛。乃。謂。有。氣。盛。血。熱。而。痒。者。此。無。稽。謬。說。也。又。有。謂。因。血。上。行。氣。分。血。味。本。醎。醎。螫。皮。肉。作。癢。似。爲。近。理。然。灰。白。之。痘。不。惟。氣。虛。而。血。虛。亦。甚。矣。豈。能。上。行。而。醎。皮。肉。而。癢。塌。最。甚。則。此。說。亦。未。必。然。也。有。穢。氣。觸。犯。而。癢。者。急。燒。蒼。朮。紅。棗。或。黃。茶。葉。以。辟。之。甚。者。內。服。平。和。湯。

平和湯

人參

當歸

桔梗

白芍

紫蘇

黃芪

各四

防風

白芷

甘草

各三

官桂

沉香

檀香

乳

痘痛

香

藿香各二分生薑一片同煎溫服。

表虛之痘。膿漿不滿。多有癢者。其在幼兒。或兒雖長而神氣困者。必不能禁其手搔。須令其著舊軟絹衣。袖長者用絹條縛其袖口。令不得爪搔。爲妙。如無絹衣。或作軟絹袋。裹兒手。亦可。有一六歲女孩。其痘不正。膿漿淋漓。而癢甚。曾用此法。得不搔破。其後頭面亦無疤痕。若不用此法。而爪破已多。縱性命能保。惡疤決難免也。痘痛爲實。此爲吉兆。用生白芍爲細末。酒調下一錢五分。立止。甚者不過二服。

危症
頭面預腫者
亦危

肉脹

痘出齊後有面目腫脹而痘不脹者此血氣虛弱不能拘攝毒氣以成膿故其毒散漫妄行肉分也此為危候急宜大補氣血以收攝其毒則痘灌膿而腫脹自消矣

以參歸大補湯主之

參歸大補湯

與和平湯參芪實表湯相似 即實表湯去官桂加山查紫草

人參

當歸

蜜炙黃芪

各一錢二分

川芎

桔梗

山

查肉

炙甘草

各八分

防風

白芷

薑炒厚朴

紫

草茸

各六分

南木香

三分

生薑一片同煎溫服

痘出齊數日後其間有紫黑脹硬獨大而無根暈者痘

痘疔

痘癰 臭爛

疔也用四聖膏填入或拔毒散點之。

四聖膏

珍珠

碗豆

俱燒存性

亂髮灰

三灰等分

冰片

半分

用油胭脂點成膏先將金銀簪撥開疔口將藥填入瘡內即轉紅活。

拔毒散

雄黃

一錢研碎

胭脂濃浸水調點疔頭上即時紅活。

痘毒發於肌膚而氣血不能悉運化以成膿結痂則有鬱熱不散赤腫而成癰者其發於未收以前者少而發

發離



於既收以後者多。未收以前。必膿漿少而薄者有之。若
膿漿滿者。無有也。既收以後。必結痂浮薄而速結速落
者有之。若結痂厚實而緩結緩落者。無有也。此毒氣發
洩盡與不盡之明驗也。又有不虛而服補劑。不寒而服
熱劑。以致發癰者。醫之悞也。凡此俱大連翹飲主之。

大連翹飲

連翹

牛旁

製柴胡

去蘆

當歸

赤芍

防風

各八分

木通

車前子

荆芥

酒炒黃芩

酒炒山梔

滑石

甘草

蟬退

各五分

生薑一片

同煎大便秘者

內服大連翹
飲外刷三豆
漿

臭爛

加酒炒。大黃一錢五分。

但當其勿發熱發腫時。內外夾攻。急消散之。爲上。至於成膿。則幼小之兒。多難堪。而在頭項胸腹腰背者。甚險也。慎之。慎之外。治以三豆漿塗之。

三豆漿

黑豆

菉豆

赤小豆

各用一合。以酸醋

浸脹。搗研醲漿。時時以鵝翎刷之。紅腫退去。其效如神。又方用赤小豆爲細末。清水調敷。乾卽易之。

痘瘡原多潰爛。收結後。或手足等處。仍作熱臭爛。出膿水不止者。生肌散摻之。

生肌散

地骨皮

黃連

炒

黃栢

炒

五倍子

生甘草

等分

爲細末。乾摻之。卽熱退結痂而愈。其有仍作熱作膿而不卽愈者。內毒未淨也。仍用大連翹飲解之。

大連翹飲

連翹

牛旁

製

柴胡

去蘆

當歸

赤芍

防風

各八分

木通

車前子

荆芥

酒炒

黃芩

酒炒

山梔

滑石

甘草

各五分

蟬退

五分

生薑一片同煎大便秘

者加酒炒大黃一錢五分

又有餘毒流注各處。出清水者。綿繭散摻之。

綿繭散

出蛾綿繭。不拘多少。用生明礬末填在內。燒令成灰。爲末乾摻之。

衄血

惟有鼻衄可治。若他處出血者。危也。用寒涼必製。所以取效。而無害。

痘有鼻中衄血者。毒氣上衝於肺也。此其毒氣外洩。亦非惡候。不必驚惶。只用髮灰散。或清肺湯治之。切不可峻用寒涼。如犀角生地山梔生三黃之類。水伏其血。必爲大害。世人不諳此理。一遇痘瘡有衄血咽喉口舌等症。卽認爲實熱。遽投以寒涼水。凝血脈。以致痘瘡不得。

也。成膿而變爲壞症者多矣。是治末而防其本昧之甚者。

髮灰散

用少壯無病人亂髮不拘男女肥皂洗淨油垢氣又用溫湯洗淨肥皂氣焙乾量髮多少用新瓦罐一箇將髮填入內令滿淨瓦片蓋口鹽和泥封之又全封瓦罐晒乾用木炭火圍罐一半煨一炷香久取出候冷其灰成塊研令極細每用二錢童便七分酒三分調服立止輕者只用灰吹鼻亦止此方極妙不惟



可用之痘瘡凡諸血症皆可用

清肺湯

酒炒花粉

麥門冬

去心

天門冬

酒蒸

甘草

桔

梗

當歸

酒洗各五分

酒浸

生白芍

酒炒

片苓

酒洗

牡丹皮

蜜炒

知母

各四分

生薑

一片

同煎

一二服立

止

如有髮灰入一錢調服尤妙

痘有水疱無膿者血少不能化膿也急宜用參歸鹿茸

湯峻補其血

參歸鹿茸湯



口瘡

鹿茸酒塗炙去毛酥炙嫩綿黃芪蜜炙一錢五分當歸身洗
一錢炙草六分人參一錢二分生薑一片好龍眼肉三箇
五分同煎去渣入好酒一杯溫服

若膿疱與水疱相半者無大妨害如十分中有二三
膿疱者猶有生意惟渾身水疱全無膿漿則危矣然胃
氣好而飲食如常者亦可望生但其毒氣未散須防發
癰耳其或兒小痘多則血氣有限不能盡成膿漿而
水疱與膿疱相間此常理也若無他症不必施治
痘有口舌生瘡者或是熱毒或是虛火當以痘色辨之

痘症

八

切不可槩認爲實熱而純用寒涼解毒如痘色紅紫濁盛者熱毒也用清上飲主之如痘色淡白者虛火也用參麥清補湯主之外用赴筵散擦之

清上飲

薄荷

防風

甘草

各四分

白粉葛

牛旁

連翹

桔梗

酒炒

芩連

酒炒

花粉

麥門冬

各六分

生薑

一片同煎溫服

參麥清補湯

人參

八分

麥門冬

去心

酒蒸晒乾

白花粉

酒蒸晒乾

生黃芪



咽喉

各一錢 前胡 牛旁各五分 炙甘草 生甘草各三分 酒炒白

芍 生白芍各四分 當歸酒洗 紅花酒洗 大川芎 生

地黃酒洗各三分 桔梗 三分 山查肉 五分 生薑 一片 龍眼

肉三箇同煎溫服。

赴筵散

薄荷葉 黃栢 各等分爲細末入青黛少許和勻

搽之。

或口舌有痘而腫碍者痘靨自愈不必治治亦不效。

痘有咽喉腫痛者首尾俱用利咽解毒湯外用玉鎖匙