

草部

卷十七下

本草綱目草部第十七卷下

草之六

天雄 本經 下品

釋名 白幕

本經時珍曰天雄乃種附子而生出或變出其形長而不生子故曰天雄其長

而尖者謂之天錐象形也

集解

別錄曰天雄生少室山谷二月采根陰乾弘景曰今採用八月中旬天雄似附子細而長

乃至三四寸許此與烏頭附子三種本出建平故謂之三建今宜都恨山者最好謂為西建錢塘間者謂為東建氣力小弱不相似故曰西水猶勝東白也其用灰殺之時有水強者不佳恭曰天雄附子烏頭並以蜀道綿州龍州出者佳餘處縱有力弱不相似陶以三物俱出建平故名之者非也焉

頭苗名莖音斬爾雅云芟莖草是也今訛莖爲建遂以建平諱之矣承曰天雄諸說悉備但始種而不生附子側子經年獨長大者是也蜀人種之尤忌生此以爲不利如養蠶而成白殭之意時珍曰天雄有二種一種是蜀人種附子而生出長者或種附子而盡變成長者卽如種芋形狀不一之類一種是他處草烏頭之類自生成者故別錄註烏喙云長三十已上者爲天雄是也入藥須用蜀產曾經釀制者或云須重一兩半有象眼者乃佳餘見附子下

修治

敦曰宜炮炙去皮尖底用或陰制如附子法亦得大明曰凡丸散炮炙去皮用飲藥卽和皮

生使甚佳時珍曰熟用一法每十兩以酒浸七日掘土坑用炭半秤煨赤去火以醋二升沃之候乾乘熱入天雄在內小盆合一夜取出去臍用之

氣味辛溫有大毒

別錄曰甘大溫樞曰大熱宜乾薑制之之才曰遠志爲之使

惡腐如
忌或升

主治大風寒濕痺歷節痛拘攣緩急破積聚邪氣

金瘡強筋骨輕身健行

本經

療頭面風去來疼痛心

腹結聚關節重不能行步除骨間痛長陰氣強志

令人武勇力作不倦

別錄禹錫曰按淮南子云天雄雄雞志氣益注云取天雄

一枚納雄雞腸中

搗食之令人勇

治風痰冷痺軟脚毒風能止氣

端促急殺禽蟲毒

甄權

治一切風一切氣助陽道

水臙補腰膝益精明目通九竅利皮膚調血脈

肢不遂下胸膈水破疔癰癰結排膿止痛續骨

本草綱目卷之...

瘀血背脊僵痺霍亂轉筋發汗止陰汗。極含治疾。

痺明大

發明 宗奭曰補虛寒須用附子風家多用天雄亦取其大者以其尖角多熱性不肯就下故取其數散也（元素曰非天雄不能補上焦之陽虛震亨曰天雄烏頭氣壯形偉可為下部之佐時珍曰烏附天雄皆是補下焦命門陽虛之藥補下所以益上也若是上焦陽虛即屬心脾之分當用參芪不當用天雄也且烏附天雄之尖皆是向下生者其氣下行其臍乃向上生苗之處寇宗奭言其不肯就下張元素言其補上焦陽虛皆是誤認尖為上爾惟朱震亨以為下部之佐者得之而未發出此義雷斅炮炙論序云咳逆數數酒服熟雄謂以天雄炮研酒服一錢也

附方 新三建湯 治元陽素虛寒邪外攻手足厥冷大便滑數小便便白渾六脈沉微

除癩冷扶元氣及傷寒陰毒用烏頭附子天雄益
炮裂去皮臍等分咬咀每服四錢水二盞薑十五
片煎八分温服
肘後方 男子失精 天雄三兩炮白朮八兩桂
枝六兩龍骨三兩為散每
酒服半錢 張
仲景金匱要畧 大風惡癩 三月四月采天雄烏頭
漬細粒黑豆摩去皮不落者一夜取出晒乾又浸
如此七次初吞三枚漸加至六七枚禁房室猪魚
雞蒜犯
之即死

側子 別錄 下品

釋名 薊子 時珍曰生于附子之側
故名許慎說文作薊子

集解 弘景曰此附子邊角之大者削取之昔時不
用比來醫家以療脚氣多驗恭曰側子附子

皆是烏頭下旁出者以小者為側子大者為附子
今以附子角為側子理必不然若當陽以下江左

山南嵩高齊魯間附子時復有角如大豆許夔州
以上劍南所出者附子之角但如黍粟豈可克用
比來都下皆用細附子有効未嘗取角也保昇曰
今附子邊果有角如大棗核及櫛榔以來者形狀
自是一類且不小乃烏頭旁出附子附子旁出側
子甚明時珍曰側子乃附子旁粘連小者爾故吳
普陶弘景皆指為附子角之大者其又小子側子
者卽漏籃子矣故楊氏附子記言側子漏籃園人
皆不重之
以乞役夫

修治

子同附

氣味辛大熱有大毒

普曰補農岐伯有大毒
八月采畏惡與附子同

主治

癰腫風痺歷節腰脚疼冷寒熱鼠瘻又墮胎

別錄療

脚氣冷風濕痺大風筋骨攣急

甄權

冷酒調服治遍

身風癆神妙

雷敷

發明

機曰烏頭乃原生之腦得母之氣守而不移

輕揚宜其發散四肢克達皮毛為治風之藥天雄

長而尖其氣親上宜其補土焦之陽虛木鼈子則

餘氣所結其形催殘宜其不入湯服令人喪目也

時珍曰唐元希聲侍郎治癱瘓風有側子湯見外

臺秘要藥

多不錄

漏藍子

綱目

釋名木鼈子

炮炙論

虎掌

日華時珍曰此乃附子之

名南星之最小者名虎掌此物類之故亦同名大

明會典載四川成都府歲貢天雄二十對附子五

十對烏頭五十對漏

藍二十斤不知何用

氣味苦辛有毒數日服之令人喪目主治惡痢冷瀉瘡惡瘡

癘風時珍

發明時珍曰按楊士瀛直指方云凡漏瘡年久者復其元陽當用漏藍子輩加戒用之如不當

用而輕用之又恐熱氣乘虛變移結核而為害尤甚也又按類編云一人兩足生瘡臭潰難近夜宿五夫人祠下夢神授方用漏藍子一枚生研為末入臚粉少許井水調塗依法治之果愈蓋此物不堪服餌止宜入瘡科也

附方新一切惡痢雜下及休息痢百歲丸用漏藍子一箇大者阿膠木香黃連罌

粟殼各半兩俱炒焦存性入乳香少許為末糊丸梧子大每一歲一丸米飲下羅天益衛生寶鑑

烏頭本經校正併入拾遺

釋名烏喙之類自草烏頭綱目土附子綱目華奚毒本經耿

子吳普毒公吳普又金鴉綱目苗茗莨音良芫音及董音近獨

白草拾遺鴛鴦菊綱目汁煎名射罔普曰烏頭形如鳥

合如鳥之喙者名曰烏喙喙即鳥之口也恭曰烏

喙即鳥頭異名也此有三岐者然兩岐者少若鳥

頭兩岐名鳥喙則天雄附子之兩岐者復何以名

之時珍曰此即鳥頭之野生于他處者俗為之草

烏頭亦曰竹節烏頭出江北者曰淮烏頭日華子

所謂土附子者是也烏喙即偶生兩岐者今俗呼

為兩頭尖因形而名其實乃一物也附子天雄之

偶生兩岐者亦謂之烏喙功亦同于天雄非此鳥

頭也蘓恭不知此義故反疑之草烏頭取汁晒為

毒藥射禽獸故有射罔之稱後魏書言遼東塞外

秋收烏頭為毒藥射禽獸陳藏器所引續漢五行

本草綱目草部卷十七下

此鳥頭非川鳥頭也菊譜云鴛鴦菊卽鳥喙苗也

集解

別錄曰鳥頭鳥喙生朗陵山谷正月二月采陰乾長三寸以上者為天雄普曰正月始生

葉厚莖方中空葉四四相當與蒿相似宏景曰今
采用四月亦以八月采搗荖莖汁日煎為射罔獵
人以傅箭射禽獸十步卽倒中人亦死宜速解之
朗陵屬汝南郡大明曰土附子生去皮搗濾汁澄
清旋添晒乾取膏名為射罔以作毒箭時珍曰處
處有之根苗花實並與川鳥頭相同但此係野生
又無釀造之法其根外黑內白皺而枯燥為異爾
然毒則甚焉畏成式酉陽雜俎言雀芋狀如雀頭
置乾地反濕濕地反乾飛鳥觸之墮走獸遇之僵
似亦草鳥之類而毒更甚也又言建寧郡鳥勾山
有牧靡草鳥鵲誤食鳥喙中毒必急
食此草以解之牧靡不知何藥也

時珍曰草鳥頭或生用或炮用

或以鳥大豆同煮熱去其毒用

烏頭氣味辛温有大毒

神農本草經曰主大熱大毒

毒權曰苦辛大熱有大毒大明曰味苦辛熱有毒

之才曰莽草遠志為之使反半夏括樓貝母白歛

白芨惡藜蘆時珍曰伏丹砂砒石忌

鼓汁畏飴糖黑豆冷水能解其毒

風洗洗出汗除寒濕痺欬逆上氣破積聚寒熱其

汁煎之名射罔殺禽獸本經消胸上痰冷食不下心

腹冷痰臍間痛不可俛仰目中痛不可久視又墮

胎別錄主惡風憎寒冷痰包心腸腹疔痛疰癘氣塊

齒痛益陽事強志軒權治頭風喉痺癰腫疔毒時珍

烏喙一名兩頭尖氣味辛微温有大毒普日神農

本草綱目卷之六

黃帝有**毒權**曰**苦辛**
大熱畏惡同烏頭

主治風濕丈夫腎濕陰寒癢

寒熱歷節掣引腰痛不能行步癰腫膿結又墮胎

別錄男子腎氣衰弱陰汗癩癧歲月不消
甄權王大風

頑痺
時珍

射罔氣味苦有大毒
之才曰溫**大明**曰人中射罔
毒以其草藍汁小豆葉浮萍

冷水薺苳皆**主治**尸疰癥堅及頭中風痺
別錄癩瘡

瘡根結核癩癧毒腫及蛇咬先取塗肉四畔漸漸

近瘡習習逐病至骨瘡有熱膿及黃水塗之若無

膿水有生血及新傷破卽不可塗立殺人
藏器

發明

時珍曰草烏頭射罔乃至毒之藥非若川烏頭附子人所栽種加以礮制殺其毒性之比

自非風頑急疾不可輕投甄權藥性論言其益陽事治男子腎氣衰弱者未可遽然也此類止能搜風勝濕開頑痰治頑瘡以毒攻毒而已豈有川烏頭附子補右腎命門之功哉吾斷郝知府自負知醫因病風癱服草烏頭木鱉子藥過多甫入腹而麻痺遂至不救可不慎乎機曰烏喙形如鳥嘴其氣鋒銳宜其通經絡利關節尋蹊達徑而直抵病所並為射罔能殺禽獸非氣之鋒銳捷利能如是乎楊清叟曰凡風寒濕痺骨肉冷痛及損傷入骨年久發痛或一切陰疽腫毒並宜草烏頭南星等分少加肉桂為末薑汁熱酒調塗未破者能內消久潰者能去黑爛二藥性味辛烈能破惡塊逐寒熱遇冷即消遇熱即潰

附方

舊四新四十八

陰毒傷寒

生草烏頭為末以葱頭蘸藥納穀道中名提益散

王海藏陰 二便不通 即上方名 中風癱瘓 手足顫

證畧例 蹇瀆左經丸用草烏頭炮去皮四兩川烏頭炮去

皮二兩乳香沒藥各一兩為末生烏豆一升以斑

蝥三七箇去頭翅同煮豆熟去蝥取豆焙乾為末

和勻以醋麩糊丸梧子大每服三十九溫酒下

簡易 癱瘓頑風 骨節疼痛下元虛冷諸風痔漏下

方 尖各三錢硫黃麝香丁香各一錢木鱉子五箇為

末以熟蘄艾揉軟合成一處用鈔紙包裹燒熏病

處名雷丸 孫 諸風不遂 宋氏集驗方用生草烏

天仁集效方 生地龍搗和入少醋糊丸梧子大每服四五丸白

湯下甚妙勿多服恐麻人名鄂諸小金丹○經驗

濟世方用草烏頭四兩去皮大豆半升鹽一兩同

以沙瓶煮三伏時去豆將烏頭入木臼搗三百杵

作餅焙乾為末酒糊丸梧子大一切頑風 神應丹

每空 心益湯下十九名至寶丹 用生草

烏頭生天麻各洗等分搗爛絞汁傾盆中砌一小坑其下燒火將盆放坑上每日用竹片攪一次夜則露之晒至成膏作成小錠子每一錠分作三服用葱薑自然汁和好酒熱服 乾坤秘韞 一

切風證 不問頭風痛風黃鴨吊脚風痺生淮烏頭一斤生川烏頭一枚生附子一枚並為末

葱一斤薑一斤搗如泥和作餅子以草鋪盤內加

楮葉於上安餅於葉上又鋪草葉蓋之待出汗黃

一日夜乃晒之春為末以生薑取汁煮麩糊和九

梧子大初服三十九日二服服後身痺汗出即愈

避風 乾 破傷風病 壽域方用草烏頭為末每以

坤秘韞 一二分溫酒服之出汗 儒

門事 竊方用草烏尖白芷并生研末每服半錢冷

酒一盞入葱白一根同煎服少頃以葱白熱粥投

之汗出 年久麻痺 或歷節走氣疼痛不仁不拘男

即愈 為末以袋一箇盛豆腐半袋入烏末在內再將豆

腐填滿壓乾入鍋中煮一夜其藥即堅如石取出

晒乾為末每服五分冷風濕氣以生薑湯
下麻木不仁以葱白湯下之活人心統風濕痺

木黑神丸草烏頭連皮生研五靈脂等分為末六
月六日滴水丸彈子大四十歲以下分六服病

甚一丸作二服薄荷湯化風濕走痛黑弩前丸用
下覺微麻為度本事方兩頭尖五靈

脂各一兩乳香沒藥當歸三錢為末醋糊丸梧子
大每服十丸至三十九臨臥溫酒下忌油膩濕麩

孕婦勿服腰脚冷痛烏頭三箇去皮臍研末醋
瑞竹堂方調貼須臾痛止十便良

方膝風作痛草烏細辛防風等分為末摻靴襪中
及安護膝內能除風濕健步扶壽

方遠行脚腫草烏細辛防風等分為末摻鞋底內
如草鞋以水微濕摻之用之可行干

里甚妙脚氣掣痛或跨間有核生草烏頭大黃木
經驗驚子作末薑汁煎茶調貼之

又法草烏一味為末以薑汁濕滯足腫早輕晚重
或酒糟同搗貼之永類方用草烏頭

或酒糟同搗貼之永類方用草烏頭