

海陵叢刻
第十五種
陸完泉醫書



醫方歌括

養三軒學人陸脩辰編

中風尸厥痺歷節痿脚氣痙狂癲癰

桂枝湯 千金獨活湯

桂枝甘芍棗生薑却是風門鼻祖方不但祛風專走絡

隨經府藏細推詳

中經中府中藏藥中皆當加入本方以風從外入者究必驅從外出故

也

大桂枝心換

用心桂

方除棗生葛萆根

括萆根

獨活湯能治風

懿支彈

音安

曳

千金云中風大法有四一曰偏枯二曰風痺三曰風懿四曰風痺風懿



者奄忽不知人咽中塞窒然舌強不能言病在藏府先入陰後入陽
心脾邪入舌根強

大秦芎湯

大秦芎養血榮筋舌強支廢減參珍

無八珍湯

生地石膏

羌獨活防風白芷細辛芩內無便溺之阻隔外無形證
見六經方云養血筋自柔藥多風燥異哉聞

方下云治中風外無六經之形證內無便溺之阻隔知血弱不能養筋
故手足不能運動舌強不能言語養血而筋自柔

此與三化愈風

謂愈風湯非愈風丹

輩通眞子撰無姓名

三化湯愈風湯大秦芎湯皆出機要方中云是通眞子所撰不知其姓

名

八味順氣散 局方烏藥順氣散

八味順氣用異功

散

烏藥青皮白芷從方中白芷和營

衛嚴氏調氣不治風

嚴用和云人之元氣強壯營衛和平腠理緻密外邪焉能為害或因七

情飲食勞役致真氣先虛營衛空疎邪氣乘虛而入故致此疾若內因

七情而得者法當調氣不當治風外因六淫而得者亦當先調氣後依

所感六氣治之此良法也宜八味順氣散嘉言謂嚴氏此說於理甚當

烏藥順氣甘

草

陳

皮

芷

白

麻黃枳殼蠶

白

僵

薑

乾

芎藭

麻風注

風氣
攻注

實中絡此方載入局方中

金匱古今錄驗續命湯

千金小續命湯

易老麻黃續

命湯

桂枝續命湯

白虎續命湯

葛根續命湯

附



子續命湯 桂附續命湯 羌活連翹續命湯 千金八

風續命湯 大續命湯 西州續命湯

續命芍歸桂千金局方俱作桂枝乾薑參參人加麻杏石甘湯歸膏薑

去湯名小加附熟附黃芩芍二防已風薑棗煎治六經證

治中風外顯六經形證易老加法須推詳惡寒無汗麻黃防杏一

倍加來治太陽惡風有汗桂芍杏如前加亦治經方陽

明有汗身但熱不見惡寒去附子良却以石膏知母入

卽是風門白虎湯再不惡寒芩桂倍葛根加入亦相當

太陰無汗身涼者倍加附子草草甘益乾薑少陰有汗身

涼者附草亦倍桂枝雙中風六經混淆者繫之厥陰與

少陽肢體攣痛或麻木本方加味用翹羌醫貫則謂表



有餘直中風寒之的方保命集治厥陰痢厥逆

手足

沉遲

脈

用此湯續命原湯去麻

黃

芎杏仁獨活爲八風續命

湯加荆瀝

一作竹瀝

芩去參却有大有名中去荆瀝又西州

風痺之證可以投

千金云風痺者身無痛四肢不收志亂不甚言微知則可治甚則不能

言不可治

金匱黃芪桂枝五物湯

五物湯原治血痺

金匱本文云血痺陰陽俱微寸口關上微尺中小緊外證身體不仁如

風痺狀主之

小緊在尺微寸關

魏柏鄉曰診血痺之脈陰陽俱微陰營之診也陽衛之診也營衛之氣弱胃陽之素虛可知也微在寸口關上上氣不足更可知也營衛之氣根於胃陽胃陽根於腎陽尺中小緊腎陽亦非充裕矣中於營為血痺中於皮膚為風痺總不出胃陽虛而營衛弱之理也○喻云金匱言血既痺脈自微濇然或寸或關或尺其脈見小緊之處即風入之處也故鍼藥所施皆引風外出之法也

或主中風虛經絡偏廢神清出語難補衛黃芪起不用

益營桂

枝

芍棗薑參左歸

偏癢在左當歸

右薯

在右倍黃薯

下牛膝

加脚膝軟牛膝

筋瓜

筋軟難屈伸加木瓜

骨虎

骨軟難久立加虎骨

附能宣

經絡不宣加炮附子有寒亦加

防風通聖散

祛風至寶膏

防風通聖芥

荆芥

麻

黃

風

防風

桔

梗

膏

石膏

朮

白朮

滑

石

芍歸芍

芩翹梔薄

荷

黃

黃大

硝

硝芒

草

草七

涼

臍散

表裏由來治法通

故又

名雙

散解

二活

獨活

天麻人

參

與地

地熟

細辛全蠍柏

柏黃

連

連黃

從

卽是祛風至寶膏諸般風熱不相容

東垣升麻胃風湯

易老人參胃風湯

東垣却有胃風湯二麻

升麻

麻黃

不去節

白芷葛根蒼

朮

藁本

柴

胡

甘草

草豆蔻當歸黃柏蔓荊羌

活

此驅胃風從外

散能食便血不相當與夫久風成食泄風必驅之內散

良四君湯中去甘草四物湯中去地黃加以桂枝與粟

米人參胃風易老方

三化湯

三化小承

湯氣

羌活入專治便溺之阻隔關隘從來虛閉

多峻攻體要眞堅實

金匱侯氏黑散

侯氏黑散菊四十

分

白朮防風四之一八分桔梗細辛

三其餘藥俱三分式參

參人

苓

茯苓

薑

薑乾

桂

桂枝

與芎歸黃芩

牡蠣同礬石初服二旬溫酒調後宜冷食使藥積

魏云喻氏以爲中府必在胃中藏必在心乃臨時之外寇也內經所言

五藏之風及胃風皆平日之內賊也論列不同未有異旨謂言胃府心

藏之故胃足陽明也厥陰有邪必犯之心手少陰也少陽有邪必犯之

五藏六府惟足厥陰肝足少陽膽爲風木之在人身者內風旣盛必發

於肝膽外風相召必及於心胃此可徵信之理也况血虛於營脈絡空

虛其末也而肝藏所統之血未有不先虛而後脈絡方空虛者此血虛

之本也氣虛於衛腠理疎泄亦其末也而胃府所宗之陽未有不先虛而後護衛方疎泄者此氣虛之本也仲景出侯氏黑散一方爲風中經絡者言治而方中無非爲內虛召風立法可見外風非內風無能爲之引致內風之根源亦不外痰也火也氣結之痺也而三者又總不外乎裏虛而已

瀉青丸

瀉青龍膽並羌防梔子芎歸與大黃風入厥陰眞壯實

洞垣始可瀉東方

四白丹

四白牛黃

分五

二活

各二錢 羌活 獨活 半活

芎四君

上各五錢 參 苓 朮 草 以

香附縮砂

風

防風 各五錢 同上

辛

細辛 二錢

檀

檀白

藿

香 錢

薄

荷 錢

知

母 二錢

龍

腦

麝

香以上需用五分
喻氏減用二分

竹葉須甜白芷豐

白芷獨用一兩

就中龍麝

當裁減真氣休教耗散空

天麻丸

天麻牛膝酒同漬

二味各四兩用酒
同浸三日焙乾用

草薺元參羌

活以兩上
各四兩

俱四杜仲七兩

炒去絲

炮附一兩

十兩當歸一觔地

生地黃

羌活須用獨本者獨本即真獨活是

一方有獨活四兩去腎間風但用羌活之獨本者即真獨活不必更加

也

腎熱生風用此丸腎不陽虛風不據服藥半月覺塞壅

七宣丸藥能疎利

二丹丸



二丹丹砂與丹參熟地二冬天冬 麥冬草甘草茯神遠志菖蒲

參參人配合不須湯用愈風吞

喻云中風證心神一虛百骸無主風邪擾亂莫由驅之使出此方安神

益虛養血清熱熄風服之安睡功見一斑矣相傳用愈風湯吞下殊失

用方之意

千金地黃湯

千金地黃生地汁枸杞薑汁酥真荊竹瀝此外參人苓

荅扶與大黃梔子天冬為五末先將諸汁並煎成却調末

藥隨宜服漸加服以利為度以補虛清熱並除風滌痰潤燥通瘀

塞

養血豁痰難於兩用舉此方為例聽臨證酌量



近效白朮附子湯

近效朮

二兩

附子

一枚半

炮去皮臍

炙甘草

一兩

三味煎時加薑棗

片薑五

枚一

腎濁上攻並胃虛水土一煖濁陰掃

風挾腎中濁陰之氣厥逆上攻其頭間重眩之苦至難極耐兼胃氣亦

虛不知食味方中全不用風門藥但用附子煖水藏白朮甘草煖土藏

水土一煖則濁陰之氣盡趨於下治方之義可謂精矣

青州白丸子 三生飲

白丸白附

子二兩

半

夏水浸去衣

南星

二兩

又有川烏末

總生

錢生用

水粉細漂澄曬屢糯丸終是性猶溫

上藥羅爲末生絹袋盛於井水內擺出粉再播再擺以盡爲度用磁盆

日曬夜露每日一換新水攪而後澄春五夏三秋七冬十日去水曬乾

北京中醫藥大學圖書館藏

1964

以糯米粉作稀糊丸菴豆大每服二十九薑湯下癰瘰酒下小兒驚風薄荷湯下喻云此方治風痰之上藥也然藥性雖經製煉溫性猶存熱痰迷竅非所宜施

木香換半三生飲寒甚如虛重用參

生南星一兩生川烏生附子各五錢木香二錢每服一兩加入參一兩

煎

竹瀝湯

人竹瀝二升兌葛汁生薑汁用十之一開痰清熱並消風

安神自可頻頻服

搜風順氣丸

搜風郁李

仁

白檳榔獨活防風兔

子絲

大黃山藥麻仁

麻火

仁車前子膝牛膝枳殼羹調羊肚痛時嘗

方下云婦孕勿服又云如服藥覺藏府微痛以羊肚肺羹補之則藥有偏峻不可久服明矣惟風燥便閉暫用之以疎風潤燥順氣殊不可少

人參補氣湯

人參補氣用雙甘生甘草薯芋升麻柴胡五味子全手

指却為陽起處綢繆麻木非風端

諸陽起於指手指麻木風已見端急補其氣以禦外入之風用此為綢

繆計也

愈風丹與愈風湯不同

愈風丹內用三方通聖防風通聖散黃連解毒四物湯二活

天麻何首烏細辛薄荷甘菊治從陽



用三方各一料加餘藥七味爲末蜜丸彈子大每服一九清茶下喻云
外風與身中之火熱相合以陽從陽必上攻於頭故痛然風火盛營血
必虧故其藥如是也

薏苡仁湯

薏苡仁湯歸芍配蒼朮桂

官桂

麻

黃

甘草備風濕相搏治

痺痛汗減麻黃熱減桂

排風湯

排風獨

活

薛

白

薛

杏

仁

防風四君四物地參空肉桂麻

黃薑並入能宣冷濕藏之中

風虛冷濕邪氣入藏治法必先宣之使從外散

舒筋保安散



舒筋草 薜續斷 天麻 防風 烏藥 五靈脂 瓜木 葳靈仙 松

節歸 蓍 芍 牛膝 僵蠶 虎骨 加筋 脈拘攣 暨脚氣 酒浸焙

末調服 佳用浸藥之酒調下酒盡用米湯

勻氣散

勻氣 天麻 白芷 蘇紫 青皮 參人 瓜木 草甘 朮白 沉香 烏

藥

身中氣已通無塞外至之風不久居喎邪右急倍甘

草倍用生熟甘草 麥冬 萎薤 竹瀝 苡仁 並加諸

三聖散 稀涎散 還魂 奪命 正舌散 清心散

轉舌膏

三聖 玄胡索 歸肉 桂等分爲末 血虛 風入之顛劑 稀涎 半

夏猪牙 皂風 涎不下 開之妙 還魂 肉桂 杏仁 甘草 麻黃

