

景元刻本濟生拔粹

此
不
難
知
結
古
承
珍

五



索古家珍藥目錄 濟生拔粹卷第八

風論

小續命湯

大秦朮湯

三化湯

羌活愈風湯

四白丹

二丹丸

天麻丸

破傷風論

羌活防風湯

白朮防風湯

芎黃湯

大芎黃湯

羌活湯

防風湯

蜈蚣散

左龍丸

獨活湯

當歸地黃湯

白朮湯

江鰮丸

沒藥散

厲風論

凌霄散

傷寒論

麻黃湯

麻黃附子細辛湯

九味羌活湯

白朮湯

羌活散

石膏散

芍藥散

柴胡散

黃耆散

川芎湯

蒼朮白虎湯

桔梗湯

大神木湯

黃耆解肌湯

咳嗽論

水漿金花丸

小黃丸

白朮丸

玉粉丸

薑桂丸

金花丸

吐論

桔梗湯

木香散

厚朴丸

青鎮丸

白朮湯

金花丸

紫沉丸

木香白朮散

○執論

木香金鈴散

大黃散

牛黃散

牛黃膏

○瘡論

桂枝羌活湯

麻黃桂枝湯

桂枝黃芩湯

白芷湯

桂枝石膏湯

桂枝芍藥湯

雄黃散

麻黃黃芩湯

○眼論

散熱飲子

地黃湯

宣毒散

嚙藥

當歸湯

柴胡散



拈痛散

點眼藥

○衄血論

門冬飲子

五黃丸

生地黃湯

○消渴論

人參石膏湯

順氣散

茴香湯

化水丹

○瘡瘍論

內疎黃連湯

內托復煎散

當歸黃連湯

回瘡金銀花散

雄黃散

木香散

當歸散

乳香散

膏藥方

化堅湯

消毒散

接骨丹

巴戟湯

出箭頭方

濕淹瘡方

潔古家珍

方論與東垣機要內相同者於此不復重附所不同者附于此

風門

風者百病之始善行而數變行者動也風本爲熱熱勝則風動宜以靜勝其躁養血是也治須少汗亦宜少下多汗則虛其衛多下則損其榮治其在經雖有汗下之戒而有中藏中府之分中府者宜汗之中藏者宜下之此雖合汗下亦不可過也汗多則止陽下多則止陰止陽則損其氣止陰則損其形初謂表裏不和須汗下之表裏已和是宜治之在經也其中府者面顯五色有表證而脉浮惡風惡寒拘急不仁或中身之後或中身之前或中身之側皆曰中府也其治多易中藏者唇吻不收舌不轉而失音鼻不聞香臭耳聾而眼瞽大小便秘結皆曰中藏也

中藏之病難治也六府不和留結爲癰五藏不和九竅不通無此乃在經也初證既定宜以大藥養之當順時令而調陰陽安藏府而和榮衛少有不愈者也風中府者先以加減續命湯隨證發其表如兼中藏則大便多秘泄宜以三化湯通其滯初證已定別無他變以大藥和治之大抵中府者多著四肢中藏者多滯九竅雖中府者多兼中藏之證至於舌強失音久服大藥能自愈也有中風濕者夏月多有之其證身重如山不能轉側宜除風勝濕去熱之藥如不可用鍼灸治之

續命湯治八風五痺痿厥等疾以一歲爲摠六經爲別春夏加石膏知母黃芩秋冬加桂附芍藥六經細分加減方在發明內附

大秦湯

方在發明內

三化湯

方在發明內

羌活愈風湯

方在發明內

四白丹

方在寶鑑內

二丹丸

方在寶鑑內

天麻丸

行榮衛壯筋骨方在元戎方中

如風癰病不能愈者吐論後厚朴丸治之

如中風自汗昏冒發熱不惡風寒不能安卧此是風熱煩瀉

青丸主之

如小便不利不可以藥利之既以自汗則津液外亡小便自

少若利之使榮衛枯竭無以制火煩熱愈甚當俟熱退汗止

小便自行也

破傷風



羌活防風湯 方在機要中

白朮防風湯 芎藭湯 大芎黃湯 羌活湯 防風湯

蜈蚣散 左龍丸 獨活湯 又名羌活湯

當歸地黃湯 已上數方皆在機要中

白朮湯 治破傷風大汗不止筋攣搐搦

白朮 葛根 芍藥 各壹兩 升麻 黃芩 各伍分

甘草 式分半

右咬咀每服一兩水煎服無時

江鰮丸 治破傷風驚而發搐藏府秘澁知病在裏可用下之

江鰮 劉炒 野鴿糞 炒 白殭蚕 各半兩 雄黃 壹兩

蜈蚣 一對 天麻 壹兩

右為細末分作三分二分用燒飯為丸桐子大朱砂為衣一



分入巴豆霜一錢半亦以燒飯為丸桐子大每服朱衣丸二
十九加巴豆霜丸一九第二服二九加至利為度再服朱衣丸
病愈止

沒藥散 治刀箭傷止血定痛

定粉 壹兩 風化大灰 壹兩

枯白礬 叁分另研

沒藥 另研 乳香 另研各壹分

各研為細末和勻搽上

厲風論

此疾非止肺藏有之以其病發於鼻從俗呼為肺風也鼻準腫
赤脹大而為瘡乃隘隨氣化也氣既不施則血為之聚血既以
聚則使肉爛而生虫也生虫者厥陰主之以藥緩疎之煎局方
升麻湯下瀉青丸余病各隨經治之



陵膏散治癘風

蟬殼

地龍炒

白殭蚕

全蝎各半

凌霄花

半兩

右為極細末每服一錢酒調下於浴室內常在湯中住一時

許服藥效

傷寒論

治傷寒之法并諸方加減如

芍藥湯

麻黃湯

麻黃附子細辛湯

白朮湯

羌活散

九味羌活湯

石膏散

柴胡散

黃耆湯

川芎湯

并論

蒼朮白虎湯

桔梗湯

大神木湯

已上數方皆在難知內

黃耆解肌散

治婦人妊娠傷風自汗

人參

黃耆

當歸

川芎

炙甘草各伍

芍藥

陸氏

加蒼朮生地黃亦可



右為薤末每服五錢水煎溫服無時

咳嗽論

秋傷於濕冬必咳嗽大抵素秋之氣宜清而肅反動之則氣必上衛而為咳甚而動於脾濕發而為痰也其有痰也寒少而熱多假令濕在肝經謂之風痰濕在心經謂之熱痰濕在脾經謂之濕痰濕在肺經謂之氣痰濕在腎經謂之寒痰宜隨證而治之咳而無痰者以辛甘潤其肺咳而嗽者治痰為先故從南星半夏勝其痰而咳嗽自愈也

水菰金花丸治風痰咳嗽其脉弦面青四肢滿悶便溺秘澁心多躁怒局方川芎防風丸亦可

南星

壹兩生用

半夏

壹兩生用

天麻

五錢

雄黃

貳錢

白麝

叁兩

右為細末滴水為丸每服五十丸至百丸先煎漿水沸下藥

煮令浮為度攤出淡漿水浸另用生姜湯下

小黃丸治熱痰咳嗽其脉洪而面赤煩熱心痛唇口乾燥多喜笑

南星湯洗壹兩半夏湯洗壹兩黃芩壹兩

右為細末姜汁浸餗餅為丸桐子大每服五七十丸生姜湯

下食後小柴胡湯加半夏亦可

白朮丸治痰濕咳嗽脉緩面黃肢體沉重嗜卧不收腹脹而食

不消局方中防已丸亦可

南星湯洗半夏湯洗各壹兩 白朮壹兩半

右為細末湯浸餗餅為丸如桐子大每服五七十丸生姜湯

下食後

玉粉丸治氣痰咳嗽脉澁面白氣上喘促洒淅寒熱悲愁不樂

南星湯洗半夏湯洗各壹兩 橘皮去白貳兩

右爲細末湯浸餛餅爲丸桐子大每服二十九人參生姜湯下食後局方中桔梗湯亦可

姜桂九 治寒痰咳嗽脉沉面色黧黑小便急痛足寒而逆心多恐怖

南星洗

半夏

洗各壹兩

官桂

壹兩去麋皮

右爲細末餛餅爲丸桐子大每服三五十丸生姜湯下食後局方中胡椒理中丸仲景吳茱萸湯亦可

如心下痞悶者加枳實五錢

如身熱甚者加黃連五錢

如體重加茯苓白朮各一兩

如氣逆上者加苦葶藶五錢

如氣促者加人參桔梗各五錢



如浮腫加郁李仁杏仁各五錢

如大便秘加大黃五錢

如痰而能食者大承氣湯微下之

如痰而不能食者厚朴湯主之

夏月嗽而發寒熱者謂熱嗽

小柴胡湯三兩

加石膏柒分

知母叁分

冬月嗽而發寒熱者謂之寒嗽

小青龍湯加杏仁

水薤金花丸治有痰而泄痢不止甚則嘔而欲吐利下而不能

食由風痰羈絆脾胃之間

半夏

壹兩洗

天南星

壹兩洗

天麻

半兩

寒水石

燒存性壹兩

雄黃

二錢半

白麵

陸兩

。一方改寒水石爲輕粉少許



右為末滴水為丸桐子大每服百丸先沸漿水內下藥煮令
浮為度漉出生姜湯下食前

吐論

吐論并

桔梗湯

木香散

厚朴丸

具在機要中

青蘗丸

治上焦吐頭發痛而有汗脉弦

柴胡

壹兩

黃芩

柒分

甘草

五分

半夏

壹兩

半洗

青黛

貳分

人參

五分

白朮湯

治胃中虛損及痰吐者

半夏

兩半

白朮

壹分

檳榔

貳分

木香

炙甘草

各壹分

茯苓

貳分

右為末每服二錢生姜湯調下食前



金花丸

治吐食而脉弦者由肝乘於脾而吐乃由脾胃之虛宜

治風安脾

半夏

洗壹兩

檳榔

貳分

雄黃

壹分

右爲末薑汁浸餗餅爲丸桐子大生薑湯下小兒另丸

紫沉丸

治中焦吐食由食積與寒氣相假故吐而痛

半夏

壹兩

代赭石

叁分

縮砂仁

貳分

烏梅

去核壹分

杏仁

去皮尖壹分

丁香

檳榔

各貳分

沉香

壹分

木香

壹分

白朮

各壹分

橘皮

伍分

肉苳蔻

壹分

巴豆霜

各半分

右爲末入巴豆霜令勻醋糊爲丸桐子大每服三十丸食後

生薑湯下

木香白朮散

治嘔而吐食謂特實繫強是以腹中痛當和之又

名丁香半夏湯

