

孫
醫
學
叢
書
傷寒雜病論章句

冊
二

傷寒雜病論章句卷三

湘潭孫鼎宜撰

【大陰病】

朱云足大陰脾經桂枝布于脾胃絡于嗌喉○喻云篇中言

是引伸觸類之妙可見治法總不出三陽外但清其風寒之原以定
解肌發汗更于腹滿腹痛辨其虛實以定當汗則其氣
陽經數證以當注家不知以爲脫誤由不清當汗故耳

【大陰病提綱并誤下之禁一章】

大陰之爲病

共五腹滿○布胃中邪氣壅故而吐○盛于上食不下○三威

于中○程應旄曰陽邪亦有腹滿但張吐爲寒格也而食自利益甚○四

寒源三作下○脈經七時腹自痛○五虛○擬治中湯喻云上下交亂胃中

下利腹痛但得非利則積畜者之下常痛而不得腹以諸痛則利爲實從而利痛之○寒

腹經七時○若下之并脈經無此句必匈下堅結同于否之濡輒成云不

此病發于陰而反下之因作否者黃仲理云宜治中湯陰中少有用

桂枝者如桂證若脈浮即用桂枝微汗之若惡寒甚者非治中四逆

不可常云可桂枝加附子湯按此章不見表證桂枝不可下結堅增損治中丸
傷寒雜病論章句 卷三 大陰病 中華書局聚

○病源
作結堅

右一章二節首大陰定證

陳云皆寒溼為病

次誤下變證

【論下利之由二章】

問曰水流夜疾何以故師曰土休故流疾而有聲

此設喻也雖曰夜靜不比晝喧

亦由水屬陰勝則其氣自王也

人亦應之人夜臥則脾不動搖

傷食多此脈為之

數疾也

此謂大谿數脈也○據脈經六補

右明土休則水王以成下利之理

即少陰義

〔傷寒四五日〕

〔出厥陰編之失後從柯改隸此柯云是〕

腹中痛

此即

兼太陽病茯苓甘草證所謂水漬入胃故

腹痛也喻云多屬虛寒與腹中實滿不同

若轉氣下趨少腹者

轉氣

篇疊見即矢氣也注家多以走腸間歷其已出言但陽明轉氣為實

為燥矢三陰轉氣為虛為水走腸間歷其已出聲張璐曰腹痛亦有屬

為欲自利也

擬治中或茯苓甘草

火者其痛必自下而上若自拘而為欲自利也湯喻云謂其因腹下寒

下則為寒痛無疑按此必拘而為欲自利也湯喻云謂其因腹下寒

而非致下利明眼見此字欲字可見○千金魏荔形曰此重來趨小腹為

利欲也

右明寒溼自利之由語統三陰言發端于此

【論欲愈之狀一章】

〔大陰中風〕

該傷寒言省

四厥煩疼

煩者熱也即手足自溫互詞疼者風寒搏擊使然病入三陰通以陽長為

吉此煩熱為陽長也成云大陰脾也主營四厥煩疼也柯云是

脈陽微陰濇而長者

謂其脈由微濇而轉長也邪氣已去正氣雖衰然漸欲復非謂一時並見要知微濇之脈自不

得兼見長脈也喻云微濇之中更察其脈之長而短知元氣未漓

柯云濇與長不能並見濇是病脈而轉長病始愈耳風脈本浮今

而微知風邪當去濇則氣血少而今而為四厥煩疼之陽故為欲愈也○陰

轉而為長之陽由腹痛之陰轉而為四厥煩疼之陽故為欲愈也○陰

以概其餘

【論愈有定時一章】

〔大陰病〕欲解時從亥盡丑上

成云脾為陰土王于亥子丑故欲愈

曰合夜至雞鳴天之陰陰中之陰也脾為陰中之至陰故主亥子丑

傷寒雜病論章句 卷二 大陰病 一一中華書局聚

【四逆輩證一章】

自利不渴者出必大陰○三陰自利言多軌不範注其少陰者兼有陽渴熱入下

焦利也亦此必自利有渴不證若寒少陰中之焦渴也屬按此言大陰寒引水故不救與三大陽

口之渴則大陰涇矣陳云爲利不渴不以不渴而一證也凡爲利則寒熱液下之注金針

〔屬大陰〕自利在大陰篇爲寒在中焦屬大陰也。喻云：此仲景分經辨

證所關以其臧有寒〔故〕也徐云明彤所以自不利二字故柯未經誤

汗誤吐而成者故當溫之宜四逆輩徐云有寒不則不渴逆可湯而知渴者皆

方逆輩者凡載溫于熱之齊故有可某選某用輩之輩可猶言自也據此及知王仲洙以原方書散載是

于少二證之陰藥遂失其規模矣余今以三陰司屬臧寒而臧惟溫

不覺其治相固嘗謂三陰中無自相兼病非無兼病也其氣相通兼之者擬治中湯喻氏說

右言大陰虛寒之病即同于厥少二陰之治舉自利不渴宜

四逆輩以例其餘

【少陰病】

朱云足少陰腎脈起于足小指之下斜趣足心別行者入

入肺中
繫舌本

【少陰病提綱二章】

少陰之爲病脈微細

喻云與三陽之浮大迥殊程應旂曰凡陰脈皆

之反少陽脈弦細者弦之

【但欲寐也】氣行寢非竟成寢之詞成云衛

少陰則氣行于陰不復行于陽故但欲寢也柯云衛氣日行陽二十

五度常從足少陰之間分行于臍府今少陰病則入陽分多故欲寐欲

寢是病人意中非實能寢也少

陰提綱各臻其妙○因下章省

【少陰病】欲吐而不吐

陽喜○柯云與少

心煩二○柯云以上少陰經出絡

之徵林瀾曰以上

但欲寐

五六日

而渴五六日證爲後來之病自利

自利

傷寒雜病論章句

卷三

少陰病

二中華書局聚

四而渴者

飲五○非謂大渴即下文引水自救之意成云經云下利裏

舌乾不可引水自救

喻云自利而渴邪加形悉具屬少陰也陰篇省虛故

引水自救

林瀾曰此渴與口燥舌乾之邪氣所在其氣必虛非謂當補

病寒熱都小

便必赤熱今有之證若少陰熱則小○若小便色白者或六○白如米湯皆

是以見不可誤認

為熱道熱輕用寒少陰病形悉具也以上六證是悉具

虛實都有此六證

言虛則實知有實者矣言小便白為小便白者以

下焦虛寒

林瀾曰白下焦必者以見陰盛于下柯云少陰主水熱則黃

不能制洩故

令色白也湯程小應白之義常云可逆湯甘草乾薑

欲寐來渴證不盡屬少陰

故指無出小便白來結以下焦虛有寒示人

以病在上而治在下也

蓋陰上焦無陰以濟由下焦無陽以溫也二虛

證小寒字不得來又曰吐利而渴與猪苓證同彼曰以有熱小

便必不利而色赤飲水與白頭翁證同其別但在欲寐且猪苓

讀不如製造之制洩即小

便也方制

右二章言少陰病定脈定證末節反覆申明小便色白之為

寒俾人不致誤認煩渴為熱

沈明宗曰此少陰虛寒似熱證之辨

【論大谿脈一章】

少陰脈

此大谿脈也。自大谿脈而大谿脈遂隱存者，尺少腎之說行弱而瀦。亦相微細之謂脈象。

分弱者微煩

則成云煩者熱也。弱為虛陰虛瀦者厥逆瀦成云瀦者不能與陽相。

順接故厥逆也
○出平脈篇

右申言大谿定脈定證

程知言病腎脈微瀦之言

【論厥之形狀一章】

凡厥者

出厥陰編之失後今改置此以少陰陰陽氣不相順接。徐致

由厥之

便為厥

三陽相逆于手十指逆足湯按三陰陽相逆于手十指

陽氣內陷不與陰氣相逆順接。陳平伯云喻此條推由脾致厥之故

用凡字

冠首統三陰如環無端若寒厥言也。此陽受氣于四厥順接熱逆冷

陰不與陽相順接也。或曰壅遏不與陽相順接。當四厥順接熱逆冷

非陰與陽不相順接之謂乎。改稱平伯注謂以外達于四厥亦為厥者手足

逆冷是也

而逆冷猶云倒冷。凡人身冷也。徐云此身而及四厥今由指頭

傷寒雜病論章句 卷二 少陰病 四 中華書局聚

珍倣宋版印

寸爲陽尺爲陰
寸爲陽尺爲陰
寸爲陽尺爲陰
寸爲陽尺爲陰
寸爲陽尺爲陰
寸爲陽尺爲陰
寸爲陽尺爲陰
寸爲陽尺爲陰
寸爲陽尺爲陰
寸爲陽尺爲陰

故具
愈才

脾一
胃○
病吳
不云
當下
見利
弦脾
故胃
曰病
反弦
○肝
千脈
金也

則陽
弦兩

文卽
尤下
云利
傷自
寒愈
邪互

者氣
死得

熱下利也仲景云下利手足不冷反發熱者不死謂傷寒陰邪內入之證也二不可不分

下利 ○出厥陰文金匱在下利句十七有微熱氣成云裏而渴者尤云邪氣衰成云論云諸弱發熱陽氣得復也程林曰下利大熱

而渴則偏于陽無熱而渴則偏於陰皆不能愈也程林曰下利大熱

知邪氣去利自愈脈弱則陽邪已退證可知故不治自愈陽邪未盡利脈若

文按此乃寒利不必服白頭翁也乃渴欲飲水者愈之互

少陰病 脈緊者一○成云是少陰實證又有手足微冷厥意是在內陰虛

後下文反溫二字可知其至七八日陰盡陽復之柯云自下利已極前此

寒氣得利可知成云脈暴微見三通通四逆心煩之微為吉兆故為欲解也

唐云發寒氣凝結而回氣復此則脈變微是微和而欲愈者當參攷以得之

微則非通柯云少陰之本證成云陽氣復柯云脈緊反去者微寒亦去可知柯云

利去 ○手足反溫前此已冷可知脈緊反去者微寒亦去可知柯云

緊去微見所謂穀氣為欲解也 ○雖煩句下利文蒙上必自愈煩則

之來也微徐而和矣為欲解也 ○雖煩句下利文蒙上必自愈煩則

傷寒雜病論章句 卷三 少陰病 五 中華書局聚

煩躁者逆此正勝也按此與死證內吐利煩躁四逆者死自是不同
柯云煩利少陰本證煩則陽已反于中宮溫則陽已數于四末陰平
勿藥秘故下利自止喻云邪解陽回可

右四章通以陽回為自愈憑脉與證言

〔下利〕

〔出厥陰金匱在下〕脈沈而遲一〇三面色少赤二〇即下文戴
利〇因下文省脈沈而遲一〇三面色少赤二〇即下文戴

也三陰身有微熱三〇微熱非謂發熱不下利四清穀者五〇皆因
本證過由身冷而回溫耳

迫陽必鬱冒汗出而解鬱冒者作汗之微與汗出此候必汗出而其人
外陽必鬱冒汗出而解鬱冒者作汗之微與汗出此候必汗出而其人

必微厥雖解必猶有少許未退厥本原有一〇所以然者其面戴陽
證此與陰病見陽復見陰者不同

謂面赤與妊娠下虛則下虛空故也達陽氣虛空不能宣
發熱名同證別下虛則下虛空故也達陽氣虛空不能宣

右一章二節首言陰病見陽有鬱冒作汗解者次釋其理

脈陰陽俱緊

陰陽以尺寸言成至于吐利吐上兼病其脈獨不解證病
云寒邪甚于上下

已解可知不成云緊△緊去人安人安則脈與此為欲解吐利自止其
脈不罷為不解也

人可安此据〇若脈遲謂吐利後易解矣此為欲解吐利自止其
脈辨證法

至六七日不欲食欲胃有停飲未能利速進耳故下利後脾胃大虛中寒冷因
欲胃有停飲未能利速進耳故下利後脾胃大虛中寒冷因

水氣
而然
此為晚發水停故也為未解明擬玄武湯顧云小青龙湯非也晚
發猶復病也廣雅釋詁四晚後也是即差後之病成云晚發者後來
之疾也外臺一引文仲晚發傷寒三月至年末為晚發與此本別

△食自可者為欲解成胃陽已復則脈不和寒邪遲可知○病六七日手足三

部脈皆至謂其平也無沈伏等象此亦吐利後大煩陽進成云而口

噤不能言似瘳而非〔其人〕躁擾者邪正分爭故見諸證不必欲解也○

若脈和此亦吐利後易緊而〔其人〕大煩義同目重瞼內際黃者胃

來復之兆瞼外上下故曰重瞼一切經音義十七引〔此〕為欲解也

字略瞼謂眼也俗本作瞼從一切經音義十七引〔此〕為欲解也

成云脈經云病人兩目皆黃起者其病方愈○柯云脈道已通有

于腎朝會于肺腎氣絕則脈不至三部今手足皆至是脈道已通有

根有本非略氣出可知復營大煩躁擾者是陰出之陽非陰極而發也口噤

解亦不足慮再視其人之目重瞼內際此屬于脾為五色黃而不雜水

位之下土氣承也○出辨脈

【論愈有定時一章】

右一章四節亦通以陰退陽進為欲愈憑脈與證言

〔少陰病〕欲解時從子盡寅上寅成云陽生于子為一陽丑為二陽

解也喻云各經皆解于所王之時而少陰獨解于此者陰得陽則陰退陽長則陰消也即是推之而少陰所主在真陽不可識乎

右少陰病解之時

【可治證一章】

〔少陰病〕冒下證○下利極寒若〔利〕自止寒氣盡○惡寒而踈陰勝踈者手足卷之

向身以就溫熱常屈不伸也手足溫者陽氣復△可治總上二證言擬

陳云其身屈曲向前是也
氣未虧陰寒亦易散可用溫法

〔少陰病惡寒而踈〕成云陰寒甚○時自煩一作時欲去衣被者自煩

去衣被成云二可治擬四逆湯以煩燥非實熱且手足多逆冷也按吳茱萸

湯治兼胃寒之四逆此處不濟事喻云真陽擾亂不寧然不至出亡在外可用溫法

右二章通以陽氣漸復者為可治

【不治證一章】

〔少陰病〕惡寒一踈二而利三手足逆冷者四不治成云內外寒極

不治陽氣于無何有之鄉其仍不能四逆湯喻云陰盛無陽即柯云傷寒以等
陽為主不特陰病見陽脈者生必陰病見陽脈方不可治也背為陽腹
為陰陽盛則瘕陰盛則陽蹇若利而手足溫是陽回故手足可治若利不止
而手足冷逆是純陰無陽所謂六府有絕人于外者手足逆者死八氣
絕于內者下利不禁矣○病源口下有吐利燥逆者死八氣字

【陰病見陽復見陰證二章】

下利

篇自厥陰證有微熱而下利十七因者利自愈義同○冒下二證與本

脈數

脈據下節尤知其先之有微熱即但發尚微耳發汗自出者汗出云

與脈弱互意尤云氣方振而勢外達作成陰病見陽脈者利自愈下

章利者○設脈復緊為未解言即下成章見厥復利一據脈言一據證

必自止者○設脈復緊為未解言即下成章見厥復利一據脈言一據證

緊則不弱矣邪方熾盛其不能得汗又可知矣尤云脈緊則邪盛必

與正相爭郭雍曰宜四逆湯程林曰寒則可知利矣尤云脈緊則邪盛必

去汗出是為表氣和表裏俱和故自愈設脈復緊者知寒

氣尚在是為未解也○宋本注一云設脈復緊者知寒

傷寒

冒下二證○先厥後發熱以上先可知後雖不言日數則自一日知

為陽復也張兼善云三陰傷寒大陰也故手足溫少陰則手足清厥陰

則手足厥逆然病至厥陰乃陰之極也故手足溫少陰則手足清厥陰

傷寒雜病論章句卷二少陰病七中華書局聚

陽生陽極則陰生此陰陽推盪必然之理也按厥極發熱少〔而〕利

陰同然不拘厥陰也○五字病源〔者〕必自止熱一本無二字○成注發熱二勝則厥逆而利陽氣復則發

當作病○見厥復利陰既已發熱利必自止復又厥逆之以發熱一證不

看故也○見厥復利陰既已發熱利必自止復又厥逆之以發熱一證不

白頭翁湯雍曰此非熱利當審證冷熱用之按此當擬四逆

右二章言陰病見陽則利自止復又見陰則仍下利

〔傷寒〕〔出厥陰〕○〔先厥後發熱下利必自止〕陰病見陽○而反

汗出三陰正病皆無汗法今此汗咽中痛者其喉為痹厥少之脈同

可桔梗湯喻曰熱氣過多之驗也咽中痛者其喉為痹○發熱無汗

此熱傷上焦氣分熱有餘七上攻咽喉腫痛甚為喉痹也發熱無汗

而利必自止于發熱為陰病見發熱雖無汗本三陰之常今言及之者以別

按此不必拘○若不止必便膿血此氣過多邪亦外出所以利必自止

喻云熱傷下焦血分常云可桃華湯按此當白頭翁湯便膿血者其喉

不痺熱已洩于下熱邪在裏即不復在表在過隨其經氣之上下而為

就其偏言耳設熱氣充直則
喉痺膿血亦得兼而有之矣

右一章四節首言陽進則利止次言熱氣過多有結于上者
則為喉痺三節又申言陽進則利止四節言熱氣過多有流
于下者則便膿血

〔下利〕

〔出厥陰金匱在下利十七〕

脈反數而渴者

知陽長之象曰反者

無口渴○脈經作利自愈○設不差○陽勝于陰魏云下利固以陽氣
脈數而浮者義同利自愈○設不差○陽勝于陰魏云下利固以陽氣
傷陰致陽復必清膿血以有熱故也○清黃芩湯柯云脈數有虛有實渴
有偏勝之患必清膿血以有熱故也○清黃芩湯柯云脈數有虛有實渴
亦有虛有實若自愈則數為虛熱渴為邪火正熾矣
未復若不差則數為實熱渴為邪火正熾矣

右一章二節首言陽進自愈次言熱氣過多之變為圍膿血

〔陽氣素盛一章〕

下利

〔出厥陰金匱〕

寸脈反浮數

成云裏有熱尤云陽邪強陳云脈當

寸尺中自濇者

濇者膿血停滯之

必清膿血

說文廁清也徐鍇曰廁

當清除也成云清與圍通脈經曰清者廁也尤云陽強陰弱故清膿
血喻云脈見浮數若是邪還于表則尺中自和今尺中濇乃熱邪搏
傷寒雜病論章句卷二少陰病

結于陰分雖寸口得陽脈究竟必走下竅而便膿血也常云可桃華
湯柯云上條脈數而渴是未圍膿血因不差而預料之辭此在膿血
已圍後因寸浮尺濇而揣摩
之詞不得以必字作一例看

右憑脈以知其必清膿血

【陽與陰平陽又過勝一章】

【傷寒】

〔出厥陰〕

熱少厥微

其病甚輕

指頭寒

言厥微也

柯云身無大熱手足

微也

此熱微厥亦微

也

也

也○翼方注一默默不欲食

不能發熱

言熱少不能發熱

言熱少不能發熱

言熱少不能發熱

言熱少不能發熱

言熱少不能發熱

言熱少不能發熱

言熱少不能發熱

言熱少不能發熱

言熱少不能發熱

言熱少不能發熱

言熱少不能發熱

作不能煩躁數日

言熱少不能發熱

言熱少不能發熱

言熱少不能發熱

言熱少不能發熱

言熱少不能發熱

言熱少不能發熱

言熱少不能發熱

言熱少不能發熱

言熱少不能發熱

言熱少不能發熱

言熱少不能發熱

言熱少不能發熱

辨小便利色白者

言熱少不能發熱

言熱少不能發熱

言熱少不能發熱

言熱少不能發熱

言熱少不能發熱

言熱少不能發熱

言熱少不能發熱

言熱少不能發熱

言熱少不能發熱

言熱少不能發熱

言熱少不能發熱

言熱少不能發熱

若熱不除小便黃赤而不利

言熱少不能發熱

言熱少不能發熱

言熱少不能發熱

言熱少不能發熱

言熱少不能發熱

言熱少不能發熱

言熱少不能發熱

言熱少不能發熱

言熱少不能發熱

言熱少不能發熱

言熱少不能發熱

言熱少不能發熱

屬白頭翁輩矣

言熱少不能發熱

言熱少不能發熱

言熱少不能發熱

言熱少不能發熱

言熱少不能發熱

言熱少不能發熱

言熱少不能發熱

言熱少不能發熱

言熱少不能發熱

言熱少不能發熱

言熱少不能發熱

言熱少不能發熱

自差王肯堂曰設未

言熱少不能發熱

言熱少不能發熱

言熱少不能發熱

言熱少不能發熱

言熱少不能發熱

言熱少不能發熱

言熱少不能發熱

言熱少不能發熱

言熱少不能發熱

言熱少不能發熱

言熱少不能發熱

言熱少不能發熱

欲食宜王肯堂曰設未

言熱少不能發熱

言熱少不能發熱

言熱少不能發熱

言熱少不能發熱

言熱少不能發熱

言熱少不能發熱

言熱少不能發熱

言熱少不能發熱

言熱少不能發熱

言熱少不能發熱

言熱少不能發熱

言熱少不能發熱

可王肯堂見脅滿以爲兼少陽病

言熱少不能發熱

言熱少不能發熱

言熱少不能發熱

言熱少不能發熱

言熱少不能發熱

言熱少不能發熱

言熱少不能發熱

言熱少不能發熱

言熱少不能發熱

言熱少不能發熱

言熱少不能發熱

言熱少不能發熱

胡下之必拘有

言熱少不能發熱

言熱少不能發熱

言熱少不能發熱

言熱少不能發熱

言熱少不能發熱

言熱少不能發熱

言熱少不能發熱

言熱少不能發熱

言熱少不能發熱

言熱少不能發熱

言熱少不能發熱

言熱少不能發熱

其後必便膿血

言熱少不能發熱

言熱少不能發熱

言熱少不能發熱

言熱少不能發熱

言熱少不能發熱

言熱少不能發熱

言熱少不能發熱

言熱少不能發熱

言熱少不能發熱

言熱少不能發熱

言熱少不能發熱

言熱少不能發熱