

附河間傷寒心要

都梁 錙 洪

新安 吳勉學

校

傷寒心要論

夫傷寒者前三日在表法當汗 可用雙解散連進
數服必愈若不解者病已傳變後三日在裡法當下
殊不知下之太早則表乘虛入裡遂成結胸虛痞
懊憹斑疹發黃之証輕者必危危者必死但當以
平和之藥宣散其表和解其裡病勢或有汗而未
愈或無汗而愈當用 二小柴胡涼膈天水三藥

而服之

病若半在表半在裡法亦當和解三小柴胡涼膈主之

若裏熱微者則當微下四大柴胡合解毒湯主之熱

勢未退 又以大柴胡合三一承氣下之兩除表裏

之熱病至七八日裏證已甚表熱漸微脉雖浮數

則以三一承氣合解毒下之

其病胸膈滿悶或喘或嘔陽脉緊甚者七可用瓜蒂

散涌之

汗吐下三法之後別無異証者 涼膈散調之

病熱已去微熱者 以益元散服之無令再病此但
寒治法之大要也

或傷風自汗脉浮緩者 十雙解去麻黃以汗之

其病半表半裏 十一白虎湯和解之

病在裏脉沉細者無問風寒暑濕或表裏証俱不見
或內外諸邪所傷有汗無汗心腹痛滿譫語煩躁畜
熱內盛但是脉沉者並用 十二承氣合解毒下之

或中暑自汗 解以白虎湯 直格云夏至前為濕夏

用白虎宜乎局方云立秋後不用白虎子和
云若有白虎証亦不用乎却用詳審之耳

白虎解後 以五苓合天水調之多進數服無妨

或腹脹滿脉沉者

亦當承氣合解毒微下之

或發汗之後熱不解脉尚浮者

十六

白虎加蒼朮再

解之

或裏熱內盛陽厥極深皆因失下而成此証以致身
冷脉微昏憒將死切不得以寒藥下之誤下即死又
一輩庸醫妄言是陰厥便欲易換用玄武四逆溫熱
之劑投之下咽立死殊不知此証乃陰耗陽竭陰氣
極弱謂之耗陽厥極深謂之竭畜熱怫鬱將欲絕者
當此之証寒劑熱劑俱不可投但進涼膈解毒十七
以養陰退陽宣散畜熱脉氣漸生得大汗而愈有無

汗氣和而愈者

未愈却解毒合承氣

十八

下之次以解毒涼膈天

合而爲一

十九

調和陰陽洗滌臟腑則其他別証自

不生矣

有大下之後熱不退再三下之熱愈盛若下之不愈

脉微氣虛力弱不加以法則無可生之理若輟而不

下則邪熱極盛陰氣極衰脉息斷絕必不可救似此

之証是下之亦死不下亦死醫者到此活人殺人一

彈指間其不至手足失措者幾希矣

直格云傷寒汗後汗出不解或

反不汗脉尚浮白虎加蒼朮湯再解之又按餘論云傷寒下後自汗虛熱不已白虎加蒼朮人參一服如

神汗止身涼此通仙之法也如此則汗下之後熱不退不問有汗無汗宜白虎加蒼朮解之又加人參亦妙仍服涼膈解毒調之

經云三下而熱不退者即死後人有四五次下以十數行而生者此乃誤中耳活者未一二死者千百後學切不可為法但當依前用解毒合涼膈調之使陽熱徐退陰脉漸生庶不失人命

若傷飲不解散成結胸之証臨時擇用二十大小陷

胸湯丸累下之脉浮者不可下是表証未出小柴胡

合小陷胸湯二十一投之脉雖浮而熱大極者二十二

氣徐徐踈利之

或有留飲過度濕熱內生自利不止其熱未退
解毒湯治之

陽毒生斑

二十四

涼膈加當歸

怫鬱熱盛在表燥而無汗濕熱在裡不能發於外相

搏遂成發黃

二十五

茵陳湯調五苓散甚者

二十六

茵陳

合承氣下之

煩心不得臥

二十七

梔子湯

誤下太早遂成結胸虛痞

二十八

涼膈加枳殼桔梗剛

柔二症譫語發狂踰垣赴井皆陽熱極盛者

二十九

承

氣合解毒下之

汗下之後煩渴飲水則

三十

涼膈減桂五苓甘露蘊

元選而用之小便不通五苓泄之大便閉結承氣下之更有外證加減通聖散方內隨證用藥

婦人證治皆然惟孕婦三四月并七八月不用硝其餘月分用之無妨

小兒減劑服之

此中有古人治傷寒不傳之妙後之學者其慎寶之

第一雙解散

防風通聖散

防風

去蘆

川芎

當歸

焙

赤芍藥

大黃

麻黃

連翹

芒硝

半兩

石膏

黃芩

去腐

桔梗

一兩

甘草

二兩

滑石

三兩

荊芥

白朮

梔子

二錢半

右爲散每服三錢水一盞薑三片煎六分溫服太

黃芒硝麻黃三味對証旋入自利去大黃芒硝自

汗去麻黃

天水散

益元

六一

滑石

六兩

甘草

一兩

右爲末每服三錢溫蜜水調暑月冷水亦可和解

傷寒傷風發汗葱白五寸豆豉五十粒煎一盞
四五錢并三服解利爲度加薄荷尤妙

通聖合益元

右七兩和勻每服三錢水一盞半葱白五寸豆豉
五十粒姜三片煎一盞溫服

第二小柴胡涼膈天水合服

小柴胡湯

北茈胡

三兩黃芩

人參

半夏

生薑

甘草

大棗

一兩

右爲散每服五錢

涼膈散

連翹 二兩 梔子

大黃

薄荷

黃芩 一兩 甘草

芒硝

右爲散每服三錢水一盞煎七分入蜜少許竹葉五片

第二涼膈合小茈胡

第四大柴胡合黃連解毒湯

大柴胡湯

柴胡 去苗 大黃 半兩

黃芩

白芍藥 一分

半夏 泡七次二錢

枳實 生三錢

右爲散分三服水一盞半生姜三片大棗一枚煎

半觔溫服

黃連解毒湯

黃連

黃蘗

黃芩

梔子

等分

右爲散每服半兩水一盞煎五分溫服

第五

大柴胡合二一承氣湯

三一承氣湯

大黃

芒硝

厚朴

枳實

各半兩

甘草

一兩

右剉每服二錢半水一大觔姜三片煎六分入

再煎一二沸

第六承氣合解毒湯

第七瓜蒂散

瓜蒂

赤小豆

等分

右爲末豆豉湯調下一錢未吐再服

第八涼膈散

第九益元散

風

第十雙解散

第十一白虎湯

知母

兩半

甘草

一兩

粳米

一合

石膏

四兩

右剉每服五錢水一觔煎六分溫服

第十二承氣合解毒湯

暑

第十三白虎湯

第十四五苓散合天水散

五苓散

猪苓

伏苓

三錢

官桂

一分

澤瀉

一兩

白朮

一錢

活人書

三分

宣明論

半錢

右細末

第十五承氣合解毒湯

第十六白虎湯加蒼朮

第十七涼膈合解毒湯

第十八解毒合承氣湯

第十九解毒涼膈天水合

結胸

第二十大小陷胸湯丸

大陷胸湯

大黃 芒硝 三錢 甘遂 三字七

右剉四錢水一觔煎大黃六分內消再煎一二沸

內甘遂溫服未利再與

小陷胸湯

半夏

四錢

生姜

切

黃連

二錢

栝婁實

半箇全割

右剉水三盞煎栝婁至盞半內藥煎至一盞分作兩服

大陷胸丸

大黃

半兩

葶藶

二錢

芒硝

一錢

杏仁

十二枚去皮尖
杵灰炒變色

右大黃為末研葶藶杏仁為膏圓如彈子大甘之末三字蜜半匙水一觔煎半觔溫服一九一宿

下未利再與

第二十一小茈胡合小陷胸湯

第二十二承氣湯

大黃

綿紋者

芒硝

朴硝有芒頭者

厚朴

去

枳實

各半兩

右剉如麻豆大分一半用水一碗半生姜三片煎至六分納硝煎一二沸絞去滓熱服

第二十三解毒湯

發斑

第二十四涼膈散加當歸

發黃