

馮氏錦囊秘錄雜症大小合參卷首

孫顯達惟一良

海鹽馮兆張楚瞻甫纂輯

門人王士增允能全較

內經纂要

痿論篇曰五藏使人痿何也。

痿謂痿弱無力以運動。

肺主身之皮毛。

心主身之血脉○
肝主身之筋膜○

膜者皮下肉上筋膜也

脾主身之肌

肉腎主身之骨髓

所主不同痿生亦各歸其所主

故肺熱葉焦則皮毛虛

弱急薄著則生痿痺也。

也。肺熱則腎受熱氣故爾。

心氣熱○

則下脉厥而上。上則下脉虛。虛則生脉痿。樞折挐。脛縱而

不任地也。○心熱盛則火獨光炎上。腎之脉常下行。今火盛

氣厥逆。火復內燔。陰上陽下。不守位。心氣通脉。故生脉

痿。腎氣主足。故膝腕樞紐如折。脛筋縱緩而不能任地也。

肝氣熱則膽泄口苦。筋膜乾。筋膜乾則筋急而攣。發為筋

痿。○膽約肝葉而汁味至苦。肝熱則膽液滲泄。故口

苦也。肝主筋膜。熱則筋膜乾而攣急。發為筋痿。脾氣

則胃乾而渴。肌肉不仁。發為肉痿。○脾與胃以膜相連。脾氣

渴。脾主肌肉。熱薄於內。腎氣熱則腰脊不舉。骨枯而髓減。

故肌肉不仁。發為肉痿。○腰為腎府。又腎脉上股內貫脊屬腎。故腎氣熱

發為骨痿。○則腰脊不舉。腎主骨髓。熱則骨枯而髓減。發為

骨痿。○治痿者獨取陽明何也。陽明者五藏六府之海。陽明胃

脉也。為

水穀主問宗筋宗筋主束骨而利機關也宗筋謂陰髦中橫骨上下之堅

筋也上絡胃腹下貫髌尻又經於背腹上頭項故云宗筋

主束骨而利機關然腰者身之大關節所以同屈伸故曰

機關衝脉者經脉之海也十二經之海主滲灌谿谷與陽

明合於宗筋尋此則橫骨上下齊兩傍堅筋正宗筋也衝

脉亦俠齊傍各同身寸之一寸五分而上宗筋脉於中故

曰與陽明合於宗筋也以爲十二經海故主滲灌谿谷也

肉之大會爲陰陽總宗筋之會會於氣街而陽明爲之長

各小會爲經宗筋聚會會於橫骨之中從上

皆屬於帶脉而絡於督脉而下故云陰陽總宗筋之會也

宗筋俠齊下合於橫骨陽明輔其外衝脉居其中故云會

於氣街而陽明爲之長氣街陰髦兩傍脉動處也帶脉者

起於季脅同身一周而絡於督脉也督脉者起於關元上

下循腹故六皆屬於帶脉而絡於督脉也督脉任脉衝脉

下

痿論篇

二

二

三者同起而異行故

故陽明虛則宗筋縱帶脉不引故足

痿不用也

其陽明之脉從缺盆下乳內廉下俠齊至氣街中而合

以下髀抵伏兔下入膝髓中下循胫外廉下足跗入中指

內間其支別者下膝三寸而別以下入中指外間故陽明

虛則宗筋縱帶脉不

引而足痿不用也

厥論篇曰厥之寒熱者何也陽氣衰於下則為寒厥陰氣

衰於下則為熱厥

陽謂足之三陽脉陰謂足之三陰脉下

陰陽六經其熱厥之為熱也必起於足下者何也

陽主外

氣有偏勝也

而厥在

內故

陽氣起於足五指之表陰脉者集於足下而聚於足

心故陽氣勝則足下熱也

足太陽脉出於足小指之端外

之端。足陽明脉出於足中指及大指之端，並循足陽而上。肝脾腎脉集於足下，聚於足心。陰弱，故足下熱也。此言熱厥之熱在陰分者。寒厥之爲寒也，必從五指而上於膝者，以其陽勝陰也。何也？陰主內而厥，陰氣起於五指之裏，集於膝下而聚於膝上，故陰氣勝則從五指至膝上寒，其寒也不從外，皆從內也。是太陰脉起於足大指之端內側，足厥陰脉起於足大指之端三毛中，足少陰脉起於足小指之下，斜趣足心，並循足陰而上，循股陰入腹，故云集於膝下而聚於膝之上也。此言寒厥之厥上於膝，以其陰勝陽也。或令人腹滿，或令人暴不知人，或至半日遠至一日乃知人者，何也？陰氣盛於上，則下虛；下虛則腹脹滿，陽氣盛於上，則下氣重，上而邪氣逆逆，則陽氣亂，陽氣亂則不知人。

也。陰氣盛於上。則腹脹滿者。乃寒厥。陽氣盛於上。則不知人者。乃熱厥耳。

病能論曰。人有臥而有所不安者。何也。伯曰。藏有所傷及。

精有所之。寄則安。故人不能懸其病也。言有臥而不安者。以藏氣傷而精氣

耗也。蓋五藏為陰。各藏其精。藏有所傷而精耗者。臥不安也。必精有所寄。各在本藏而無失。則臥斯安矣。寄者。藏也。

如用藏氣。肺藏魄之類。凡臥有不安者。血不歸肝。衛氣不能入於陰。此人之所以不能懸其病也。懸者。絕也。人

之不得偃臥者。何也。謂不得肺者。藏之蓋也。居高布葉。四

肺者。藏之蓋也。肺氣盛。則脉大。脉大。則不得偃臥。肺之邪氣盛滿。則氣促喘奔。故

不得偃臥。有病怒狂者。此病安生生於陽也。怒不慮禍。故謂之狂。陽氣者。

因暴折而難決。故善怒也。病名曰陽厥。言陽氣被折鬱不

不疏暢皆陽逆躁治之奈何奪其食即已夫食入於陰

長氣於陽故奪其食即已食少則氣衰故節去其食即病自己使之服以生

鐵洛為飲夫生鐵洛者下氣疾也取金平肝也

奇病論曰人有重身九月而瘖此為何也重身謂身中有身則懷妊者也

瘖謂不言語也任娠胞之絡脉絕也絕謂脉斷絕不流通而

九月足少陰脉養胎絕謂脉斷絕不流通而胞之絡脉絕也絕謂脉斷絕不流通而

氣斷胞絡者繫於腎少陰之脉貫腎繫舌本故不能言少陰

絕也腎脉也氣不營無治也十月胎去胞絡復通腎當十月復十月胎去胞絡復通腎

養故舌不能言無治也當十月復十月胎去胞絡復通腎無損不足益有餘以成其疹疹謂久病反法而治則胎

有病頭痛以數歲不已此安得之名為何病頭痛之疾不當踰月數年

不愈故怪。當有所犯大寒內至骨髓髓者以腦為主腦逆

而問之。故令頭痛齒亦痛。腦為髓主齒是骨餘腦逆犯病名曰厥

逆。人先生腦有腦則有有病口甘者病名為何何以得之

此五氣之溢也名曰脾痺。痺熱也脾熱則四藏同稟故五

夫五味入口藏於胃脾為之行其精氣津液在脾故令人

口甘也。脾熱內滲津液在脾胃穀化餘精氣隨溢此肥美

之所發也此人必數食甘美而多肥也肥者令人內熱甘

者令人中滿故其氣上溢轉為消渴。食肥則腠理密陽氣

內熱甘者性氣和緩而發散逆故令人中滿然內熱則陽

氣炎上炎上則欲飲而喘乾中滿則陳氣有餘有餘則脾

氣上溢故曰其氣治之以蘭除陳氣也。蘭蘭草也言蘭除陳久甘記不化之

氣者以辛能發散也。有病口苦取陽陵泉口苦者病名為何何以得

之病名曰膽瘴。亦謂熱也膽汁味苦故口苦大肝者中之將也取決於

膽咽為之使。肝者將軍之官謀慮出焉膽者中正之官決斷出焉肝與膽合氣性相通故諸謀慮取決

於膽咽膽相應此人者數謀慮不決故膽虛氣上溢而口故咽為使焉

為之苦治之以膽募俞。胃腹曰募背脊曰俞膽募在乳下二筋外期門下同身寸之五分俞

在脊第十椎下兩傍相去各同身寸之一寸半有癥者一日數十洩此不足也身

熱如炭頸膈如格人迎躁盛喘息氣逆此有餘也。是陽氣太盛於

外陰氣不足太陰脉細微如髮者此不足也其病安在名故有餘也

爲何病。

癰。小便不得也。溲。小便也。頸膈如格。言頸與胃膈如相格。不相順應也。人迎躁盛。謂結喉兩傍脈動

盛滿急數。非常躁速也。胃脈也。太陰脈細。縷如髮者。謂手

大指後。同身寸之一寸。骨高脈動處。脈則肺脈也。此正手

太陰脈氣之所流。病在太陰。其盛在胃。顙在肺。病名曰厥。

可以候五藏也。

病在太陰。其盛在胃。顙在肺。病名曰厥。

死不治。

病癰數溲。身熱如炭。頸膈如格。息氣逆者。皆手太陰。脈當洪大。而數。今太陰脈反微細如髮者。是病

與脈相反也。何以致之。肺氣逆陵於胃。上使人迎躁盛。故

曰病在太陰。其盛在胃也。以喘息氣逆。故云顙亦在肺也。

病以氣逆證不相應。故

此所謂得五有餘。二不足也。所謂

病名曰厥。死不治也。

五有餘者。五病之氣有餘也。二不足者。亦病氣之不足也。

今外得五有餘。內得二不足。此其身不表不裏。亦正死明

矣。外五有餘者。一身熱如炭。二頸膈如格。三人迎躁盛。四

喘息。五氣逆也。內二不足者。一病癰。二脈數。三太陰

裏既不可憑補寫固難為法故曰此其身不表不裏亦正

死明矣人生而有病巔疾者病名曰何安所得之於風雨寒

暑陰陽喜怒然始生未犯邪氣已有巔病名為胎病此得

疾豈邪氣素傷巔謂上巔則頭首也之在母腹中時其母有所大驚氣上而不下精氣并居故

令子發為巔疾也精氣謂陽之精氣也言人初生有項巔

驚氣上而不下精氣并居於上令子發為巔疾之疾者胎中之病也在腹之時母有大

刺禁論曰藏有要害不可不察肝生於左肝象木王於春

於肺藏於右肺象金王於秋秋陰收殺故藏於右肝為少

左肺藏於右陽陽長之始故曰生肺為少陰陰藏之初故

曰心部於表陽氣主外腎治於裏陰氣主內腎象水也心

間動氣內治脾謂之使營動不已糟粕胃為之市水穀所

五穀故曰治脾謂之使營動不已糟粕胃為之市水穀所

皆入如市鬲育之上中有父母生之原生者命之主故氣

故為市也海為人之父母也又天心下鬲上為育心為陽父也肺七

為陰母也肺主於氣心主於血其榮衛於身故為父母七

節之傷中有小心小心謂其心神霧之宮室脊有三七二

藏之靈皆名為神神之所從之有福逆之有咎所以生形

以得名為志者心之神也之所從之有福逆之有咎所以生形

之所以成順之則福延逆之則咎無刺大醉令人氣亂無

至此陳刺藏府之有定次也無刺大醉令人氣亂無

刺大怒令人氣逆無刺

刺大饑人足也無刺

八血脈無刺大驚人神蕩越也此舉不

可輕刺之人刺

大饑人足也無刺

八血脈無刺大驚人神蕩越也此舉不

可輕刺之人刺

志論曰氣實形實氣虛形虛此其常也反此者病形歸氣故

虛實同焉形氣相反故穀盛氣盛穀虛氣虛此其常也反

病生氣脈氣形身形穀盛氣盛穀虛氣虛此其常也反

此者病營氣之道內穀為寶穀入於胃氣傳於肺精者上

也。脈實血實脈虛血虛此其常也反此者病脈者血之在

反不相應如何而反氣虛身熱此謂反也氣虛為陽氣不

則為病也。身寒反身熱者脈氣當盛脈不盛而身熱證不相符是陽氣不足當

故謂反也。甲乙經云氣盛身寒氣虛身熱此謂反也。穀入

多而氣少此謂反也。穀入於胃脈道乃行。今穀入多穀不

入而氣多此謂反也。胃氣外散。脈盛血少此謂反也。脈少

血多此謂反也。經脈行氣絡脈受血。經氣入絡。氣盛身

絡受經氣候不相合故皆反常。氣盛身

血多此謂反也。經脈行氣絡脈受血。經氣入絡。氣盛身

絡受經氣候不相合故皆反常。氣盛身

寒得之傷謂觸胃也寒氣虛身熱得之傷形故傷暑傷謂觸胃也傷氣盛身寒熱傷氣故氣

虛身熱

皮部論曰百病之始生也必先於皮毛邪中之則腠理開

開則入客於絡脉留而不去傳入於經留而不去傳入於

府廩於腸胃廩積也邪之始入於皮也泝然起毫毛開腠

理泝然惡寒也起謂毛起豎也其入於絡也則絡脉盛色變

盛謂盛滿變其入客於經也則感虛乃陷下經虛邪入故

謂易其常也氣少故其留於筋骨之間寒多則筋攣骨痛熱多則筋弛

陷下也骨消肉爍腠破毛直而敗攣急也弛緩也消爍也寒則筋急熱則筋緩寒勝為痛熱勝為

氣清腠者肉之標故肉
消則腠破毛直而敗也

骨空論曰任脉者起於中極之下。以上毛際循腹裏上關

元。至咽喉上頤循面入目。言任脉之所起所止也。任脉奇經八脉之一也。中極者。臍下四

寸起於中極之下。始於會陰穴也。兩陰間任山會陰而行

腹腎中會陰而行背從會陰以上曲骨之毛際橫骨上中

極下一寸陷中動脉應手復循腹裏之中極上關元氣海

下腕中腕上腕巨闕臍中至廉前承漿以上咽喉中其脉

至上頤循面衝脉者起於氣街並少陰之經俠齊上行至

以入於目也。衝脉之所起所止也。衝脉亦奇經八脉之一

胸中而散也。任脉當臍中而上行衝脉俠齊兩傍而上行

起於氣街並足少陰腎經俠臍上行至胃中而散也。氣街

者穴名也在毛際兩傍鼠臑上同身寸之一寸也。言衝脉

起於氣街者亦從少腹之內與任脉並行而至於足乃循

腹也。又曰衝脉任脉者皆起於胞中上循脊裏為經絡之

始

海其浮而外者循腹各行會於咽喉別而絡唇口由此言之則任脉衝脉從少腹之內上行並由中極之下氣街之內明任脉爲病男子內結七疝女子帶下瘕聚爲病也內者腹也腹之中行乃任脉所行之脉路則宜其爲病若是男子爲七疝女子爲瘕聚七疝者按內經各篇有狐疝風疝肺疝脾風疝心風疝心疝腎風疝肝風疝有婦人癰疝有男子癰疝厥疝瘕疝疝氣且常總計其數乃五藏疝及狐疝癰疝也其大義俱見各篇後丹溪七疝寒水筋血氣狐癰袖珍方七疝厥瘕寒氣盤附狼似丹溪合於經旨雖名色各異豈出內經範圍耶然世但知病在下部者爲疝豈知五藏皆有疝又但知男子有疝豈知婦人亦有疝蓋皆不考內經故耳瘕聚者卽積聚也大奇論曰二陽急爲瘕後世有八瘕者亦因七疝之名而遂有八瘕名色卽蛇瘕胎瘕青瘕黃瘕燥瘕血瘕衝脉爲病逆氣裏急之爲病狐瘕蠶瘕是也內經無之也衝脉起於氣街並足少陰夾臍上行至胃中而散則裏者其所行之脉絡也病則氣逆而不能上何以至胃中而

散也。氣聚腹中而不能散，何以見在裏之急也。督脉爲病，脊強反折也。任脉，衝脉。

督脉者，一源而三岐，故經或謂衝脉爲督脉也。何以明之？今甲乙及古經，脉流註圖經，以任脉循背者，謂之督脉，自少腹直上者，謂之任脉，亦謂之督脉，是則以背腹陰陽別爲名目。任脉自胞中過帶脉貫齊而上，故男子爲病，內結七疝，女子爲病，則帶下崩聚，衝脉俠齊而上，並少陰之經，上至胛中，故衝脉爲病，則逆氣裏急也。以督脉上循脊裏，故督脉爲病，則督脉者，起於少腹以下骨中央，女子入繫脊強反折也。

廷孔。亦猶任脉，衝脉起於胞中也。其實乃起於腎下，至於少腹，則下行於腰橫骨圍之中央也。繫廷孔者，謂竅

滿近所謂前陰穴也。以其其孔，溺孔之端也。孔，則竅漏也。陰廷，繫屬於中，故名之。

上有溺孔焉，端謂陰廷，在此溺孔之上。其絡循陰器，合纂端也。而督脉自骨圍中央，則至於是。

間繞纂後。督脉別絡，自溺孔之端分而各行，下循陰器，乃合纂間也。所謂間者，謂前陰後陰之兩間也。自