

張仲景傷寒論合註卷三

海門吳隱亭考槃編輯

辨太陽病脈證併治法三

太陽病項背強几几無汗惡風葛根湯主之

成無己曰太陽病項背強几几汗出惡風者中風表實也表虛宜解肌表實宜發汗是以葛根湯發之也

方中行曰几几鳥之短羽者動則引頸凡几然形容病人之頸項俱病者俯仰不能自如之貌蓋太陽之脈下頸俠脊太陽之經具別者俠脊上項陽明之脈其支者從大迎下人迎循喉嚨入缺盆陽明之經其直者上腹而布胸中至缺盆而結上頸上而合於太陽故邪湊太陽則項背強加陽明則頸亦病故曰几几也按原文止言項背強
几几不得牽合陽明

喻嘉言曰風寒傷經絡之經則所過但痛而已未至於強風寒傷筋骨之筋則所過筋急強直而成剛痙按此與上桂枝加葛根湯條以有汗無汗定傷風傷寒之別蓋太陽初交陽明未至兩經各半故仲景原文不用合病二字然雖不名合病其實乃合病之初證也几几者頸不舒也頸屬陽明既於太陽風傷衛證中纔見陽明一證即於桂枝湯內加葛根一藥太陽寒傷營證中纔見陽明一證即於麻黃湯內加葛根一藥此大匠天然不易之証率也然此條不用麻黃全方加葛根反用桂枝全方加麻黃葛根者則并其巧而傳之矣見寒既欲傳於

漢張仲景先師傷寒論原文卷三

後學吳考槃編次

三五太陽病。項背強。凡几無汗。惡風。葛根湯主之。

三六太陽與陽明合病。必自下利。但嘔者。葛根加半夏湯主之。

三六太陽與陽明合病。不下利。但嘔者。葛根加半夏湯主之。

三六太陽病。桂枝證。醫反下之。利遂不止。脈促者。表未解也。喘而汗出者。葛根黃芩黃連湯主之。

三九太陽病。頭痛發熱。身疼。腰痛。骨節疼痛。惡風。無汗。而喘者。麻黃湯主之。

四四太陽與陽明合病。喘而胸滿者。不可下。宜麻黃湯。

四四太陽病。十日以去。脈浮細而嗜卧者。外已解也。設胸滿脇痛者。與小柴胡湯主之。脈但浮者。與麻黃湯。

四四太陽中風。脈浮緊。發熱惡寒。身疼痛。不汗出而煩躁者。大青龍湯主之。

四四若脈微弱。汗出惡風者。不可服。服之則厥逆。筋惕肉瞤。此為逆也。

四五傷寒。脈浮緩。身不疼。但重。乍有輕時。無少陰證者。大青龍湯發之。

四五傷寒。表不解。心下有水氣。乾嘔。發熱而渴。或渴或利。或噎。或小便不利。少腹滿。或喘者。小青

龍湯主之。

四六傷寒。心下有水氣。欬而微喘。發熱不渴。服湯已渴者。此寒去欲解也。小青龍湯主之。



南京中医药大学图书馆版权所有

張仲景傷寒論合註卷三

海門吳隱亭考槃編輯

辨太陽病脈證併治法三

太陽病項背強几几無汗惡風葛根湯主之

成無己曰太陽病項背強几几汗出惡風者中風表實也表虛宜解肌表實宜發汗是以葛根湯發之也

方中行曰几几鳥之短羽者動則引頸几几然形容病人之頸項俱病者俯仰不能自如之貌蓋太陽之脈下頸俠脊太陽之經具別者俠脊上項陽明之脈其支者從大迎下人迎循喉嚨入缺盆陽明之經其直者上腹而布胸中至缺盆而結上頸上而合於太陽故邪湊太陽則項背強加陽明則頸亦病故曰几几也按原文止言項背強
几几不得牽合陽明

喻嘉言曰風寒傷經絡之經則所過但痛而已未至於強風寒傷筋骨之筋則所過筋急強直而成剛痙按此與上桂枝加葛根湯條以有汗無汗定傷風傷寒之別蓋太陽初交陽明未至兩經各半故仲景原文不用合病二字然雖不名合病其實乃合病之初證也几几者頸不舒也頸屬陽明既於太陽風傷衛證中纔見陽明一證即於桂枝湯內加葛根一藥太陽寒傷營證中纔見陽明一證即於麻黃湯內加葛根一藥此大匠天然不易之彀率也然此條不用麻黃全方加葛根反用桂枝全方加麻黃葛根者則并其巧而傳之矣見寒既欲傳於

陽明則胸間之喘必止。自可不用杏仁。况頸項背俱是陽位。易於得汗之處。設以麻黃本湯加葛根大發其汗。將毋項背強几几者。變為經脈振搖動惕乎。此仲景方之所以精義入神也。桂枝湯麻黃湯分主太陽之表。葛根湯總主陽明之表。小柴胡湯總主少陽之表。三陽經合併受病。即隨表邪見證多寡定方。絲絲入扣。斯不為誤。

張隱菴曰。自此以下凡四節皆論太陽分部之表陽邪薄之而循經下入也。夫邪薄於太陽之表而為太陽病。項背強几几則循於太陽之分部矣。邪拒於表故無汗。從表而入於肌故惡風。葛根湯主之。葛根藤引蔓延能通經脈為陽明宣達之品。主治太陽經脈之邪。麻黃中空而象毛孔。主散表邪。配桂枝湯助津液血氣充於肌腠皮膚。故取微似汗而病可愈。金鑑曰。此略其證脈。單舉痙之頸項強急者。以明其治也。太陽脈下項循肩挾脊。陽明脈循喉嚨入缺盆貫膈下乳內廉。太陽主後前合陽明。陽明主前後合太陽。今邪壅於二經之中。故有几几拘強之貌也。太陽之強不過項強。此痙之強則不能俯仰。項連胸背而俱強。故曰項背強几几也。無汗惡風寢邪也。宜葛根湯發之。即桂枝湯加麻黃葛根兩解太陽陽明之邪也。徐靈胎曰。陽明證汗出而惡熱。今無汗而惡風則未全入陽明。故曰太陽病。

葛根湯方

葛根四兩

麻黃三兩

桂枝三兩

芍藥三兩

甘草二兩

生薑三兩

大棗十二枚

按桂枝芍藥一兩

右七味㕮咀以水一斗先煮麻黃葛根減二升去沫納諸藥煎取三升去滓溫服一升覆取微似汗不須啜粥餘如桂枝湯法。

成無己曰本草云輕可去實麻黃葛根之屬是也此以中風表實故加二物於桂枝湯中也張元素曰葛根所以斷太陽入陽明之路非太陽藥也若太陽初病便服升葛是反引邪氣入陽明也

按此論當與柯氏方解參看

周禹載曰無汗惡風凡凡當用麻黃湯加葛根矣乃仲景仍於桂枝湯中加麻黃君葛根者何意非有喘無取於杏仁乃不去麻黃復加葛根則葛根亦大開肌肉之藥豈不慮大汗而無制乎故不獨以桂枝監之且有芍藥收之庶幾兼發二經之邪而無亡陽之慮也

按此註當與大

柯韻伯曰易以艮為山又以艮為背山主靜人以背應之故元首四肢俱主動而背獨主靜葛根禀氣輕清而賦體厚重此不惟取其輕以去實復取其重以鎮動也此又培土甯風之法

徐靈胎曰前桂枝加葛根湯一條其現證亦同但彼云反汗出故無麻黃此云無汗故加麻黃也按葛根本草治身大熱大熱乃陽明之證也以太陽將入陽明之經故加此藥陳蔚曰前桂枝加葛根湯方治汗出是邪從肌腠而入輸故主桂枝此方治無汗是邪從膚表而入輸故主麻黃然邪既入輸肌腠亦病方中取桂枝湯全方加葛根麻黃亦肌表兩解之治與

青龍方後章註參看

桂枝二麻黃一湯同意而用却不同。

費晉卿曰太陽證無汗宜用麻黃湯矣乃變其法於桂枝湯中加葛根麻黃二味此中奧義全在惡風二字但惡風而不惡寒則不在寒傷營之例乃太陽表證未解將入陽明之象故用麻黃以發汗桂枝以去風參用葛根以阻其入陽明之路若拋荒本經之病而預用別經之藥便開門揖盜仲景斷不為也按葛根氣味辛甘延引勝藥主宣通經脈何反開門揖盜耶前人學不明經好為異說學者當以經論參究

太陽與陽明合病必自下利葛根湯主之。

成無己曰傷寒有合病有併病本太陽病不解併於陽明者謂之併病三經俱受邪相合病者謂之合病合病者邪氣盛也太陽陽明合病者與太陽少陽合病陽明少陽合病皆言之自下利者以邪氣併於陰則陰實而陽虛邪氣併於陽則陽實而陰虛寒邪氣甚客於二陽二陽方外實而不主裡則裡氣虛故必下利與葛根湯以散經中甚邪。

方中行曰必定然之詞自謂自然而然也膀胱主水胃主穀寒為陰陰氣主下降故太陽陽明合病經中之邪熱甚胃氣弱不化穀不分清雜进而走注所以謂之必也但用葛根湯散經中之寒邪而以不治治利以不治治利者麻黃散太陽之表葛根解陽明之肌桂枝主營衛之和薑棗健脾胃之弱甘草者和中之國老芍藥者緩中而佐使夫如是而經中之邪散則胃中之正回不分清者自分清不顯治者而治在其中矣。

張隱菴曰此言太陽合陽明之氣於皮部從陽明之闔而下利以見循經下入之義合病者。

合病二陽之氣也太陽主開於上陽明主闔於下此太陽從陽明之闔故必自下利病皆俞之分而循經下入故亦主葛根湯愚按合病下利乃天氣下降氣流於地葛根湯主之乃地氣上升氣騰於天之義也

周禹載曰後條因嘔而用半夏復云不下利者加止於下利則津液去而必竭如此條自下利者竟用本湯假如嘔而復下利將何以處之乎亦即葛根湯倍生薑可也半夏可不用也柯韻伯曰不言兩經相合何等病但舉下利而言是病偏於陽明矣太陽主表則不合下利下利而曰必必陽并於表表實而裡虛耳葛根為陽明經藥惟表實裡虛者宜之而胃家實非所宜也

徐靈胎曰合病全在下利一證上審出蓋風邪入胃則下利矣

陳脩園曰太陽之惡寒發熱頭項強痛等證與陽明之熱渴目疼鼻乾等證同時均發無有先後名曰合病合病者兩經之熱邪並盛不待內陷而胃中之津液為其所逼而不守必自下利雖然下利而邪猶在表未可責之於裡既非誤下邪陷之裡虛斷不可以協熱下利之法治之仍將以兩經之表證為急故以葛根湯主之

唐容川正曰脩園以為兩經之邪熱內陷非也觀下文葛根黃芩黃連湯證方是邪熱內陷玩其文法下節云桂枝證而此二節所謂太陽即可知其為麻黃證矣麻黃證本係傷寒乃陰邪也陰邪內合陽明陷於大腸則自下利逆於胃中則但嘔理中湯之治嘔利以寒單在

裡故以溫裡為急葛根湯之治嘔利則以寒自外來故仍以發表為主使寒仍從外解也脩園解為熱邪內陷與方不合且下節利不止並加脈促者三字以別之以見熱邪內陷脈數而歇至與寒邪內陷之脈不同也即下一節定此二節而知此二節所言是太陽寒邪內合陽明之證讀仲景書正湏從文法間搜討

葛根湯方觀

外臺方議問曰經云下利不可發汗發汗則脈滿今此下利又發汗者何也答曰少陰病下利清穀者為裡虛若更發汗則脾虛而脹今太陽病未罷或有頭痛惡風寒等證尚存於表其脈尚帶浮便傳入陽明而有口渴身熱等證又自下利必湏此方發散太陽之表以中有一葛根能除陽明之邪也故諸證但發熱兼有裡而脈浮者此方最善

喻嘉言曰寒者陰也陰性下行故合陽明胃中之水穀而下奔用葛根湯以解兩經之邪不治利而利自止耳

柯韻伯曰此開表逐邪之輕劑也其證身不疼腰不痛骨節不痛是骨不受寒矣頭項強痛下連於背牽引不甯是筋傷於風矣不喘不煩躁不乾嘔是無內證無汗而惡風病只在表若表病而兼下利是表實裏虛矣此麻黃青龍之劑較輕然几更甚於項強而無汗不失為表實脈浮不緊數是中於鼓動之陽風故以桂枝湯為主而加麻葛以攻其表實也葛根味甘氣涼能起陰氣而生津液滋筋脉而舒其牽引故以為君麻黃生薑能開元府腠理之

閉塞祛風而出汗故以為臣寒熱俱輕故少佐桂芍同甘棗以和裡此於麻桂二方之間衡其輕重而為調和表裡之劑也故用之以治表實而外邪自解不必治裡虛而下利自瘳與大青龍治表裏俱實者異矣要知葛根秉性輕清賦體厚重輕可去實重可鎮動厚可固裡一物而三美俱備然惟表實裡虛者宜之胃家實者非所宜也故仲景於陽明經中不用葛根東垣用藥分輕不列於太陽而列於陽明易老云未入陽明皆不可服皆未知此義喻氏謂仲景不用於陽明恐亡津液與本草生津之說左亦謂能開肌肉又與仲景治汗出惡風桂枝湯中加葛根者左矣蓋桂枝葛根俱是解肌和裡之劑故有汗無汗下利不下利皆可用與麻黃專於治表者不同麻黃葛根俱有沫沫者濁氣也故仲景皆以水煮去其沫而後入諸藥此取其清揚發腠理之義桂枝湯飲稀粥者因無麻黃之開而有芍藥之斂恐邪有不盡故假穀氣以逐之此汗生於穀也

金鑑曰是方即桂枝湯加麻黃葛根也麻黃佐桂枝發太陽營衛之汗葛根君桂枝解陽明肌表之邪不曰桂枝湯加麻黃葛根而以葛根命名者其意重在陽明以嘔利多屬陽明也二陽表急非溫覆而取汗其表未易解也或嘔或利裡已失和雖飲粥而胃亦不能輸精於皮毛故不湏飲粥也

太陽與陽明合病不下利但嘔者葛根加半夏湯主之成無己曰邪氣外盛陽不主裡則裡氣不和裡氣下而不上者但利而不嘔裡氣上而不下

者但嘔而不利故以葛根湯以散表邪加半夏以下逆氣也

方中行曰合之為言相配偶也蓋陽明切近太陽所以合也與上條互相發明以見中風傷寒之分明也嘔大吐也蓋太陽膀胱也膀胱主水陽明胃也胃主飲風邪屬陽陽主氣陽邪協氣泛溢水飲而上湧得逆則與俱出此嘔之所以為嘔太陽陽明相合而為一家之證也桂枝葛根散風而解肌太陽陽明之的藥也半夏辛溫散氣而蠲飲主除熱堅而止嘔也然所謂葛根加者其葛根湯得非承上條而言指桂枝加葛根之葛根以其無麻黃殊為尤當也用者請更參詳不浮沉於謬訛何如按葛根加半夏湯者於葛根湯內更加半夏半升也註云桂枝加葛根之葛根與文法不合

張隱菴曰不下利但嘔者太陽之氣仍欲上滯故加半夏宣通陽明燥氣以助太陽之開柯韻伯曰太陽陽明合病太陽少陽合病陽明少陽合病必自下利則下利似乎合病當然之證今不下利而嘔又似乎與少陽合病矣於葛根湯加半夏兼解少陽半裡之邪便不得為三陽合病

徐靈胎曰前條因下利而知太陽陽明合病今既不下利則合病從何而知必須從兩經本證一一對勘即不下利而亦可定為合病矣

陳脩園曰太陽與陽明合病其機關全在乎下利而茲不下利而但作嘔者當求其說蓋太陽主開陽明主闔令陽明為太陽所逼本闔而反開開於下則下利開於上則為嘔即以葛根加半夏湯主之蓋以半夏除結氣以遂其開之之勢而利導之也此一節承上節而言

太陽合於陽明不下利而但嘔也二節言太陽與陽明合病重在太陽之關一邊與下章合
病用麻黃法不同

葛根加半夏湯方

葛根四兩

麻黃三兩

湯泡去汗汁培乾秤

桂枝二兩

芍藥二兩

甘草二兩

生薑三兩

兩

大棗十二枚

半夏半升

洗平

右八味以水一斗先煮葛根麻黃減二升去白沫內諸藥煮取三升去滓溫服一升覆取微似汗。

周禹載曰中風傷寒自有定則令雖嘔而無汗出證所以不用桂枝加葛根湯而仍用葛根湯加半夏者正以麻黃葛根祛兩經之寒邪半夏主上氣嘔逆消心膈痰飲也可見同一邪也嘔者上逆則不下走上條下利則不上逆倘有兼之者其勢已甚恐又非此湯可以治之也止嘔隨病立方各有法度

徐靈胎曰後條太陽誤下而成利則用芩連治利因其本屬桂枝證而脈促故止加葛根一味以解陽明初入之邪此條乃太陽陽明合病故用葛根湯全方因其但嘔加半夏一味以止嘔隨病立方各有法度

太陽病桂枝證醫反下之利遂不止脈促者表未解也喘而汗出者葛根黃連芩湯主之成無己曰經曰不宜下而便攻之內虛熱入協熱遂利桂枝證者邪在表也而反下之虛其

腸胃為熱所乘。遂利不止邪在表則見陽脈邪在裡則見陰脈下利脈遲微邪在裡也促為陽盛雖下利而脈促者知表未解也病有汗出而喘者為自汗出而喘也即邪氣外甚所致喘而汗出者為因喘而汗出也即裡熱氣逆所致與葛根黃連黃芩湯散表邪除裡熱方中行曰利與後桂枝人參湯證條同而後條用理中者以痞鞭脈弱者屬寒也此用芩連者以喘汗脈促屬熱也

喻嘉言曰太陽病原無裡證但當用桂枝解外若當用不用而反下之利遂不止則熱邪之在太陽者未得傳陽明之經已入陽明之府所以其脈促急其汗外越其氣上奔則喘下奔則泄故舍桂枝而用葛根專主陽明之表加芩連以清裡熱則不治喘而喘自止不治利而利自止又太陽兩解表裡之變法也

張隱菴曰高子曰上三節乃太陽經脈之從上而下者復可從下而上此言太陽腠理之從外而內者亦可從內而外也太陽病桂枝證者病太陽之氣而涉於肌腠也醫反下之則妄傷其中土以致利遂不止脈促者太陽陽氣外呈不與裡陰相接故曰表未解也喘而汗出者乃肌腠之邪欲出於表故宜葛根黃芩黃連湯王之葛根甘草從中土而宣達太陽之氣於肌表黃芩黃連清裡熱而達肺氣於皮毛

張令韶曰下後發喘汗出乃天氣不降地氣不升之危證宜用人參四逆輩仲師用此方專在表未解句雖然仲景之書豈可以形迹求之耶總以見太陽之氣出入於外內由外而入

者亦可由內而出外此立證立方之意也

周禹載曰桂枝證誤下利遂不止者因邪未入裡而胃已受傷以下分兩段看設使脈促則雖下利而表邪尚在仍當與以桂枝矣。被以喘而汗出則外邪內陷未傳陽明之經已入陽明之府故令其汗外越其邪上侵則喘下奔則泄自與微喘者不同故舍桂枝而用葛根取其因勢達外本府本經之為便也且即用芩連以寒蕩其熱者因脈數而止者為之促令脈促矣不急祛其熱喘汗何由止耶。

汪琥曰誤下虛其腸胃為熱所乘遂利不止此非腸胃真虛證乃胃有邪熱下通於腸而作泄也脈促者脈來數時一止復來也此為陽獨盛之脈也脈促見陽知表未解此表乃陽明經病非猶太陽桂枝之表證也喘而汗出者亦陽明胃府裡熱氣逆所致非太陽風邪氣壅之喘亦非桂枝湯汗出之喘證也故當解陽明表邪清胃府裡熱也

柯韻伯曰桂枝證上復冠太陽見諸經皆有桂枝證是桂枝不獨為太陽設矣葛根豈獨為陽明藥乎桂枝證脈本弱誤下而反促者陽氣重故也邪束於表陽擾於內故喘而汗出利遂不止者所謂暴注下迫皆屬於熱與脈弱而協熱下利不同此微熱在表而大熱入裡固非桂枝芍藥所能和厚朴杏仁所宜加矣故君葛根之輕清以解肌佐連芩之苦寒以清裡甘草之甘平以和中喘自除而利自止脈自舒而表自解與補中逐邪之法迥別後人參桂枝證條脈證是陽虛此條脈證是陽盛後條表熱裡寒此條表裡俱熱後條表裡虛此條表裡

俱實同一協熱利同是表裡不解而寒熱虛實攻補不同補中亦能解表亦能除痞寒中亦能解表亦能止利神化極矣

金鑑曰太陽病桂枝證宜以桂枝解肌而醫反下之利遂不止者是誤下遂協表熱陷入而利不止也若表未解而脈緩無力即有下利而喘之裡證法當從桂枝人參以治利或從桂枝加厚朴杏仁湯以治喘矣今下利不止脈促有力喘而汗出表雖未解而不惡寒是熱已陷陽明即有桂枝之表亦當從葛根黃芩黃連湯主治也方中四倍葛根以為君芩連甘草為之佐其意專解陽明之肌表兼清胃中之裡熱此清解之兼解表裡法也

陳脩園曰太陽病頭項強痛自汗惡風為桂枝證病在肌也醫反下之致太陽之邪由肌而內陷利遂不止然邪雖內陷而氣仍欲出具脈急數中時見一止而無定數其名為促脈促者表邪未能逕出而解也邪欲出而未能逕出則喘喘則皮毛開發而汗出者此桂枝證誤治之變既變則宜從變以救之不可再用桂枝湯而以葛根黃芩黃連湯主之此一節言太陽證雖邪已陷亦可以乘機而施升發使內者外之按素問移精變氣論云粗工凡斯之謂興故病未已新病復起其斯之

唐容川補曰此節提出桂枝証以別於上節麻黃証之太陽病也上二節是傷寒以見此一節是傷風風在肌肉陽明所司之界本能翕翕發熱若誤下之則熱邪內陷為協熱下利與上節之必自利者不同何以知其與上節之寒利不同哉蓋寒脈不數令已其脈數而歇至

名之為促所以促者因熱內陷而表未解故邪欲出而不得出是以促急也。熱氣逆於肺則喘。熱氣蒸於肌腠則汗出此太陽陽明協熱下利之證故用葛根黃連黃芩湯治之與上二節用葛根以治寒者不同讀者正須互勘。

葛根黃連黃芩湯方

葛根半斤

黃連三兩
苦寒

黃芩三兩
苦平

甘草二兩

按黃芩一本
作二兩

右四味以水八升先煮葛根減二升去上沫內諸藥煮取二升去滓分溫再服。按成無己曰內經曰辛甘發散為陽表未解者散以葛根甘草之辛甘苦以堅裏氣弱者堅以黃芩黃連之苦。

周禹載曰太陽誤下脈促未解曷為不用桂枝而用葛根利不止熱邪因下而入陽明府矣但有未盡之表恐其盡入則以本經之藥提出之太陽誤下而喘又曷不用杏仁厚朴而改用芩連利而脈促熱邪因下而停陽明府矣既有內滯之熱未必下走故以芩連之寒蕩滌之然後知下利脈促喘汗皆因熱入也不去甘草和其中也。

徐靈胎曰促有數意邪猶在外尚未陷入三陰而見沉微等象故不用理中等法因表未解故用葛根因喘汗而利故用芩連之苦以洩之堅之芩連甘草為治病之主藥。

陳蔚曰太陽桂枝證而反下之邪由肌腠而內陷於中土故下利不止脈促與喘汗者內陷之邪欲從肌腠外出而不能出湧於脈道如疾行而蹶為脈促湧於華蓋肺主氣而上喘肺

主皮毛而汗出方。主葛根從裏以達於表。從下以勝於上。輔以芩連之苦。苦以堅之。堅毛竅而止汗。堅腸胃以止瀉。又輔以甘草之甘。妙得苦甘相合。與人參同味而同功。所以補中和而調脈道。真神方也。

太陽病頭痛發熱身疼腰痛骨節疼痛惡風無汗而喘者麻黃湯主之

成無己曰此太陽傷寒也。寒則傷營。頭痛身疼腰痛以至牽連骨節疼痛者。太陽經營血不利也。內經曰。風寒客於人使人毫毛畢直。皮膚閉而為熱者。寒在表也。風並於衛。衛實而營虛。自汗出而惡風寒也。寒並於營。營實而衛虛者。無汗而惡風也。以營強衛弱。故氣逆而喘與麻黃湯以發其汗也。

方中行曰。此申上三條而更互言之所以致其詳而出其治也。頭痛已見太陽病。而此猶出者。以其專太陽而主始病也。上條先言或已發熱。或未發熱。而此先言頭痛。次言發熱者。則是以其已發熱者言也。身腰骨節疼痛即上條之體痛而詳之也。上條言必惡寒。而此言惡風者。乃更互言之。與上桂枝湯證條嗚嗚惡寒。淅淅惡風。雙閨互文之意同。無汗乃對上條之有汗言。以見彼此相反。所以為風寒之辨别不然。無是證者。則不言也。然所以無汗者。汗乃血之液。血為營。營強則腠理閉密。雖熱汗不出也。喘氣逆也。衛主氣。衛弱則氣上逆。呼吸不利。而聲息所以不遂也。然上條言嘔。而此條言喘。嘔與喘皆氣逆。亦互言以明互見之意。按收

熱汗不出似未妥。故無汗註營強雖