

方劑癰瘍部
諸傷部
目部
附錄

醫林纂要探源
卷拾全

省中醫藥學會藏書

編號 11-93 $\frac{10}{10}$



拾冊全

醫林纂要探源卷十目錄

方劑

癰瘍部

金銀花酒

蠟礬丸

連翹湯

再見

羌活散

人參敗毒散

托裏散

十宣散

再見

當歸消毒飲

飛龍奪命丹

托裏溫中散

回毒金銀花湯

托裏黃芪湯

止痛當歸湯

十全大補湯

再見



八珍湯

生肌散

黃連生肌散

桃花生肌散

消癰化堅湯

散腫潰堅湯

龍膽瀉肝湯

再見

救腐湯

山豆根飲

雄黃解毒丸

桔梗湯

再見

皂莢丸

保肺湯

桂枝去芍藥加皂莢湯

加味紫菀湯

逍遙散

三見

清庚丸

清丙湯

丁壬湯

阜蛤丸

知乳湯

化巖湯

解懸湯

少陽湯

督會湯

釋擎湯

釋糾湯

釋擔湯

祛寒去溼湯

加味腎著湯

利樞湯

顧步湯

秦艽白朮湯

再見

黑地黃丸

石膏解毒丸

拔疔散

緩脣湯

天葵飲

防己散

涼膈散

再見

黃連解毒湯再見

葛根白朮散

防苓湯

土茯苓湯

羊肉大黃湯

瀉毒散

破結湯

藥桂湯

腎氣湯

蕲蛇酒

掃毒丸

血風瘡方

膿窠瘡方

疥瘡方

癬方

病指方

癩瘡方

足瘡流黃水方

足凍龜裂方

鐵箍散



天烏散

驚毒掩

綠松膏

百靈膏

百靈丹

凡八十方

內複見九

諸傷部

乾薑膠艾湯

軍門方

續絕湯

續絕膏

續絕丹

升降飲

獨白散

慈蜜掩

大治湯

鼠璞散

出箭鏃方

蒲灰酒

三黃解毒湯

見三

秋葵油

見再

伏虎散

降龍湯

斑螫酒

蠍傷方

蜈蚣傷方

壁虎傷方

蚯蚓毒方

蜘蛛毒方

誤吞水蛭方

毛蟹蟲螫方

中蠱毒

中砒毒

中鉛粉毒

中鹽鹵毒

中葷毒

中蒙汗藥

諸骨鯁

吞髮繞喉

誤吞銅鐵錫

諸蠱入耳

凡三十四方

內複見二

目部

生熟地黃丸

益氣聰明湯

定志丸

再見

地芝丸

洗肝湯

補肝散

補肝行血湯

防風明目湯

羊肝丸

濟生

羊肝丸

類苑

望月砂湯

二百味草花膏

百點膏

圓明膏

點眼方

浴日方

扶桑浴日方

濟陰清露

棗礬膏

慈尖薄荷湯

吹水法

飛絲芒塵入目方

凡二十三方

內複見一

附錄

行狀

墓表

儒林傳

跋



醫林纂要探源卷十

婺源汪紱雙池輯後學

吳縣徐大彬子丹
吳縣吳大彬子丹
同邑程夢元
溧陽強汝諤
元和管禮昌
慈谿林頤山
晉霞

同校字

方劑

癰瘍部

內經曰。榮氣不從。逆於肉裏。乃生癰腫。又曰。諸瘡痛痒。皆屬心火。夫人生陽也。元陽之動。即火也。無火。則人不生矣。然而過動。則生氣反傷。蓋陽倡陰和。氣血相從。條暢周流。自無所謂火。故丹溪曰。氣有餘。便是火。是火生於陽之過動耳。氣無所謂有餘。有餘者。不平之謂也。丹溪曰。癰疽皆因陰陽相滯而生。蓋血行脈中。氣行脈外。相並周行。而寒濕搏之。則凝滯而行遲。熱與火搏之。則沸騰而行速。遲為不及。速為太過。氣得邪而鬱。津液稠黏為痰。為飲。積久滲入脈中。血為之濁。此陰滯於陽也。血



得邪而鬱。隧道阻塞。或溢或結。積久滲出。外氣爲之亂。此陽滯於陰也。百病皆然。不止癰疽而已。夫丹溪所謂陰陽相滯。卽內經之所謂榮氣不從相滯之故。雖有寒濕火熱之不同。而血濁氣亂。則總之爲火。火本於命門。而行於五臟。總攝於心。故經云諸瘡痛痒。皆屬心火。實火多痛。虛火多痒。此則過不及之分。諸家之論。每多歧視。不若丹溪之說爲最精。但氣血之相滯。不獨得於寒濕火熱。而七情色慾之傷爲尤甚。大抵外得之六淫者爲陽。內起於七情者爲陰。六淫之以氣滯血者爲陽。之陽以血滯氣者爲陰。七情之鬱於憂思恐懼而氣血以滯者爲陰。之陰動於憤怒色慾而氣血以亂者爲陰。之陽毒發於陽者爲癰。發於陰者爲疽。發於陽者多痛。發於陰者多痒。發於陽者毒淺而急。發於陰者毒深而緩。發於陽者多在背脊頭面。發於陰者多在腹足隱伏。此須以錯綜經絡。參互求之。而治之之法。在陽者宜發其毒。乃可治以寒涼解毒之品。在陰者則必宜大爲溫補。托出陽分。然後爲解其毒。陽實者可用散表。陰虛者必宜補中。由是而知通變焉。則思過半矣。至於癰疽之

金銀花酒

可治一切癰疽惡毒
初起時即當服之

所發。脈絡尤不可不爲分辨。如背脊頭頂。太陽經。兩鬢耳後目旁。少陽經。口齒頤項陽明經。上胸前。股內陰處。三陰經。正脊頂中鼻梁督脈也。纂間。足衝任也。陰器足膝厥陰也。手足外廉陽經也。手足內廉陰經也。知分經所在。乃用藥引經。如二活麻黃。行於太陽。葛根升麻。行於陽明。柴胡行於少陽。蒼朮行於太陰。細辛行於少陰。川芎行於厥陰。牛膝行下。桂枝行手。菖蒲行耳。白芷行面。薄荷行目。藁本行督脈巔頂。辛夷行鼻。秦艽行二陰。纂間之類。皆不可不詳辨。其若虛實寒熱陰陽之辨。既視形體。尤必以診脈爲憑。在外雖可敷可掩。可用膏塗。不得已乃用針刀。此其下策。而在內必用湯藥。今之外科。操刀針貼膏藥而已。縱用湯藥。亦不知虛實陰陽之辨。而猥云解毒。幾何不殺人也。外科方藥甚夥。治證各有專方。茲編所不悉錄。錄其可示法者數十方。以示人知所則倣及變通耳。

金銀花

五兩生用則力速。無生者乃用乾者。莖葉皆可。而花尤良。芳馥之氣味。固在花也。○甘苦微寒。

清熱解毒。其甘能養血補虛。其香能破鬱行氣。為癰瘍家主藥。

生甘艸

一兩○補中平肝。厚脾扶

胃。且解百毒。

水二盃。煎一盃。再加酒一盃。略煎。

藉酒之辛散。以行於衛間。

分三服。一日一夜盡劑。重者日二劑。大小腸通利。則藥力到矣。外以生者搗爛。酒調敷毒四圍。

癰疽之發。非一端。而總之曰榮衛不從。逆於肉裏。血氣相逆。則動為火。故金銀花酒可以統治諸瘍。芬芳以行氣。甘寒以養血。甘平以解毒。苦寒以泄火。厚土和中。兼調五臟。及初起而治之。宜其無智名。無勇功。用力不多。而效建矣。

此是初起治法。非謂執此一方。他藥可以不用也。

蠟磬丸

李迅

治一切瘡癰惡毒以及毒蟲蛇犬所傷皆宜先服此丸以護膜托裏使毒不攻心

黃蠟

二兩○甘淡瀉益心收散滲濕解毒固氣和血安養精神

白磬

一兩○鹹酸寒瀉補心收

散散清穢濁軟堅破瘀解一切毒

先鎔蠟俟少冷入磬

磬自化

和勻為丸

酒下

藉酒以竟入心

每服十丸二十丸漸加至百丸

丸如梧桐子大者

則更有力毒愈後服之亦佳

加雄黃一兩名雄磬丸治蠱毒及蛇犬傷

心為君主外邪所不易犯然至氣血相逆動而為火則

火毒未有不干於心者心固又火之宗也毒至歸心則

命必斃矣蠟磬丸以托裏護心猶四方有警必宜厚衛

京師以安天子固根本且蠟磬丸又皆有解毒排膿止痛

之功。故惡毒癰疽宜先服此。

連翹湯

凡癰毒瘡腫。身體壯熱。小便赤濇。是皆寒濕所感。凝滯於血。使血熱而氣亂也。血熱則心熱。心熱則遺於小腸。此方以表外邪而泄血熱。

方已見嬰兒部。瘡腫血熱也。血熱何以腫。血溢脈外。而

氣亂滯不行也。血何以熱。則或風或寒或濕或火。淫入

於脈而榮氣不從。則熱生也。熱總於心。心遺小腸。心包

遺三焦。故血熱者小便必濇。荊芥去血中風熱。防風逐經隧風熱。柴

胡收寒熱之邪於陰部而散之。蟬蛻去皮膚風熱。以去其外滯之淫。而連

翹散心火。瞿麥瀉心火。木通泄小腸火。滑石山梔瀉三焦火。黃芩瀉肺火。

以泄其熱。當歸赤芍以和其血。使邪由表達。熱自下泄。則氣血平也。

羌活散

瘡腫癰毒壯熱。得自外淫。滯於氣分。淫入榮血。血為之濁。氣熱則喘急脹滿。胸膈閉悶。心志不甯。此方以表外邪而平氣熱。

羌活

氣雄而達肌表。

獨活

氣專而行脈裏。此皆以去外邪。

前胡

降逆氣而使之順下。

柴胡

達鬱氣而使之上散。

川芎

行血中之氣。清血中之濁。

桔梗

降泄肺氣。

枳殼

寬胸膈氣。

天麻

補肝而除風熱。

地骨皮

滋陰以清血熱。

茯苓

滲濕

且以甯心。

人參

凡氣滯而憤鬱。皆氣之不足。非氣之有餘。氣足則不受淫矣。又壯熱則火食氣。此表

劑也。過表則內虛。恐無以和氣血。故用人參。各等分。

甘艸

減半

加生薑薄荷煎。

