

醫學從眾錄

會文堂書局
印行 卷三

天蛤津膠骨 治遺精用天蛤糊用以女兒津調貼臍內立止

思仙丹略觀性 治陰虛火動夢遺神方

蓮藕 石蓮肉去心青剉 共實各十兩 右為末再以金櫻子三兩去毛子水淘淨入大鍋內水煎過再煎加

鉅糖和勻前藥丸如桐子每服七八十九

封龍丹 治遺精

砂仁一兩 黃柏三兩 甘草炙七 右末煉蜜丸

四君子湯方見 原方加龍骨牡蠣蓮藕

溫肝湯 即二陳湯加竹茹三錢枳實八分

赤白濁

濁者渾濁之謂也方書多責之腎而余獨求之脾蓋以脾主土土病濕熱下注則為濁病濕勝於熱則為白熱勝於赤則為赤治之之法不外導其濕熱去而濁自清矣蒼白二陳湯加黃柏石菖蒲單解主之久患不愈宜求之腎以二妙地黃丸與單解分清飲間服又內經云中氣虛而溺為之變宜四君子湯補中益氣湯加減主之又有命門火衰氣不攝精致敗精為濁宜以八味溫其命火加兔絲子車前子導其敗精總之濁出精敗與淋出溺者不同病之稍久宜固腎不宜利水此要旨也後元水陰二仙丹之理

蒼白二陳湯

蒼朮炮 白朮 茯苓 半夏各二 陳皮 甘草 黃柏略 一 單解三錢 石菖蒲八分 水煎空心服

如赤濁加連翹一錢五分丹參二錢蓮子心五分 如脈弦脇痛為肝火加龍胆草梔子各一錢如口渴氣喘脈滑是為肺火加麥冬三錢桑白皮紫苑各二錢五分 如咽痛脈沉為腎火加元參三錢 次男元厚按此方妙在平

夏升清降濁熱讀本草經者自知

二妙地黃丸

熟地 山茱萸 蒼朮 山藥 茯苓 丹皮 澤瀉 黃柏 蜜九桐子大每服三五

錢日二服鹽湯下 或加牡蠣二兩益智仁二兩兔絲子二兩車前子七錢

草解分清飲 治真元不固赤白濁

將軍聖方 治白濁兼治夢遺

生大黃 生雞子一個 將雞子頂尖上敲破一孔入大黃末在內紙糊坎熟空心吃之四五朝即愈

龍牡兔韭丸 治已慾過度赤白濁小便水長而不痛并治婦人虛寒淋帶崩漏等症

生龍骨 牡蠣水 生兔絲粉 生韭子粉 右四味各等分不見大研細末乾地冷水調漿為丸每服

一錢或至三錢晚上陳酒送下清晨服亦可

蠶黃柏湯 治遺精白濁有熱者

生蠶沙一兩 生黃柏一錢 二味共研末空心開水二三錢六七服即愈

白果蛋方 治白濁同頭生雞子一個開一小孔入生白果肉二枚飯上煮熟每日吃一個連吃四五次即愈

龍骨韭子湯 治遺精滑失

白龍骨 韭子 右為末空心陳酒調服三錢

小兒練石蓮丸 治女癆夜及遺精白濁崩中帶下諸證

兔絲子 石蓮肉 白茯苓 右為細末山茱萸為丸桐子大每服五十丸加至一百丸或酒

或鹽湯空心送下如脚無力木瓜湯下晚食前再服

龍連大寶丸臨製治精氣虛滑遺不禁

龍骨 連梅 大寶 烏梅肉 各等分爲末用山前丸如小豆大每服三十丸空心水飲下

癰閉五淋

癰閉者小便熱滴不通甚而爲脹爲腫喘滿欲死五淋者小便痛澀淋瀝欲去不去欲止不止有沙膏氣血勞五種之分癰閉用利水之藥人所知也若愈利而愈閉脹悶欲死宜治其本經云膀胱者州都之宮津液藏焉氣化則能出矣今小水點滴不能出病在氣化可知桂枝直走太陽而化氣此症實不可缺陰虛不化熱逼膀胱小腹脹痛尺脈旺宜服滋腎丸主之陽虛不化寒結膀胱小腹不痛尺脈弱宜加滋腎氣丸主之然猶恐未能即効又有巧法以施譬之滴水之器閉其上而倒懸之點滴不能下也去其上之閉而水自通流宜以補中益氣湯提之即以此藥再煮服盡以手按之其閉即通而水自下其外氣即平矣此方狂能通陽氣於至陰之下肺主皮毛配杏仁以降氣肺氣下達州都水必自高原之義也以八正散加此二味其應如響如夏月不敢用麻黃恐陽脫而汗漏不止以蘇葉防風杏仁三味等分水煎溫服覆取微汗而水即利矣此藥能治虛者以人參麻黃各一兩煎服神効此藥如汗多不任再散者即以紫苑桑皮各三錢麥冬五錢加於利水藥中或加於升提藥中亦効此藥皆下病上取之法也治水腫者可遵此法以治其標即以六君子湯去甘草如金匱厚朴桂枝湯以祛脾氣以復元氣

淋症有五方治甚多而總不外熱熱以景岳大分清飲主之石淋下如沙石合益元散更加琥珀或石首魚頭肉

石子五六個研末調下膏淋下如膏脂加草薢海蛤粉各二錢石菖蒲八分氣淋氣滯不通臍下妨悶脹痛加

荆芥二錢香附生參各一錢不愈再加升麻或用吐法血淋瘀血停蓄莖中刺痛難忍加牛膝生地當歸桃仁

各三錢紅花川芎各一錢不愈另用牛膝膏勞淋從勞役而得氣化不及州都本方合補中益氣湯同煎服以

上五淋俱屬熱所致又有一種名曰冷淋四肢口鼻冷喜飲熱湯以加味腎氣主之更有過服金石熱藥致精

為淋與老人陽已痿而急色以除其精則精不出而內癰以致大小便牽痛如淋愈痛則愈便愈後則愈痛宜前飲加身解更子石為通遠志以導之後服六味丸

脉息與通

宜子大

忌沉細

方

滋腎丸

治小便澀澀不通及治衝脈上逆喘呃等證

補中益氣湯

治一切氣虛下陷

加味腎氣丸

大分清飲

茯苓

澤瀉

木通

諸苓

地子

枳殼

車前子

或加甘草稍一錢

八正散

治諸淋

瞿麥

梔子

扁蓄

大黃

滑石

木通

車前子

甘草

加燈心一錢水煎服

牛膝膏

治死血作淋

桃仁

桂枝

歸尾

牛膝

白芍

生地

水十鍾微火煎至二碗入麝香少許四次空心

服如夏月用涼水浸此膏不燥

附用諸方

枯蘆根丸

小便不利者有水氣其人若渴此主之

胞轉方

治丈夫女人胞轉不得小便八九日者

滑石

寒水石

茯苓

以水一斗煮五升服盡即利

治石淋方用車前子一兩以水八升煮取三升空心頓服之須臾當下石子宿勿食服之良驗

治熱淋方 銚兒干 用白茅根銚兒干水一斗五升煮取五升每服一升日三夜二

治血淋方 用生芒根五兩水六杯煎三杯每服一杯一日三服

治血淋方 用天青地白草五兩水二杯煎八分空心服一日兩服

田螺青鹽骨 治中者大小便不通用田螺三枚搗爛入青鹽三兩搗成膏貼在臍下一寸即愈

獨蒜梔子貼臍膏治小便不通

獨囊大蒜 梔子二箇 鹽匙一 共搗敷臍中良久覺通若不通敷陰囊上即愈

五淋湯

龍膽瀉肝湯治諸瘡口苦耳聾筋痿陰陽熱瘕陰腫白濁浸血

心痛

心痛即胃脘痛也心為君主之官本不受邪若受邪而痛是真心痛手足青至肘作夕死痛有九種宜細辨而藥之

氣痛脇沉而滿諸氣鬱滯及七情過用所致宜二陳湯加沉香烏藥百合主之

加味二陳湯

陳皮一錢 沉香五分 百合五錢 生薑三片 水煎服 百合

公衆辦而成有百勝一索之象其色白而入肺肺主氣肺氣降則諸氣俱調此醫書所不載余得之海外奇人屢試

屢效 或無凡香即同紫蘇葉一錢代之

血痛肺浮沉候其痛如刺不可按抑或寒熱往來大便黑宜失笑散主之就時 長孫男心典按候熱者加梔子三

錢高良薑一錢煎湯送下寒者以肉桂一錢煎湯送下

疾痛即飲痛脉滑嗽其痛游走無定宜二陳湯加乾薑五錢瓜蒌皮二錢主之

火痛脉數而實口渴面赤身熱便秘其痛或作或止宜金鈴子散時主之如火盛者用梔子二錢川椒丁去核黃連

良薑澤瀉丹麥各一錢香附一錢五分水煎服

冷痛脉遲而微細手足俱冷其痛綿綿不休喜用熱手按者宜桂附理中湯加當歸二錢以濟其剛木通一錢以通其

絡入也

虛痛即悸痛脉浮而小細或沉而短滿其痛重輕相間多日不愈心悸最喜厚按得食小愈飢則更痛宜歸脾湯加石

葛蒲一錢木香五分主之

注痛入山林古廟古墓及感一切異氣而痛其人語言錯亂其脉乍大乍小左右手若出兩人宜平胃散加藿香二錢

八些小蘇香服之

蟲痛脉如平人其痛忽來忽止聞肥甘之味更痛開食而痛按厚稍止古上有白花點年力壯者以景

岳掃蟲煎主之虛弱者以理中湯去甘草加烏梅二枚川椒一錢五分吳茱萸黃連肉桂各一錢當歸二錢主之

食積食積停滯嘔腐吞酸惡食腹滿其痛或有一條如起者腹實而滑右關更實宜平胃散加山查麥芽半錢各二錢

脹甚者更加萊菔子生研一錢水煎服如初病食尚在胃服此湯即以手探吐之

又簡易方

藜香散 治心痛甚效婦人尤效服數次可以除根

藜香枝一兩二 木香七錢不 共研末茶湯或開水或酒下二錢

皂角散 治胃脘劇痛百藥不效服此即止

并皂角子生研 每服一錢燒酒送下此可偶服不可常服

迎山方 治胃脘痛多致

草果 元胡索 五靈脂醋炒 沒藥炒 共研末酒調下二三錢

柳蠹煎 治蟲上攻胸腹作痛

青皮 吳茱萸 茴香炒 檳榔 烏藥各一錢 細梗肉三錢 烏梅二枚 甘草八分 硃砂

雄黃炒 水煎入雄黃硃砂末調服 先咬肉脯少頃服藥

靈脂厚朴散 治心頭痛欲死不可忍者

靈脂 良薑 厚朴薑汁炒 右等分為細末每服一錢酒下即止

黑鼠胡椒散各見種 治心口胃脘痛 用大黑鼠去核每個中間入胡椒七粒仍將鼠已好炭火上煨焦黑存性研

末每服四分陳酒送下三四服必愈如木香枳殼紅花當歸五靈脂少許更妙

黑鼠丁香湯種 治胃寒嘔吐并治寒瘧用大黑鼠七枚去核每個納入丁香一粒煮爛去丁香將鼠連湯空心服

七服見效

腹中上下諸痛

腹中上下諸痛寒熱虛實皆能致之溫清消補及發求果諸法皆所以止痛故止痛無定方也今因醫學真傳所位分析清楚亦是認證之捷徑故全錄之噫金匱諸法何等精詳十載研窮致誤迂闊今亦窮而知返也然古聖賢章程終不敢廢編中所錄雖曰從時亦從純而不從肆于上之道也

心痛

心為君主而藏神不可以痛今云心痛乃心色之絡不能受通於脈故也此痛有方今因金匱高士宗此痛存之心為心脈之上則為胸膈胸膈痛乃上焦失職不能如霧露之溉則胸膈而痛雖白薑仁貝母豆蔻之藥可以開

胸痹以止痛 兩乳之間則為肝胸膈痛者乃肝血內虛氣不充於期門致衝任之血不能從膈胸而散則痛當歸
曰芍紅花銀花續斷木香之無可和氣血而止痛 有中脫管痛手不可近者大乎不可近乃內外不和外則氣氣
於皮毛內則垢濁停於中脫當審其體之虛實而施治莫若以桂枝當痛處熨十餘點則寒結去而內外通便不痛矣
有中脫之下當陽明胃土之間時痛時止者乃中土虛而胃氣不和若行血消洩之劑服之過多更宜溫補但以手
重按之則痛稍平此中土內虛虛而且寒之明驗也 中脫乳下兩脅骨盡處痛者乃上下陰陽不和少陽經轉不
利也傷寒病中每多此痛當助其經轉和其氣血上下通調則愈矣 經小結喉 大腹痛者乃太陰脾土之部痛在內
而緩坤土虛寒也痛在內外而急脾絡不通也蓋脾之大絡名曰大包從腰腹而外出於絡脉今脾絡不通不行則內
外皆痛太陽篇云傷寒陽脈濡陰脈弦法當腹中急痛先與小建中湯不差者與小柴胡湯此先補益於內而後經轉
於外也 臍旁左右痛者乃衝脉病衝脉當臍左右若為寒氣所凝其衝脉之血不能上行外達則當臍左右而痛當
用血分之藥使臍中之血通達肌表若用氣藥無裨也 臍下痛者乃少陰水厥太陽水府不得陽熱
之氣以施化致陰寒凝結而痛少陰虛寒當用附子肉桂以溫之太陽水府虛寒亦當用附子桂枝以溫之蓋太陽與
少陰相為表裏互為中見者也 亦有大通脈散 小腹兩旁痛之少腹少腹痛者乃厥陰肝臟之部入為臍中之血海益
臍中之水主於少陰而臍中之血主於厥陰也痛者厥陰肝氣不合臍中之血而上行也肝臟不虛者當疏通以使之
上肝臟虛者當補益以助其下蓋厥陰不從標本從中見少陽之氣使厥陰上合于少陽則不痛矣 兩旁身脇痛者
肝氣虛也 肝氣兩脇之上痛者少陽之氣不和也 肝氣虛者當補益以助其下蓋厥陰不從標本從中見少陽之氣使厥陰上合于少陽則不痛矣 兩旁身脇痛者
血氣不和也 或則兩脇少則氣滯不舒 又高士宗云兩脇之部有氣血陰陽之不同若概以行氣消滯為治
漫云通則不痛夫通則不痛理也但通之之法 月不同調氣以和血調血以和氣通也下逆者使之上行中結者使
之旁達亦通也虛者助之使通寒者溫之使通無非通之之法也若必以下逆為通則妄矣

附錄備用方

桔梗白白酒湯治見胸膈喘急咳嗽胃脘痛短氣寸脈沉而遲關上小緊方中加半夏二錢名桔梗白半夏

湯治胸膈不得卧心痛微痛

小建中湯大建中湯治心胸大寒痛嘔不能飲食腹中寒上衝皮起出見有頭足上下痛不可觸近長

孫心典按上中二焦為寒邪所痹故以參薑散上焦之陽合饴糖以建立中氣而又以椒桂下行降逆上之氣復下焦之陽為溫補主方

附子梗米湯腹中寒氣雷鳴切痛胸脇逆滿嘔吐徐忠可曰此方妙在梗米和而且痛腹中有寒氣也乃滿不在

腹而在胃膈是邪高痛下寒邪實從下而上所謂腎虛則寒動於中也故無嘔逆而不發熱以附子溫腎散寒半夏去嘔逆只用梗米合甘棗調胃建立中氣不用水恐壅氣也

大黃附子湯脇下偏痛發熱其脈弦此寒也按痛而滿滿連脇下而六脈弦緊非附子不能溫其寒非

大黃不能攻其實非細辛不能散其結聚三藥實並行不悖也

厚朴三物湯痛而閉者此湯主之

當歸生薑羊肉湯治見寒濕腹中痛及脇痛裏急者亦治產後腹中病痛一按寒多者加生薑二錢痛多而嘔者

加陳皮五錢白朮二錢五分

煖肝煎治肝腎虛寒小腹疼痛等症

當歸仁三 枸杞三錢 茯苓 烏藥 小茴香二 肉桂錢二 沉香一錢或水 生薑三錢 水煎服

按此方加防風細辛桃仁山萸肉治肝虛脇痛有奇效

枳實散 治左脇刺痛

枳實 川芎 炮五 炙甘草 二錢 為末每服三錢薑湯下

推氣散 治右脇疼痛脈滿不食

薑黃 枳殼 炮 桂心 炮五 炙甘草 二錢 為末每服三錢薑湯下

嘔吐噦

吐者有物無聲噦者有聲無物嘔者聲物俱出總屬於胃時醫以二陳湯加藿香砂仁統治之雖是腐淺活套而不碍理余亦從之但當分別寒熱虛實寒者加減耳寒者口和身冷或兼腹痛脈必遲細吐出如多有冷氣宜再加吳茱乾薑丁香之類熱者或為熱渴或為煩燥脈必洪數吐必湧猛形氣聲色必皆壯厲宜再加黃芩黃連參苓沙參竹茹之類實者或因食滯必多脹滿宜再加厚朴山楂麥芽神麴之類或因氣逆必痛連脇肋宜再加撫芎香附紫蘇連翹之類或另用左金丸通逆散之類寒者邪自外至必頭痛發熱宜倍用生薑寒者邪不在表無心下痞者宜二陳湯加黃芩黃連乾薑人參大棗微半夏瀉心湯之意兼見腹滿便硬者二陳湯加厚朴大黃微承氣湯之意若在平素寒必見口苦寒熱往來宜另用小柴胡湯治之虛者胃氣虛也或命門火氣虛也宜二陳湯加香砂外重用人參白朮以補胃氣不愈更加乾薑附子吳更以溫補命門或以八味丸滋補命門直火隨宜變通景岳云無實無火而嘔吐者胃虛也或誤服寒涼而嘔吐者胃虛也食無所停聞食則嘔者胃虛也氣無所逆聞氣則嘔者胃虛也或食入中焦而不化者胃虛也食入下焦而不化者命門虛也然胃本屬土非火不生非煖不化是土寒即土虛也土虛即火虛也脾喜煖而惡寒土喜燥而惡濕故張石頑治虛寒嘔吐每用伏龍肝兩許煮湯澄清代水煎藥可謂得治吐之大要矣治泄瀉亦不外此理而吐呃亦屬胃虛宜於六君子湯去甘草加黃連乾薑蜀椒之類

次男元屏按仲景旋覆代赭石湯本以治心下痞噯氣不除今於嘔吐不止之症借用甚效者取其重以平薑黃連黃芩人參湯本以治寒邪隔熱於上焦今於食入即吐之症取用甚效者以乾薑散上焦之

之熱人參通格逆之氣而調其寒熱以至和平不用生薑半夏者胃氣虛不堪平散不用甘草大棗者嘔不宜甘也
又吳茱萸湯治陽明食穀欲嘔又治少陰病吐利手足逆冷煩躁欲死又治乾嘔吐涎沫頭痛三症如神蓋取吳茱
萸大熱宜入厥陰能降氣而消陰翳人參扶其生氣薑棗和其胃氣使震坤合德土木不害而嘔吐平矣 噦者胃
中虛冷及停飲居多亦有先於攻下胃中實熱而噦者證必腹滿仲景云噦而腹滿視其前後知何部不利利之則
愈承氣湯猪苓湯是也 噦逆有虛熱結皮竹如湯噦屬虛寒結皮乾薑湯寒甚去通草加丁香附子寒熱錯雜者
去甘草加丁香柿蒂 噦聲頻密相連為實攻熱為主若平時噦一聲者為虛溫補為主如腹滿不尿脉散頭汗目
眩而噦者死在旦夕

診法

上部有脉下部無脉其人當吐不吐者死脉陽陰數為吐陽浮而數亦吐寸緊尺濡胃滿而吐寸口脉數者吐紫而
瀉者難治紫而滑者吐逆脉弱而吐小使復利身有微熱見厥者雖治病入欲嘔吐者不可下之嘔吐大痛吐出色如
青黃色者危

旋覆代赭石湯

方見傷寒

治胃虛噦氣不除

進退黃連湯

見傷寒

黃連汁

乾薑炮

人參人乳并煮

半夏洗去心

桂枝三錢

大棗二枚

進法用本方上三味俱不梨水

三茶杯煎一杯溫服退法不用桂枝黃連減半或加肉桂五分如上逆味製熟煎服法同但空朝服崔氏八味丸三

錢半飢服煎劑耳

吳茱萸湯

治胃氣虛寒乾嘔吐涎沫頭痛

乾薑黃連黃芩人參湯

柯韻伯云凡嘔家失熱不利於香砂橘半者服此方而晏如長孫男心典按食入即吐

不使少留乃大矣之象故苦寒倍於辛熱不名瀉心者以瀉心湯專為痞澀立法耳要知寒熱相結於心下而成痞澀寒熱相阻於心下而成格逆源同而流異也

乾薑 黃連 黃芩 人參 各一分 水煎溫服

橘皮竹茹湯 治胃虛噦逆 中焦氣虛則厥陰風木得以上乘殺氣因之不宜變為嘔逆用橘皮升降中氣人參甘

草補益中焦生薑大棗宣散逆氣竹茹以降膽木之風熱耳

橘皮乾薑湯 治乾嘔吐逆吐涎沫而噦

補論

金匱云病人欲吐者不可下之 欲吐者陰邪在上也若下之不惟逆其陽氣及傷無故之陰變害莫測豈獨反胃而

已

食已即吐者大黃甘草湯主之 胃素有熱食復入之兩熱相衝不得停留用大黃下熱甘草和胃張石頑云仲景既

云欲吐者不可下又用大黃甘草湯治食已即吐何也曰欲吐病在上因而起之可也逆之使下則必憤亂甚既

吐矣吐而不已者升無降當逆折之使下故用大黃

大黃甘草湯 治食已即吐

通草橘皮湯 治傷寒胃熱嘔逆

通草 二錢 橘皮 五錢 梗米 一斗 生薑 根汁 水煎熱服 去通草橘皮加竹茹生薑汁十金名生薑汁

子治傷寒後嘔噦反胃乳嘔 丹溪云凡嘔家藥用服瓜薑實桃仁萊菔子山柰一切有油之物皆犯胃作吐景岳

云嘔家亦忌蒼朮以其味不醇而動嘔也

沈氏云食已心下痛陰陽不可忍吐出痛方止證名食積吐食宜此湯服之

茯苓半夏湯

茯苓 茯苓 半夏 白朮 神麴 橘皮 天麻 生薑各等 水煎服

參天湯 亦主之

參冬 天麻 茯苓 白朮 半夏 陳皮 神麴 生薑各等 水煎服

呃逆

景岳曰呃逆症謂其呃之連聲無不由於氣逆而呃之大要亦惟三者而已一曰寒呃二曰熱呃三曰虛脫之呃寒呃者頭痛惡寒發熱脈象外寒可散宜二陳湯倍加生薑陳皮去之服膈口中和手足冷脈微內寒可溫以理中湯四逆湯加丁香砂仁主之去其酸抑之寒而呃止矣火呃者口渴煩躁三焦之火可清以黃芩湯加半夏竹葉石膏湯加薑汁主之潮熱狂亂腹滿便難陽明實火可下以三承氣湯主之大勢未甚者只以安胃飲主之去其衝上之火火靜則氣自平而呃止矣陰虛脫之呃或以大病之後或以虛損之極或以虛損誤攻而致呃逆者當察其中虛速宜補脾以六君子湯理中湯加丁香柿蒂白豆蔻主之察其陰虛速宜補腎以六味湯八味湯加紫石英主之歸氣飲最妙虛甚者必須大劑補元煎加丁香白豆蔻主之然實呃者不難治惟元氣敗竭者乃最危之候也更有傷寒之呃者仍當於傷寒四閱之張石頑曰平人飲熱湯及食椒薑即呃者此胃中有寒痰死血也死血用韭汁童便下趨拘丸虛人用理中湯加蓮朮桃仁痰加茯苓半夏呃逆皆是寒熱錯亂二氣相搏使然故治亦多用寒熱相兼之劑觀丁香柿蒂散可以知其義也

丁香柿蒂散 治呃逆通劑

丁香 柿蒂 等分為末每服二錢開水送下

安胃散 治胃火上衝呃逆不止

陳皮 山查 麥芽酒五 木通 澤瀉 黃芩 石斛各一 水煎食遠服 如胃火熱甚加石膏

治氣不順呃逆嘔吐或寒中脾胃等症

熟地三五
茯苓
扁豆各二
乾薑
丁香
陳皮各一
藿香五分
炙草八分
水煎服

中氣寒甚加製附子 肝腎寒者加吳茱萸肉桂或加當歸

羌活附子湯 治腎冷呃逆

附子 羌活 茴香 乾薑 木香 為末入鹽一握水煎微溫服

丁香煮散與周方不同治胃反嘔逆呃噦泄瀉

丁香三粒
連連肉二味另煎去滓
生薑七片
黃秫米半盞
水一碗半煮熟去蕪藥吸

半夏生薑湯方見金匱 治嘔逆欲死

刀豆子散
治病後呃逆不止用刀豆子燒存性滾水調服二錢即止

元紅散各見種
治呃逆不止用荔枝七連皮燒灰存性為末百溪湯調服立止

醫學從眾錄卷四

卷終

瘰癧 癰 癰 癰 癰 癰

厥者從下厥上之病也。此主內經
以手足厥冷而言陽厥用四逆散陰厥用四逆湯
 與人身言及血之與氣并定於上則為大厥之旨
 與傷寒不同
 強直反張之家。

也。欄者猝然昏仆筋脉墜口角流涎或作牛馬豬羊雞之聲後人分為五欄是也。病有間 癲者或歌或哭如醉如

知其候多靜而常自狂者語言狂妄少卧不飢其候多躁而常醒醒者病在筋骨左癱右瘓將成廢人六症醫書分

治其病一厥陰盡之治得其要只取數方按如影響蓋厥陰屬風木與少陽相火同居厥陰之氣一逆則諸氣皆逆氣

迎則火發則生生則必扶木勢而害土土病則聚液而成痰其歸并於心也心氣大虛而不能禦之或從陽

化而為狂或從陰化而為癰心氣尚未全虛受其所凌則昏倒正氣一復而遂痊其症有作有止則為癰其逆行於內也或乘腎氣之虛則瘡癰而為腎厥或因煩勞以擾其陽陽亢陰虧而為厥厥或怒火或血上行氣血亂於胸中相薄而厥逆則為薄厥或因怫鬱不解陽氣不能四達手足與身俱冷中風月經則為氣厥或陽勝絡湯則為血厥或因穢濁蒙神亂其陰陽之氣則為尸厥或於飽食之後適有感觸胃氣不行陽并於上則為食厥時見吐衄則為衄厥濕痰上逆則為痰厥以及陽氣而陰寒之令人五指至膝上皆寒則為陰厥陰寒而陽凌之令人足下熱甚熱則循三陰上逆則為熱厥其發見於外也風火迅發病起於驟然手足抽掣此風火之反張或從實化為無汗之剛厥或從虛化為有汗之柔厥內經云諸暴強直支痛絞戾暴急筋縮皆偏此皆當於此而驗風邪之體段焉土為木剋則痰液而成痰痰扶風而流注則左癱而又右癱左傳云風淫末疾醫者可於此而知風邪之流極焉凡此六者症各不同其源則一余只以烏梅丸益厥陰之體以宣厥陰之用又以風引湯治厥陰風火痰涎幻變錯雜之病舉凡治剛用葛根湯柔用桂枝加芍藥根湯瘧之表症急者用小續命湯以攻表惡之果症急者用承氣湯以攻裏之類而不效治寒厥用六物附子湯熱厥用六味湯導厥用蒲黃湯煎厥用王女煎龍薈丸氣厥用八味順氣湯血厥用白薇湯尸厥用蘇合香丸食厥用加味平胃散魘厥用掃蠱煎腎厥用地黃飲子痰厥用瓜蒂散之類而不效治狂用白虎湯生鐵落飲涼膈散涼膈丸治癰用定志丸天王補心丹導痰湯及獨參湯加竹瀝薑汁之類而不效治癰用龍薈丸丹礬丸五癰丸及紫河車丸之類而不効治癰換用二妙散及舒筋保肝散之類而不効者種種方藥無不對症對症而猶不効其故何也蓋緣未嘗求於厥陰一經而信服烏梅丸風引湯二方之神妙也二方本於仲景而喻嘉言獨得其旨但引而不發後學人捫索不來至葉天士則引伸觸類妙義無窮若風火犯於上者此風火二字所上厥陰經外與少陽相火之義勿誤解為外來風火不允滾金燥液用參門冬湯及瓊玉膏為補金系制法若風火犯於中而為嘔為脹者用六君子湯去朮加木瓜薑芍之類及附子梗米湯加人參為補脾救肝法若風火震動心脾而為悸為消者用甘參大棗湯合龍牡之屬為緩其急鎮其逆法

若少陽相火扶厥陰風木之厥而乘巔搖絡者用羚羊鉤藤元參連翹之劑為熄風清絡法若肝膽厥陽化風旋逆者用龍膽蘆薈木通青黛之類為苦降直折法若本厥自病而體用失和者以椒梅桂芍之類為寒暄各得法若固本藏之虛而援及子藏之位者用三才配合龜甲磁石及復脈湯去薑桂入雞子黃之屬為安撫其子母法至於痿厥之治陽明病則旋陽胃神速則去厥尤覺神奇取血肉介類改湯為膏謂其力厚重實準原止厥最速凡此之類雖不明用為梅丸風引湯成方而細味其旨無一不從此二方神治出來甲寅歲余在吳航書院掌教嘗與吳子從講論以讀於無字處文到有神時二句為果業妙諦而學醫者亦必到此境地方許出而論證也

脈息

宜實大 忌沉細 漸緩則漸愈 漸數則漸甚 若數而弦緊及見軍革俱代諸脈難治

葛根湯方見 小續命湯方見 風引湯方見 桂枝加枳實根湯方見 觀原方加枳實分兩倍於桂芍六物附子湯

治寒厥

附子 肉桂 防己各三錢 炙甘草一錢 白朮各二錢 茯苓各二錢 水煎服

六味湯方見 白虎湯方見 麥門冬湯方見

白薇湯方見 人平居無疾苦忽如死人氣逆血暈陰陽復通移時方醒名曰血厥婦人多有之

白薇 當歸各二錢 人參 甘草各五分 水二杯煎一杯溫服

漸黃湯 治薄厥

滴黃二兩 清酒十六合 溫服

八物順氣湯 治氣厥

白芷 台烏藥 青皮 陳皮各一錢 人參七分 茯苓 白朮各一錢 炙甘草七分 水煎服