

太乙仙制本草藥性大全

三

新刻太乙仙製本草藥性大全卷之三

本草精義

木部

桂



其心半卷
多脂者單
名桂按桂
林桂嶺因

桂為名令之所生不離此郡從嶺以南
際海畫有桂樹惟柳象州最多味既辛
烈皮又厚堅人所採厚者必嫩薄者
必老以老薄者為一色以厚嫩者為一
色嫩既辛香薰又筒卷者必味淡自然
板薄板薄者必桂也以此大為名區

木部

藥性炮製

桂

君味辛甘氣大執浮也湯中之陽也有小毒
百藥無所畏殺草木毒入少少心經

主治簡桂筒桂相同卷精神和顏色耐老壯桂

板桂一類堅骨節通血脉啗胎四者性並辛
溫難作風寒正是柳桂桂枝味淡能治上焦
頭目薰橫行手臂調榮血和肌表止煩出汗
疎和散風經云氣薄則發泄是也肉桂木桂
性熱濕痺下焦寒冷併秋冬發泄黃豚利

筒卷者即菌桂也以嫩而易殺揀皮宜
冬至同餌忌生葱收必陰乾用旋咀片
餘刺漬密紙重裹犯風免辛氣泄陽種
類多般地產各處菌桂正則無骨形類
竹生交趾桂林野桂屬廣薄皮產南海
山谷膏桂品極高而堪充進貢却出規
賓不桂皮極厚而肉理麗虛乃孫從鎮
筒桂因皮嫩如筒卷束枝桂謂皮老若
板則平柳桂係至軟枝稍肉桂指至厚
脂肉桂枝梗小條非身幹麗厚之處
桂心近不黃肉但去外甲錯麗皮品分
既明欺罔難入又各主治亦詳知氣
之薄者桂枝也氣之厚者肉桂也氣薄
則發泄桂枝上行而發表氣厚則發熱
肉桂下行而補腎興天地親上親下之

水道溫筋煖臟破血通紅經氣厚則煖熱
是也桂心美之之義性畏守治多在中宮桂
貴之之辭味甚辛治易解表如此之異蓋緣
本乎天者親上本乎地者親下理之自然性
分所不可移也然柳桂桂枝入足太陽之腑
桂心紫桂入心在手少陰之經本經註云桂
有小毒亦從類化與黃芩黃連黃柏小毒何
施與為頭附子為使全得熱性與人參麥門
冬甘草同用能調中益氣實衛護榮與紫胡
紫石英乾地黃同用却主止治風止豆硃砂
乾漆穿山甲水蛭虻虫如此石可筒用
則小毒化為大毒矣春夏禁服冬宜煎
補註治陰受病熱痺內熱方用酒潤一斗
蜀椒一斗乾薑一斗桂一斗白芍咀著

道也

桂 牡




一名木
桂一名
長桂生
南海山
谷即廣

州今俗用牡桂狀似桂而扁廣殊薄皮
色黃脂肉甚少氣如木蘭味亦類桂不
知當是別樹為復猶是桂生有老宿者
固經云葉狹長於蘭桂但言慢木桂一
種郭璞云南人呼桂厚皮者為木桂桂
樹葉似枇杷而白華而不著子叢生叢
崩枝葉冬夏常青間無雜木蘗恭以謂
牡桂即木桂二月八月採皮日乾用之

清酒中綿絮一斤細白布四丈入酒中置
馬矢星中善目卒勿使泄氣五日入酒中
綿絮某善須漬之以其汁與絮為中其布
乃出布綿絮者之井用洋與絮為中其布
長六七尺為六中即生多中其布
寒所刺之為六中即生多中其布
綿而止起布內無風刺以髮如此病已
矣○治覺筋急亦以白風刺以髮如此病已
法夏月以飲之解煩渴益氣消痰桂木一兩
寒一升以下二物絞二先煎取一斗未入新
源中後上加水二升絞二先煎取一斗未入新
重七日開之藥成氣香味美格調高○失
自養桂未着舌下漸成氣香味美格調高○失
服溫水下以心腹俱脹痛短氣欲絕或已絕
桂二兩切以水一升二合煮取八合去滓類
水宛轉啼呼者取二兩以水一升二合煮取八合去滓類
二升許以苦酒和塗痛上乾復塗○卒吐血
神驗○痔後腹中痠痛末生溫酒服寸日
或下白沫身軀冷者急煎桂服之便氣欲絕

蘭 桂



一名同
桂一名
肉桂生
交趾桂
林山谷

嚴堽間無骨正圓如竹唐註云蘭者竹
名古方用筒桂者是故云三重者良其
筒桂亦有二三重卷者葉似柿葉中三
道交肌理縝薄如竹大枝小枝皮俱是
筒然大枝皮不能重卷味極漆薄不入
藥用今賓州所出者相類壯桂葉狹於
蘭桂而長數倍其嫩枝皮半卷多紫與
今宜州韶州者相類彼土人謂其皮為
木蘭皮肉為桂心此又有黃紫兩色益
可驗也桂葉如栢葉而澤黑皮黃心赤

水一二升勿使微吐

大乙曰

凡使勿薄者要紫色厚者去上麤皮取

五兩取有木厚處生用如木則即用重密熟
緝并紙裹勿令犯風其州土只有桂草元無
桂心用桂草煮用湯木皮遂
成桂心凡使即單搗用之

桂

君即木桂味辛氣溫無毒

治

治上氣咳逆結氣喉痺吐吸心痛脇風脇

痛溫經通脉止煩出汗利關節中益氣此

桂味厚於氣久服通神輕身不老經云治奔

遯氣能通血脉

補註

治大人小兒喫雜果子多腹脹氣急方

下五斤大人十

丸未痊再服

蘭桂

使即筒桂味辛氣溫無毒此正圓如筒

故名筒桂

(桂 柳)



一名桂枝又謂之官桂然本經

今欽州所出者葉密而細亦恐是其類但不作拍葉形為疑耳皮厚者名木桂則枚付是也蘇恭以牡桂與單名桂為一物亦未可據其木俱高三四丈多生深山蠻洞中人家園圃亦有種者移植于嶺北則氣味殊少辛辣固不堪入藥也三月四月生花全類茱萸九月結實今人多以裝綴花果作筵且其葉甚香可用作飲香尤佳二月八月採皮九月採花並陰乾不可近火中品又有人云桂云生西胡國功用似桂不過烈今亦

主治 主百病養精神和顏色為諸藥先聘通使
 久服輕身不老面生光華媚子如童子
補註 抱朴子云桂可以合藥和而服之
 七年能步行水上長生下曰
 桂二十年足下毛生日行五百里力
 列仙傳云范蠡好生桂飲水謂藥
 又曰桂父象林人常服桂皮葉以龜麟和服
 之○韓終采藥詩云閭河之桂實大如栗得而食之後天而老
柳桂 使即桂枝味辛氣溫云氣味俱
 輕故能上行發散於表內寒則肉桂補陽則
 柳桂桂辛熱散經寒引導陽氣若正氣虛者
 以辛潤之散寒邪治奔豚
主治 仲景云湯液用桂枝發表用肉桂補腎其
 氣之清濁上下一定之理也此藥可以久服
 能護榮氣能實胃氣則在足太陽膀胱經也

只言桂仰景文言桂枝者枝條也非身
 餘也取其輕薄而能發散一種柳桂乃
 桂之嫩小枝條也又宜入治上焦藥用
 也蓋亦取其枝上皮其木身龐厚外亦
 不日用箇經云葉似柿葉而尖狹光淨
 花白蕊黃四月開花五月結實樹皮青
 黃淡薄若君簡亦名箇桂厚硬味薄者
 名桂枝又云不入藥三七月採皮曝乾

桂心



一名紫桂乃諸桂之心不若一字桂也

出歙州桂州交州者甚良箇經云葉狹
 長于箇桂之二倍其嫩枝半捲多葉肉

或問湯液發汗用桂枝補腎用肉桂小柴胡
 止云加桂何也答曰肉桂太辛春夏禁用其
 治表寒當看時令故只云加桂而已秋冬治
 下部腹痛非桂不能止也專治奔豚氣痛
 桂心君味苦辛性溫無毒桂心入手少陰心經
 主治殺草木毒專治九種心痛殺三蟲破血通
 經及胎衣不下除咳逆治氣喘止腹氣冷
 痛下痢鼻中息肉軟脚痺不仁


補註治風頭痛天陰雨風先發者用一兩為
 心痛妨悶用一分為末以酒一大盞煎半盞
 去滓熱服效○寒疝心氣痛散熱無下不飲食
 用二兩劈去皮搗羅為散熱酒下○下錢○
 產後惡血衝心痛氣悶欲飲酒吞下○中風面目
 瘡引偏斜牙車急舌不可轉以酒擦取汁故
 卒中心痛用八分以水四升煮取一升分二

中皺肌理虛軟謂之桂枝又名肉桂
 削去上皮名曰桂心藥中以心為善其
 厚皮者名曰木桂二月八月採皮曝乾
 去皮留心用按諸桂所治不同无非各
 因其材而致用也然本經謂桂止煩出
 汗仲景治傷寒乃云无汗不得服桂枝
 又云汗過多者桂枝甘草湯是又用其
 開汗何特反其經義耶抑一藥而二用
 耶噫此正所謂殊途而合轍也蓋桂善
 通血脉本經言桂止煩出汗者非桂能
 開腠理而發出汗也以之調其榮血則
 衛氣自和邪无容地遂自汗出而解矣
 仲景言汗多用桂枝者亦非桂枝能閉
 腠理而止汗也以之調和榮衛則邪
 從汗出邪去而汗自止矣昧者不識出

服○治唾血為作木以水下方十寸○卒外
 腎偏腫疼痛為末和水調方寸寸○治
 小兒胎腫取炙令熟熨之曰寸寸○治
 風失音用一乃去其籠皮近以寸寸○治
 刀時展首為末分三服每以寸寸○治
 至一盞服之為末分三服每以寸寸○治
 異為治亦稍別世俗所用三服每以寸寸○治
 薄者為桂枝宜入治頭目發熱風寒外景
 表用桂枝以桂枝溫榮衛而發其邪邪去則表
 病自汗以桂枝溫榮衛而發其邪邪去則表
 密而汗自止正辛甘發散之義後人用桂枝
 汗失經旨矣身發熱者為肉桂宜入治臟
 補腎氣及下焦寒冷秘者為桂心又入治小
 除利去雜厚用近裏者為桂心又入治小
 條為柳桂味淡尤宜入治
 焦及橫行手臂桂也
 視實臣味苦酸鹹氣寒無毒景天為之使
 主治主五內邪熱去五痔腫疼七月七日取槐
 實高如粟二口以上煎稠圓止涎唾補
 如鼠屎大納穀道內三易之乃愈止涎唾補
 絕傷涼大腸消乳痼除男子陰瘡溫瘰不敗
 欵女人產戶痛癢難當仍理人瘡且墮胎孕

汗止汗之意凡病傷寒便用桂枝湯幸
遇太陽傷風自汗者固獲奇効儻係太
陽傷寒无汗者而亦用之為害豈淺上
乎猶有謂仲景之治表虛而一槩用飲
麻汗者此又失大經之旨矣

實槐



本有極高大者謹按爾雅槐有數種葉
大而黑者名懷槐昼合夜開者名守宮
槐葉細而青綠者但謂之槐其功用不
同別四月五月開花六月七月結實
實七月採嫩實搗取汁作煎十月採

一名槐
實生河
南平澤
今處上
有之其

酒吞七粒催產尤良專理女小兒痲急痛久
服明目補腦黑髮延年

補註

古方明目黑髮用槐子于牛膽中清陰
白髮變黑百日食後吞一枚十日身輕三十日

月上巳日採子服之去百病長生通神或大
熱心悶以子燒末酒服方寸效治妊婦

房莢

收煎代茶去頭老莢味導風熱亦
凡採得後去單并五子者取子

太乙曰

凡採得後去單并五子者取子
蒸過用一宿

乳浸一宿

槐白皮味苦煮酒治中風皮膚不仁服効煎湯

洗五痔產門痒痛尤奇消食心胃重却壯熱

驚癇理一切惡爛諸瘡疥癬癰腫疔瘡

肉生肌

補註

治癰瘰癧瘡用白皮醋浸半日洗之及諸
惡瘡治內癰用白皮搗丸綿裹內下

老實入藥今醫家用槐者最多春採嫩枝煨為黑炭以搽齒去虫燒青枝取瀝以塗齋取花之陳久者從末飲服以治下血折取嫩旁角作湯以當茗主頭風明目補腦煑白皮汁以治口齒及下水吞黑子以變白髮采上耳取末服方寸亦治大便秘血及五痔脫肛等皆常用有殊效者葛洪著扁鵲明引使髮不落方十月上巳日取槐子去皮內新甕中封口三七日初服一枚再二枚至十日十枚還後一丸始大良劉禹錫傳信方著硤州王及郎中槐湯灸痔法以槐枝濃煎湯先洗痔便以多炙其上止壯以知為度及早充西川安撫使判官葉聖入駱谷及宿有痔疾因以此法狀如

中得效治中風身直不得屈伸方黃白者切之以酒或水六升去滓適寒溫稍服治痔有強咬取血多取槐白皮煑濃汁安胎功之虛其穀道令更暖良久飲大便常通中不愈如用木綿裹內下部○痔以鹽少許適寒溫含之日二易之槐葉味苦平無毒功用總治諸瘡毒浴兒去疥癬疔腫熬膏貼癰疽潰爛莫汁漱口齒風痺治喉痺寒熱壯熱○補註治鼻氣窒塞以水五升煮槐葉取三升風明目方嫩葉一斤蒸如造炙法取葉碾作末如茶法煎呷之療陰瘡及濕痒用槐樹此而塗藥不見日腐一大握水二升煮取一升洗之三五遍令傷暖若沙遠恐傷風即以米粉粉之即效○主和氣性難絕傷風初瘳葉亦可食又主應癰牙齒諸風瘳槐根味苦氣寒作神燭可燒乃主喉痺寒熱洗瘡住痒煨楷齒殺虫春採以炆存性為末

新醫方

胡瓜置於腸頭執始燻灰火至一僊

揩齒去虫

主郵吏云此病其曾患來須久即差及

○補註 療胎赤眼取槐枝如馬鞭大長二尺作

命所使作槐湯洗熱瓜上令用艾炙至

子一人以其木研之至爛止冬仰臥以塗向

三五壯忽各一道熱氣入腸中因大轉

眼營日三度差治野雞痔用槐枝煎湯洗

瀉先血後穢一時至痛楚瀉後遂失胡

上取新生槐枝一握去兩頭水三大升煎取

瓜所在登驛而馳

一升頓服治前中或赤白不問年月

按衍義云槐突止言突今當分為二突

槐花味苦平無毒炒黃赤涼大腸去熱眼赤心

本出夾中若搗火作餅者當言夾也夾

痛理腸風瀉血及皮膚風二手更來紅併赤

中子大如豆堅而紫者突今下條不

白痢去胃腸孕痛殺腹臟蛔蚘

析出夾與夾中子蓋其用各別皆味導

○補註 治十血脫能刺并患等分為末酒調下

風熱又云槐花今染家亦用收時折其

以多少晚作大細研

未開花煮一沸出之谷中有所澄下稠

食前溫酒服二錢錢

黃萍參瀝為餅紫色更鮮明治腸風熱

槐膠主諸風化涎筋脉抽掣并 味口諸藥任

瀉血甚佳不可過劑日

作湯散九煎服治口眼喎斜凡 有強硬急風

破傷風雜諸藥亦可水煮作湯治風痺肢難

實 栢



生太山山谷今處上有之而乾州有獨

佳三月開花九月結實候成熟時收採蒸膜乾春黽取熟仁子用屋邊者為宜塚上者切忌霜後採實去殼取仁先以醇酒浸曝乾次取黃精汁和煮執筋連撿盡汗綿休研細成霜入劑方効畏羊菊麴麵諸石羊蹄根菊花神麴白麵一切石使牡蛎麻子桂皮謹按陶隱居說栢忌取塚墓上者今云出乾州者最佳則乾州栢葉茂大者皆是乾陝所出他處皆無大者但取其州上所宜

舉動散風毒身如重行噤口急風殊功破腦傷風立効

槐即槐樹上木耳又名槐南栢所生堅如桑耳者良用作細末酒服三錢八陰中瘡

痛治痔瘻穀道血流

補上藥細蟲心痛取槐樹上木耳燒灰末如寸許出藥腸疴方槐樹上耳若不止飲熱水一升

栢實君味甘辛氣平無毒牡蠣及桂為之使問年月遠近方以槐耳燒灰為末以酒服效

主治聰耳目却風寒濕痺吸口歷節止腰疼益

氣血去恍惚虛損飲汗治腎冷腰冷併膀胱冷膿宿水潤腎燥躰燥及面顏燥澁不光興陽道殺百和止驚悸安五臟風眩痛亦可

味豐美可也乾陵之栢異於他栢其末

未有無文理者而其大多為蒼藤雲套

人物鳥獸狀極分明可現有盜得一株


徑尺者可直萬錢閬人人家多以為貴

宜其字案最佳也又以其枝節燒油膏

傳惡瘡久不差有蟲者牛馬畜產有瘡

疥名為重病以傳之三五次無不愈也

(栢側)



密州出者尤佳雖與栢相類而其葉

皆側向而生功効殊別收採無時張仲

景方療吐血不止者栢葉湯主之清栢

葉一把乾薑一片阿膠一挺炙三味以

煎調久服不飢不老增壽輕

○補註

小兒服之驚風腹痛不乳食大便青白

者老人虛必栢子仁末溫水調下二錢○松緒

研落白蠟丸栢子大以少黃芩湯服二十或

食前太乙日使先以酒浸一宿至明漚出晒乾而

天久陰即於端中密水用瓶盛栢子仁若

火緩緩煮成煎為度每煎三兩栢子仁用酒

乾為度側栢葉君味苦澁氣寒又曰微溫無毒漬用嫩

葉良翠臨者收採務向月令建方春採東夏採

嫩此總得節候生氣

主治即止吐衄崩漏重生髮髮聲為煨溫仙

用係補陰要藥若合黃連煎服小兒重痢真

痊久服輕身益氣耐冷止飢與酒相宜止尿

水二升煮一升去滓白絞馬通汁一升

相和令煎取一升綿漚服盡之山東

醫工亦多用側栢經云性寒止痛其方

採栢入臼中濕搗令極爛如泥冷水調

作膏以治大人及小兒被湯火燒熱傳

於傷處用帛子繫定三兩日瘡當斂仍

滅瘢又取葉焙乾為末與川黃連二味

同煎為汁服之以療男子婦人小兒大

腹下黑血茶脚色或膿血如靛色所謂

蟲痢者治之有殊方又能殺五臟蟲道

家多作栢葉湯常蓋人古栢葉尤奇今

益州諸葛孔明廟中有大栢木相傳是

蜀世所植故人多採收以作藥其味甚

香於常栢也

孫真人枕中記採栢栢漆皆以三月四

血又治冷風歷節疼痛

○補註治大風疾骨髮落用栢木蒸九曝搗

夜一服熱水下五九或十九口生治憂

不計時服以粥飲調下二成或一十九洞下

痢上熱服之治鼠疫種核痛才即消○生髮

方○煎栢用葉炙乾令熱氣下即消○生髮

太乙曰其有子圓葉如大葉其時濃葉成孕

無子葉上微赤其色如綠不入藥中用若修事

瀉出用酒拌蒸一服時即用黃精自然汁浸

了焙乾又浸一斤用黃精自然汁十二兩

栢白皮無毒燒灰敷火灼爛瘡長毛髮亦驗設

節釀酒主歷節風痺療狗疥尤靈凡患疥瘡

馬畜產有疥並燒

敷二三以無不愈

○補註治中熱油及火燒瘡以栢白皮猪脂煎

月採新生松葉可長三四寸
取陰乾細搗為末其柄葉取深出巖谷
中採當年新生可長二三寸者陰乾細
搗為末用白蜜丸如小豆大常以月一
十五日口未出時燒香東向手持藥八
十一丸以酒下服一年延十年命服二
年延二十年命欲得長肌肉加太麻戶
勝欲心多壯健者加茯苓參以藥除
百病益元氣添五臟六腑清明耳目強
壯不衰老延年益壽神驗用七月七日
露水丸之更佳服時乃呪曰神仙真藥
酥合自然服藥入腹天地同年呪訖服
藥斷食雜肉五辛最切忌慎之

物裹脚然後以栢紳木細刺
抱朴子云漢成帝時獵者於
無衣服身皆生黑毛跳坑之
其所在合圖取得乃是一婦
秦之宮人問東賊至秦王出
無所食泊欲餓死有一老
笑初時苦渴後稍便喫遂不
不熱此女是秦人至成帝時
松脂使味苦其氣溫無毒六
月採通明如乳香

者佳黃白色者良黑色者不用

主治瘰癧疽惡瘡頭瘍治日
風安五臟除伏熱胃脘解消
渴咽喉輕身通
神延年耐老熬膏貼瘡毒長
肉作散治齒痛

殺蟲父服益氣

補註治一切瘰癧煉成松脂
末與乳令滿日

採冷水
二鼻掛斷離者二百日差斷
蓋及房室瘰癧

松脂



一名松

香一名

松膏

名松肪

一名白

膠香生泰山山谷普天下植赤州土不
拘大木中流來歷清松脂別名便是採
取媒利鑿多竅可遂貪心鍊餌延年待
自流易奏捷効擇通明成類分向背陰
陽向南日月照著為陽脂向北日月背
者為陰脂陽脂補陽陰脂補陰僊經亦
云不見日月者皆可取服以人多陰虛
欲其專補陰爾製鍊有方依式勿錯水
盛釜內饒安水傍白茅藉無底兩層黃
沙蓋茅上寸許松脂任布於上煮湯

節諸風百節酸痛不可忍松脂三十斤煉五
十遍不膩五十遍亦可二遍以煉三
升溫不松脂三升熟饒令極稠以酒
服方寸寸日三敷食熱劑為真血壯生冷
野物果手一百日善○松脂十斤節風四
肢疼痛如解落松脂二十斤通退以薄綿裹內
日服一合日五六服治手人公忠三兩煉
已且一兩相和熱搗可九通退以薄綿裹內
聖不差方松脂流出一度易○療刺人肉疼百
以綿裹三五日當有根出細乳頭香者傳瘡上
落○集驗療瘡取松脂出於松樹如雞乳內
須更細蠶綠松脂出於松樹如雞乳內
虎尊師綿綠松脂法十斤松脂五斤以水煮
過令苦味盡取得後每一斤煉了抄脂入四
兩茯苓末淘晨水下一刀圭即終年不食而
復延齡身
輕清矣

松實味甘苦氣溫無毒主小氣虛羸驅風痺寒

氣能補不足久服延年

○補註神山餌松實用七月取松實大寸時即落
三服服及百日身輕如膏每服如雞子大日
數久服昇仙渴即飲水亦可入藥了松脂同

減少族添脂流畫芳出新登
水沉釜底者勿用候凝結得妙如前過
畢三迴色白如玉研和麝藥加白茯苓
栢子仁其菊花共剉亦可單服為丸酒
吞

○按抱朴子云趙瞿病癩歷年醫不差
家乃膏糧兼送於山中瞿自怨不幸
悲嘆涕泣經月有仙人經穴見之哀之
是問其詳瞿知其異人也叩頭自陳乞
命於是仙人取囊中藥賜之教其服百
餘日瘡愈顏色悅肌膚潤仙人再過視
之瞿謝活命之恩乞遺其方仙人曰此
是松脂彼處極多汝可求服之長服身
轉輕力百倍登危涉險終日不用年百
歲齒不墮髮不白夜臥常見有光大如

服之則仙傳云陸仝好食松子能飛行走
及馬以松子遺堯堯不識服松子蒲松也

松黃
花即松
主治雞輕身益氣能發上焦山人及

時拂取作湯點之甚佳
羅細雞清雞彈丸成豆粒暑痢止澁如神

○補註後北熱頭痛額赤口乾唇焦多煩燥消
昏悶不爽於花川芎當歸石膏蒲黃五物等
同為末每服二錢水二合紅花二錢同煎七
分去滓粥後溫溫細呷松子多海藥水今關
右亦有但細小味薄由月午同治虛秘

松根白皮
味苦氣溫無毒

主辟穀腹內不飢補虛損五勞益氣

松節
味苦氣溫無毒

主治燥血中之溫卻脚痺軟弱

風虛軟痛

○補註此藥筋疼痛者松節一兩細剉如
米粒乳香一錢右件藥用銀石器內慢

此為試讀，需要完整PDF请访问：www.ertongbook.com