

春溫痢症三字訣合璧序

黃炎已邈仲景又不復作醫學晦育至唐宋元明而極吾友唐君容川固已辭而闢之矣唯所著方書淹貫中西或頗深邃以訓醫家不求便俗計唐宋以來方藥譌謬殺人最甚者莫如春溫秋痢二症是非有淺顯歌括臨時緝檢未易查治先是有友自蜀中來攜有成都張子培所著春溫三字訣頗愜余心已早付諸石印獨於痢疾尚未發明諸家論說俱不足恃因懇容川續成一卷合印濟世孟子云窮則獨善其身達則兼善天下方今時局無勞吾輩杞憂顧此刀圭亦名小善竊推仁術冀拯斯民伏願醫家急圖變法病家勿更因循實余所厚望焉是為序

光緒二十一年歲次乙未夏五月夔門鄧其章謹識

成都張子培先生道咸間名醫以時人往往悞春溫為傷寒覆轍相循乃着三字訣刊行問世先生墓生宿學有年矣門人吳士先學博績刻於富順學署光緒壬辰携此書北上二月十九日抵申江適聞資州公車門人李紹西以春溫歿客邸嗟乎紹西少顏子六歲春溫烏足以困之宮午不幸未遇馮當風倘早到浹日紹西無死理亡之命矣夫然出河帶本挽袖海山房印二千卷所到散布商諸業斯術者子培以名諸生精研內經遠紹旁披數十年淵乎有心得書中方藥起死回生已更僕難數所願仁人君子無易視之蒼生幸甚
光緒壬辰上巳

祥符王宮午錢卿氏題於海上客次

春溫三字訣

成都張子培先生著

夔門鄧其章雲航校印

溫為病。雖分類。

後世有風溫濕溫暑溫瘟疫等名。方書更創出大頭疔瘡等瘟名。愈多。治愈亂。予所論者。風溫也。知此則一以貫之矣。

當顧名思其義。

既曰溫。則非寒矣。今醫之不能治此。由於不識其名耳。名且不識。從何施治。

仲景書發凡例。

仲景太陽篇一節。為溫病之祖。傷寒論中。特為提出立論者。謂此症與傷寒迥異也。不出方者。謂書本為傷寒而作。論少方少。恐其掛一漏萬也。論多方多。恐其強賓壓主也。

後之醫。仍寒治。

劉河間張子和李東垣朱丹溪辨焉不精。語焉不詳。然猶不敢妄用參朮薑附也。至張景岳薛立齋輩。則妄用矣。仍是治寒法也。

方藥雜。死亡繼。

後人九味羌活湯。人參敗毒散。逍遙散。香蘇飲等。皆知不敢用麻桂而設。似已窺見一斑。然而仍用辛溫。百治百死。不過較用參芪朮棗者。差緩湏臾耳。傷心目。三字贅。

仲景本論。祇九十二字。字字是溫。字字不是寒。今人以治寒法治溫。百治百死。即有身體強壯。幸而不死者。則有拖延日時。傾破家產。熱邪久留於臟腑。新邪引動於經絡。至他年重感。亦必身死。滔滔皆是。喚醒無從。予目擊心傷。此所以有三字訣之作也。

何謂溫。溫是熱。

既名曰溫。則非寒也。今醫強名此症為寒火。名不正。則言不順。事不成矣。

與傷寒殊懸絕。

如此辨明。而仍以寒法治溫病。用桂枝湯。麻黃湯。葛根湯。小柴胡湯。不肯用心。甘願殺人者。吾知其報在子孫矣。行道者。宜何如之。兢兢哉。

初起時。口渴別。

傷寒初起不渴溫病初起即渴以此分別然溫亦間有不渴者但渴者多不渴者少耳

不惡寒惟發熱

仲景云太陽病發熱而渴不惡寒者名曰溫病共十六字另有註在後

按漢文簡質此症初起多有微惡寒者斷無不發熱者但二三日則全不惡

寒惟發熱矣此症初起間有不口渴者但二三日斷無不渴矣且傷寒多左

手脉大於右手溫病脉多右大於左溫病初起多兩寸脉大右寸尤盛

附子培註仲景原文單行為原文雙行為子註

張子培曰悟溫病者古有劉河間等今有薛生白等然亦未將太陽病溫病

五字分清夫既曰太陽病矣何得發熱云云又曰溫病今特拈出以見狂瞽

者之千慮一得

太陽病或已發熱或未發熱必惡寒前有明發熱而渴不惟無必惡寒

更如發熱而者太陽病也吾得確而指其名曰溫是即內經冬不藏精春必病

溫病

麻杏湯有神丸

用麻黃湯桂枝湯者無論矣。用人參敗毒散逍遙散者亦以五十步笑百步也。亦可無論。即薛一瓢之前胡桑皮鉤藤等。葉天士之桑葉菊花牛蒡等。吳氏祖薛葉二家用銀翹散桑菊飲可謂此症暗室一燈。然予以謂不如仲景麻杏石甘一方為如神也。故予每用銀翹桑菊二方皆加生麻絨七八分或一二錢功效倍於本方百倍。但此症初起麻黃可用至二三日後舌變胭脂色則風盡化熱矣。麻黃斷斷不可用。用必危殆。以麻黃大熱故也。

或銀翹或桑菊

銀翹散為辛涼平劑。桑菊飲為辛涼輕劑。白虎湯為辛涼重劑。吳鞠通法也。要甚。

以辛涼解表劑

或謂傷寒宜解表。溫病忌發汗。夫傷寒解表令出外也。然則溫病忌汗令內入乎。不通之甚。蓋傷寒以辛溫解表。溫病以辛涼解表。解表同而辛溫辛涼大異焉。昧昧者無論矣。乃高明之家亦出此語甚矣。結習之難除也。

辛溫辛涼乃此症之生死關頭也。時醫畧而不講久矣。

小遷延大殞命。

言誤治之害有如此者。但近日醫家不究見識之非。病家不悟醫人之誤。皆曰生死有命而已。

口大渴津液傷。

此症始終以救津液為主。甘寒法也。陳修園謂四逆湯麻黃附子細辛湯等以附子而救津液。雖在傷寒終屬強解。況溫病乎。今人一見溫病。陽極似陰。妄陳氏言。竟用薑附。着眼着眼。

或白虎承氣湯。

此症若先以辛涼解表。繼以苦甘化陰等法。無不愈矣。因誤治變重。非二湯力不能勝。

雖熱飲亦屬陽。

間有口大渴而飲熱湯。不肯飲冷。且畏飲冷。更有舌為沸湯起泡者。此陽極。

似陰重症也。時醫一見飲熱，皆謂陰症，妄投桂附，下咽立斃，特為拈出，切忌。

治之法，急下良。

急以三承氣湯選擇用之。或白虎亦有可用者。但此法祇可用在風溫。若別症喜熱，多屬陽虛，本宜薑附，妄用承氣，立斃，慎之。

若譫語，舌紅黃。

此症全憑驗舌。初病多無苔，然舌色必紅，便宜辛涼解之。半表半裡則白，入裡則黃，甚則黑色，難治矣。

在包絡，非胃腸。

傷寒譫語，承氣下之，邪在腸胃也。此症邪在包絡也，非一下可解，竟用承氣誅伐無過也，特為拈出。

用紫雪，清宮湯。

輕症清宮湯，及清絡湯可愈。若重症則不可恃矣，須得紫雪。

與至寶及牛黃。

此症起死回生神方也

至病久氣液損

傷寒傷陽故用甘溫溫病傷陰宜用甘寒甘溫甘寒又此症之生死關頭也切記切記

宜甘寒補而潤

如復脉湯去薑桂大棗竹葉石膏湯去半夏甚六人參甘寒法也即喻嘉言清燥救肺湯亦可間用若氣液傷損兼大熱譫語是體已虛邪仍實之候最為危症予每用炙草五六錢以大補中氣生地麥冬各一二兩以滋陰液大黃芒硝各四五錢及七八錢以蕩實邪應手而愈多矣但症危如此必憑脉以驗症脉弦者生脉濇者死脉弦為陰氣未盡脉濇為陰血已竭所謂陰症見陰脉是也

即下利二甲症

傷寒下利非白通四逆不能回陽此症下利只用龍牡鎮濇存陰而已不用

溫補也。然此就久下利而言。故用堵塞法。若在病初。身熱口渴。下痢舌黃。胸痞脈數。此溫邪下注大腸之症。所謂協熱而利是也。當用黃芩、葛根、桔梗、豆卷之屬。以升泄溫邪。二症辨之不清。生死立判矣。

變紛更此大概

予所閱歷者。有用大黃七八錢。芒硝四五錢。下至二十餘日而愈者。成都府庠生百善。叙州府庠生張正是也。有先用芒硝、大黃三五錢。服一劑而病大增。次日衆謂藥誤。予謂病重藥輕。硝黃各加一二倍而愈者。鹽署典史林竹齋。華陽監生江曉帆是也。有病已大減而為寒阻遏。下不能通。先用理中微加附子一小劑。以驅其陰。腹痛即止。更用六味湯加大黃。以養陰蕩邪。一劑而愈者。則彭雲峯之長子也。有誤汗誤下。誤用滋膩。誤用苦寒。病至十五六日。壯熱不解。予自遠歸。遵喻嘉言先生法。用麻黃附子細辛湯一劑。而熱清去十之八九。後用回陽法。畧帶養陰。施治半年餘而愈者。則予子小培也。按後風溫中百難見者不可輕用凡此者不可勝數。蓋此症變遷極速。極歧。茲不過言其大概。然而會心者。處處與傷寒對看。可即始以見終矣。

凡病不外陰陽。知治傷寒能治陰病矣。知治溫熱能治陽病矣。雖有陽極似陰。陰極似陽。陽七陰三。陰七陽三。陰陽錯雜之不同。而理本一貫。認的陰陽。投無不利矣。

一切病迎刃解

此二病萬病之綱也。綱舉則目張。萬殊可歸於一本。目張由綱舉。一本可發為萬殊。即以此症而推彼。如吳又可所論之瘟疫。是天地之厲氣。刀兵饑饉之餘。人從口鼻而受者。老子所謂大兵之後。必有凶年。是也。其症大寒大熱。口渴身痛。脉浮洪而數。全類傷寒風溫。惟初起滿口舌苔白而且厚。或有黃色。甚則黑矣。面如油垢。即是。的症。用達原飲如神。且非此無以搗銳而攻堅。彼陳修園吳鞠通舒馳遠輩。竭力訾詆。胡為哉。又如疙瘩瘟初起。與寒溫同。惟頭面疙瘩。如無名腫毒。然用銀翹桑菊二方。加減亦效。然不如升降散之靈妙敏捷也。又如濕溫初起。與前三症亦同。但舌上有苔而薄。胸膈痞悶。口渴不喜飲水。即飲亦不能多受。為獨異。或四肢骨節麻木酸疼。法宜辛涼淡

滲如滑石木通杏仁半夏及苡仁厚朴竹葉菊花荊芥之屬秋燥初起以肌膚燥燠神氣衰少為獨異。有外感者蘇葉荊芥薄荷玉竹石膏梨皮麥冬貝母之屬。無外感者喻氏清燥救肺湯。滋液救焚湯之屬。法宜辛涼清潤。一切外症。可由此正面推。即一切內症。可由此反面推矣。但難為不肯讀書。不肯用心者望也。

〔附方〕

麻杏石甘湯

麻黃 四錢 杏仁 三錢 石膏 八錢 生甘草 二錢

〔張子培按〕分兩必須因病輕重加減。不可竟用古法。

辛涼平劑銀翹散方

連翹 一兩 金銀花 一兩 苦桔梗 六錢 薄荷 六錢 竹葉 四錢

芥穗 四錢 生甘草 五錢 淡豆豉 五錢 牛蒡子 六錢

右杵為散。每服六錢。鮮葦根湯煎。香氣大出。即取服。勿過煮。肺藥取輕清。過煮則味厚。而入中焦矣。病重者約二時一服。日三服。夜一服。輕者

少用又有病重藥輕之患。故從普濟消毒飲時時輕揚法。今亦間有辛涼法者。多不見效。蓋病大藥輕之故。一不見效。遂改絃易轍。轉去轉遠。即不更張。緩延至數日後。必成中下焦矣。胸膈悶者。加藿香三錢。鬱金三錢。護膈中。渴甚者。加花粉。項腫咽痛者。加馬勃元參。衄者。去芥穗豆豉。加白茅根三錢。側柏炭三錢。梔子炭三錢。咳者。加杏仁利肺氣。二三日病猶在肺。熱漸入裡。加細生地麥冬保精液。再不解。或小便短者。加知母黃芩梔子之苦寒。與麥地之苦寒。合化陰氣。而治熱淫所勝。

〔張子培曰〕按此症初起。予用此方。每加麻黃一二錢。功效倍捷。但三四日後。舌變紅黃。則不可用矣。

桑菊飲方

杏仁 二錢

連翹 一錢

薄荷 八分

桑葉 二分

苦桔梗 二錢

黃菊花 一錢

甘草 八分

葦根 二錢

水二盃。煮取一盃。日二服。二三日不解。氣粗似喘。躁在氣分者。加石膏。

知母 石膏 細生地 玉竹 丹皮 炙甘草 二錢 肺熱甚 加黃芩 渴者 加花粉

白虎湯方

石膏 八錢

知母 三錢

生甘草 錢半

白粳米 四錢

調胃承氣湯方

大黃 四錢

炙甘草 二錢

芒硝 二錢

小承氣湯方

大黃 四錢

厚朴 二錢

枳實 一錢

大承氣湯

大黃 四錢

厚朴 三錢

枳實 三錢

芒硝 三錢

紫雪丹

張子培按局方原有黃金百兩更妙

滑石 一斤

石膏 一斤

寒水石 一斤

磁石 水煎二斤 搗煎

去渣入後藥

犀角 五兩

沉香 五兩

丁香 一兩

升麻 一斤

元參 一斤

羚羊角 五兩

木香 五兩

炙甘草 半斤

以上八味並搗剉入煎藥汁中煎去渣入後藥

清宮湯

長砂三兩 研細

麝香一兩二錢 研細入煎藥拌勻

合成退火氣冷水調服一二錢

元參心三錢

蓮子心五分

竹葉捲心三錢

連心麥冬三錢

連翹心二錢

犀角尖二錢 磨沖

加減法。熱痰盛加竹瀝梨汁各五匙。咯痰不清加括萋皮一錢五分。熱毒盛加金汁人中黃。漸欲神昏加銀花三錢。荷葉二錢。石菖蒲一錢。

清絡湯

羚羊角三錢 川貝母二錢 連翹二錢 連心麥冬四錢 知母二錢

石斛二錢 青蒿二錢 花粉二錢

至寶丹

犀角一兩 鎔 硃砂一兩 飛 琥珀一兩 研 玳瑁一兩 鎔

牛黃五錢 麝香五錢

以安息重湯燉化和諸藥為一百丸蠟護

安宮牛黃丸

牛黃一兩 鬱金一兩 犀角一兩 黃連一兩 硃砂一兩 梅片二錢

麝香一錢 真珠五錢 山梔一兩 雄黃一兩 黃芩一兩 金箔衣五分

右為極細末。鍊老蜜為丸。每丸一錢。金箔為衣。蠟護。虛者人參湯下。脉實者銀荷薄荷湯下。每服一九。兼治飛尸卒厥。五癰中惡。大人小兒。瘧厥之因於熱者。大人病重體實者。日再服。甚至日三服。小兒服半丸。不知。再服半丸。

復脉去姜桂湯

炙甘草六錢 乾生地六錢 生白芍六錢 麥冬五錢 阿膠三錢 火麻仁三錢

竹葉石膏去參半湯

鮮竹葉三十片 石膏八錢 麥冬五錢 炙草二錢 梗米八錢

清燥救肺湯

霜桑葉三錢 石膏二錢 甘草一錢 黑芝麻三錢 人參七分
麥冬一錢半 杏仁一錢 去真阿膠一錢 枇杷葉一錢