

校正点句

卷十三

燥門

卷十四

鬱門

卷十五

寒鬱門

丹溪心法第九冊

丹溪心法附餘卷十三

匏集

已集

燥門

消渴六十八

丹溪心法

○消渴養肺降火生血為主。分上中下治。三消皆禁用半
夏。血虛亦忌用。口乾咽痛腸燥大便難者亦不宜用。汗多者不
可用。不已必用薑鹽製。消渴若泄瀉先用白朮白芍藥炒為
末調服。後却服前藥。即諸汁膏。內傷病退後燥渴不解。此有
餘熱在肺經。可用參苓甘草少許生薑汁調冷服。或以茶匙桃
薑汁與之。虛者可用人參湯。天花粉消渴神藥也。上消者
肺也。多飲水而少食。大小便如常。中消者胃也。多飲水而小

燥消渴

便赤黃 下消者腎也小便濁淋如膏之狀面黑而瘦
人方

黃連末 天花粉末 人乳汁 羊乳藕汁 生芩汁

右後二味汁為膏入前三味搜和佐以薑汁和蜜為膏徐徐
留舌上以白湯少許送下 能食者加軟石膏瓜蒌根

附諸賢論

劉河間宣明論曰燥乾者金肺之本燥金受熱化而成燥澁也
兼火熱致金衰耗液而損血鬱而成燥者山風能勝濕熱能
耗液故經云風熱火同陽也寒濕燥同陰也又燥濕小異也
金燥雖屬秋陰而其性異於寒濕而反同於風熱火也又加
大便乾澁乃大腸受熱化成燥澁經云諸澁枯涸又如癰瘕

中風皆因火熱耗損血液。玄府閉塞不能浸潤。金受火鬱不能發聲。經云肺主聲。肢痛癱戾者風熱濕相致而遂以偏枯。語音澁手足不隨也。然中寒吐瀉亡液而成燥亦以鮮矣。亦有寒濕相鬱。榮衛不能開發。貫注多成偏枯。經曰諸澁枯涸。乾勁皴揭屬於燥也。又如胃膈瘴熱煩滿。飢不欲食。或瘴或消中。善食而瘦。或燥熱鬱甚而成消渴。多飲而數小便。狂陽心火燥其三焦。腸胃燥澁拂鬱而水液不能宣行。則周身不得潤澤。故瘦悴黃黑也。而燥熱消渴然雖多飲亦其水液不能浸潤於腸胃之外。湯不能止而便注為小便多出。俗未明妄為下焦虛冷。誤人多矣。又夫周身熱燥鬱故變為雀目或內障。雖疳瘡瘍上為咳嗽喘下為痔痢或停積而濕熱。

內甚不能傳化者。變為水腫腹脹也。世傳消渴病及消瘦弱。或小便有脂液者。為消腎也。此為三消病也。消渴。消中。消腎。經意皆云。熱之所致也。

附諸方

東垣曰。膈消者。以白虎加人參湯治之。中消者。以調胃承氣

湯三黃丸治之。下消以六味地黃丸治之。

人參石膏湯。即白虎加人參湯。治膈消。上焦燥渴。不欲飲食。

人參半兩。石膏兩二錢。甘草四錢。知母一錢。

東垣加黃芩杏仁。

右咬咀。每服一兩。水二盞。粳米一撮。煎至一盞。去滓。通口服。

無時。

清心蓮子飲 治心經蘊熱作渴小便或赤澀或濁

黃芩

麥門冬

地骨皮

車前子

甘草各三升

蓮子

茯苓

黃芪

柴胡

人參各三升

右咬咀水煎服

六神湯 三因方治三消渴疾

枇杷葉

瓜蒌根

乾葛

蓮房

甘草

黃耆各等分

右咬咀每服四錢水一盞空心煎服小便不利加茯苓
地黃飲子 簡易方治消渴咽乾而亦煩燥

人參去芦

生乾地黃洗熟乾地黃

黃芪蜜炙

天門冬去心麥門冬去心澤瀉

石斛去根炒

上消

批杷葉去稍 枳殼去穰麩炒甘草炙各等分

右咬咀每服三錢水一盞煎七分食後溫服

硃砂黃連丸秘方治心虛蘊熱或因飲酒過多發為消渴

硃砂二兩別研 宣連三兩 生地黃二兩

右為末煉蜜丸如梧桐子大每服五十丸灯心棗子湯送下
烏梅五味湯大成專治消渴生津液

五味子 巴戟酒浸去心百藥煎 烏梅 甘草各等分

右咬咀每服四錢水一盞空心煎服

補腎地黃丸秘方降心火益腎水治消渴除骨蒸壯筋骨明眼目

生地黃半斤酒浸及二日蒸爛研膏與黃柏拌曬乾 鼠苓二兩酒浸

白茯苓四兩黃柏一斤剉同地黃晒乾 當歸酒洗

枳殼去穢 麥門冬去心一兩熟地黃酒浸天門冬

揀參 甘菊花各二兩 生苓一兩

右為末滴為丸如梧子大每服七十九空心鹽酒下

麥門冬飲子宣明方治膈消胸滿煩心津液短少消渴

五味子 知母 甘草炙 瓜蒌仁 人參

乾葛 生地黃 茯神各二兩麥門冬二兩去心

右咬咀每服一兩水二盞竹葉十四片煎一盞溫服

川黃連丸 治消渴

川黃連五兩天花粉 麥門冬去心各二兩半

右為末生地黃汁并牛乳夾和鴉丸梧子大服三十九粳米

湯送下

消渴

玉泉丸 治煩渴口乾

麥門冬 志人參

茯苓

黃芪 半生半蜜炙

烏梅 焙 甘草各二兩 瓜蒌根 乾葛各一兩半

右為末 蜜丸 彈子大 每一丸溫湯嚼下

甘露湯 經驗方 治煩渴口乾

石藥煎 白乾葛各三兩 烏梅 五味子

天花粉各一兩 甘草半兩

右吹咀水煎服

又方 經驗方 經驗止渴及除瀉後煩渴常服調中和氣

茯苓 人參各五兩 乾葛一兩 藿香

水香 甘草各一兩半

右吹咀每服一兩水二盞煎至一盞去滓通口服加滑石亦
栝蒌湯經驗方治消渴小便多

用栝蒌根薄切炙五兩水五升煮取四升隨意飲

栝蒌丸

用栝蒌根薄切用人乳汁拌蒸竹瀝拌晒為末煉蜜為丸如
彈子大噉化或丸如菜豆大每服一百丸米飲下

忍冬丸 治消渴既愈之後須預防發癰疽之患

用忍冬草不以多少根莖花葉皆可用置瓶罐內用無灰好
酒浸以糠火煨一宿取出晒乾入甘草少許碾為細末以所
浸酒打麴糊為丸如梧子大每服一百丸不拘時溫酒米飲
任下

一方用忍冬草水浸煎服

黃耆六一湯 治諸虛不足胸中煩悸常消渴或先渴而飲發

癰疽或病癰疽而作渴並宜服之 見盜汗

大黃甘草飲子宣明方治男子婦人一切消渴不能止者

甘草大麤者四兩長四指打碎 大黃一兩半錦紋者

大豆五升煮三沸另淘苦水再煮

右三味用井水一桶將前藥同煮三五時如稠糊水少更添
豆軟於盆中放冷令病人食豆渴飲湯汁無時候食盡如渴
燥止罷不止再煮前藥不三次病即去矣

○已上諸方治上消之劑

調胃承氣湯

中消

三黃丸俱見火類

順氣散拔萃方消中暑熱在胃而能飲食小便黃赤以此下之不可多利微已利至不飲食而愈

厚朴姜製

大黃四斤

枳實一斤

右以咀水二盞煎至一盞去渣通口服矣時

人參白朮湯宣明方治胃膈痺熱煩滿飢不欲食痺成為消中善食而瘦燥熱鬱甚而成消渴多飲而數小便兼療一切陽實陰虛風熱燥鬱頭目昏眩中風偏枯酒過積毒一切腸胃燥澀倦悶壅塞瘡疥癰痺并傷寒雜病產後煩渴氣液不得宣通

人參

白朮

當歸

芍藥

大黃

山梔子

荊芥穗

薄荷

桔梗

知母

澤瀉

各半兩 茯苓

去皮

車翹

瓜蒌根

乾葛各一兩

甘草三兩 藿香葉

青木香

官桂各二分即二名半是也

石膏四兩 寒水石

二兩

滑石半斤

右為細末。每服抄五錢水一茶盞入盆硝半兩生姜三片煎

至半盞絞汁入蜜少許溫服漸加至十餘錢得臟腑流利取

効如常服以意加減兼服消痞丸散以散腸胃結滯溫熱內

甚自利者去了大黃芒硝

消痞九宣明方治積濕熱毒甚者 身體面目黃心脇脹滿嘔

吐不能飲食痿弱難以運動咽嗑不利肢體焦乾眩悸膈熱

坐臥不寧心火有餘而妄行上為咳血衄血下為大小便血腸

風痔癰三焦壅滯。闕痺熱中。消渴傳化失常。小兒疳積熱。

黃連

乾葛各兩黃芩

大黃

黃柏

梔子

薄荷

藿香

厚朴

茴香炒各半兩

木香

辣桂各二錢半

青黛二兩研牽牛二兩

右為細末。滴水丸如小豆大。每服十丸。新水下。溫水亦得。小兒丸如麻子大。病本濕熱內甚。本自利者。去大黃。牽牛忌發熱諸物。

黃連猪肚丸三因方。治強中消渴。

黃連去鬚梁米

瓜蒌根

茯神各四兩

知母

麥門冬去心各一兩

右為末。用大猪肚一箇洗淨。入藥末於內。以麻線縫合口。置

凡遇心火降色
醫家多經曰清法三卷
甌中炊極爛取出藥別研以猪肚為膏再入蜜搜和前藥杵
數千下丸如梧桐子大每服五十丸人參湯下 一方加人
參熟地濟生除知母梁米用小麥
加味錢氏白木湯直指方治消中消穀善飢

人參

白木

白茯苓

甘草炙

藿香葉一兩

枳殼去穰麩炒半兩乾葛二兩木香

北五味

柴胡各半兩

右咬咀每服三錢水一盞煎服

五豆湯瑞竹能解酒毒止消渴能發小兒豆疹不出并解發渴
之証後成瘡癩者

黑豆

黃豆

藁豆

青豆

赤小豆各五十

乾薑一斤甘草一斤貫衆半斤

右前藥俱不剉用水五斗五升。臈八日用大鍋熬至熟。濾出豆汁。另以磁甕盛之。箬葉紙重封。春夏月開用。酒後渴。隨意飲。大人渴後。或成瘡瘍。小兒豆瘡。不出。皆可飲。最妙。

灸法祕方。近世醫者。不審病症。從何而得。不明虛實。每以補藥投之。遂致不救。可惜也。殊不知癰者。乃積熱也。復以熱藥與之。是乃失之。若服補藥。即寸口脈芤。其人下熱。即不可治也。甚者吐血而死。有灸法甚妙。令病人豎其兩手。剪去中指甲。於兩手中指頭上。各灸一炷。如大豆。令兩人發火。仍令兩人吹去。各指尖上。艾焙其火必爆。再用艾焙兩箇。兩脚二處。太衝脉上。亦依前法。兩人發火。吹之亦爆。高五六寸。四箇艾焙。

中消

下消

有四箇小孔。麤此其驗也。其人立飲食黃色。遂退。更先炙百會穴一焙。如前法吹之。萬不失一也。

○已上諸方治消中之藥。

六味地黃丸

見補損

八味丸加減

治心腎不交消渴引飲

本方喊附子加五味子

方見補損

玄菟丹和劑方。治腎水枯竭。津液不生。消渴諸証。

兔絲子酒浸研焙乾末十兩

白茯苓二兩去皮淨

乾蓮肉酒浸三兩

五味子酒浸焙半兩

右為末。別研山藥末六兩。將浸藥餘酒更添煮糊。搜和搗數千杵。丸如梧桐子大。每服五十丸。米湯空心下。夢遺白濁。