

同治四年重刊

外科摘錄

萍鄉文延慶堂藏板



南京中医药大学图书馆版权所有

穗城西湖街
藏珍閣承刊



南京中医药大学图书馆所有

外科摘錄目次

萍鄉文 晟叔來輯

男星瑞重校刊

星輝全校

首卷

外科十法

內消法
圍藥法
復論五善七惡救
援法
將息法

艾炙法
神火照法
開口除膿法
收口法
刀針砭石法
總論服藥法

證治方藥

發背
對心發
腎俞發
搭肩
手發
足發
附方藥二十九則
腦疽
對口
偏對口
井口

髮疽

發頤

時毒

大頭天行

附方藥二則

井口

疽

脇癰

肚癰

穿骨疽

魚口

便毒

橫痃

臀癰

附

方藥二則



總治大瘡

癰疽發背腫毒等症
治良方共四十五條

卷二 雜症

痲瘋

癩瘋發於肌表
非真大痲瘋

楊梅瘡

十一方

結毒

六方

臍疔

紅絲疔

蛇頭疔

一切頭瘡

腦土癰癤
奇痒漸至髮落

秃瘡癰癤

秃瘡

赤秃出膿

白秃

白屑

黃水瘡

羊鬚瘡

癰頭

癰瘰

秃瘡

治天泡瘡濕熱肥瘡

火珠瘡形

如珠

天泡瘡形

如水泡

雷頭風

頭上薄皮瘡

頭上生蛆

面耳目眉

面起白皮作痒出脂水

面生熱毒惡瘡

面生五色瘡

肺風

耳面肥瘡

骨槽風初生于耳前連及腮頰

眼苞菌毒

眼皮生紅泡

贅肉疾子

面腫二條

疥癩腫痛

眼苞菌毒

眼皮生紅泡

爛弦風眼

眼土生星子

眼皮生珠

目生努肉

倒睫

拳毛

耳中有核

耳內出膿

耳中

出血

諸蟲入耳



耳痛 爛耳 口舌喉瘡 上疳瘡 喉疳 牙疳 口疳 三條

燕窩瘡 生眉間 舌土出血 鼻生瘰肉 喉蛾 喉閉 重舌

腫脹 木舌 腫脹 風火喉腫痛 鼻生瘰肉 喉蛾 喉閉 重舌

喉中腫痛 喉風 汗斑 雀斑 白癩風 紫癩風 點痣

頭面諸疾 漆瘡 汗斑 雀斑 白癩風 紫癩風 點痣

頸後結毒 扭扣風 生項下 頰車 開不能合 鬚疽 三條

對口疽 瘰癧 證治十條

瘰癧 筋前生 共十一條 枯 手足諸疾 脫疽 多生 足指

脫疽 初起 水窠 黃泡 手足腫痛 以及無名腫毒 初起 年

久左右癰換 手指腫痛 手足心腫 又指 蚌頭毒 手足凍

代指 鵝掌風 穿掌毒 生于手心 手足皸裂 手足凍

瘡 手足瘡 痛紅爛 手足瘡 無力不能收口 石榴瘡 生

肘尖上 合骨 疔生 虎口 毒 爛 癰 疔 串生 于兩手

癰疽 生于 手足 肩背 累累 如赤豆 爛 癰 疔 串生 于兩手

脇疽 兩 流注 濕炎 證治 十條

腋狐臭 臍瘡 二條 龜胸 龜背 另見 慈幼

乳癰 乳巖 男人乳 癰 畧同

目次

多骨疽 三條

附骨疽

皮膚諸疾

蟻蠅腫塊蔓延
皮膚風痒二條

人身急救便藥
天行發斑

諸般熱癰
天火瘡初起似癰

子漸如水泡

瘡一十餘個
瘡瘰癧子三條

天行發斑

各種丹毒十三條

坐板瘡共七條

諸瘡發痒

治癰十方

肥瘡

并癰瘡

汗斑七條

肺癰證治六條

肺痿

圓癰

治疥并癰瘡

無故一孔出血

血疔出血不止

血箭

下部諸

疔并騎馬癰

囊腫三條

血疔

腸癰證治七條

下部諸

疔并騎馬癰

囊腫三條

腎囊風

腎子爛出

陰囊生瘡

陰囊生瘡

陰囊生瘡

疔痛并囊腫

腎子痛

陰囊生瘡

陰囊生瘡

陰囊生瘡

爛即龜頭生瘡

證治共七條

腎囊生瘡

腎囊生瘡

腎囊生瘡

于尾間高骨

脫肛治共七條

腎囊生瘡

腎囊生瘡

腎囊生瘡

十八條

魚口生左膝

腎囊生瘡

腎囊生瘡

腎囊生瘡

際懸癰

生穀道之前

腎囊生瘡

腎囊生瘡

腎囊生瘡

腿足諸疾

血風瘡多生于

腿足五條

腿足五條

腿足五條

人面瘡

膝上生癰

脚腿紅腫

穿火炙

腿臂受風濕

腫痛

腫腹內成塊

脚腿紅腫

穿火炙

腿臂受風濕

腫痛 脚上雞眼 遠行脚腫 足瘡 甲疽 甲疽膿血

努肉裹趾 脚底板紅腫熱痛 凍指 凍瘡 脚上風痒

脚丫濕爛 凍瘡手脚指欲墮 遠行脚上成泡 脚脛破

靴小擦破 脚上生瘡其孔久不長肉 鶴膝風 臙瘡

則年久臙瘡 脛瘡生脚肚

補遺 龍泉疽發在人中之間 虎鬚毒生於地角之上

繭唇

羊鬚瘡



外科摘錄 首卷

萍鄉文

晟叔來輯

男星瑞重校刊

星輝全校



外科十法

內消者、腫痛初起、隨卽用藥消散也。凡病癰疽、發背、對口、疔毒、其初起、增寒壯熱、有似傷寒而痛偏着一處、飲食如常者、蓄積有膿也。當初起時、膿尙未成、不過氣血乖違、逆于肉裏耳。外敷遠志膏、或貼普救萬全膏、內服銀花甘草湯、卽時消散。若係疔瘡、急宜刺破、或艾炙腫處、搽上蟾酥餅、貼以萬全膏、內服菊花甘草湯、隨卽

平復菊花連根帶葉皆治疔瘡之聖藥也。其中亦有挾風寒而發者，宜先用芎芷香蘇散以散之，隨服銀花菊花等藥，即可內消。須及早下手，不可遲滯。

艾炙法二

隔蒜炙法。勝用刀針。書云、不痛灸至痛、痛灸不痛時、凡治癰疽疔腫、流注及一切無名腫毒、以大蒜切片、安瘡頂上、用陳艾炷安蒜上、香點灸之、其艾炷大小、看瘡毒人小爲取裁、若癰疽之大者、以蒜搗餅敷之、灸之不痛者、灸至痛而止、痛者灸至不痛而止。若內已有膿、卽將烏金膏塗灸處、外用普救萬全膏貼之、爛開大口、卸却瘀膿、易收功也。若口不收、或腐肉不脫、洗用防風湯敷以海浮



散外貼萬全膏。腐肉自去。新自生。計日可愈。真神藥也。

神火照法三

凡腫在頭面以上者。不宜艾炙。恐引火氣上攻。宜用火照法。神乎其神。法用火照散。安紙撚中。以麻油浸點。每用火三枚。離毒半寸許。照之。自外而內。俾藥氣透入。皮色紫滯者。立轉紅活。瘡勢平塌者。立轉高聳。仍須不時照之。則毒氣頓解。轉陰爲陽。以收全功。且此法不止施于頭面。卽如發背等毒。亦宜用之。其頭面患毒。亦有用艾炙而愈者。因其毒純陰。平塌頑麻。非艾炙無功。但艾炷宜小如麥粒樣式。二法乃瘡疽門之寶筏。宜互相參攷。以神其用。

刀針砭石法四

法

二

首卷

凡毒有脹痛緊急。膿已成熟。無暇待灼艾火照者。卽宜用刀法開之。但刀法須在的確膿熟之時。又須要淺深合度。以左手按腫處。先看膿之成否。如按下軟而不痛腫。隨手起者。膿已成也。按之硬而痛。或凹陷不起者。膿未成也。已成膿者可刺。未成膿者宜姑待之。若脾虛氣弱者。宜托補之。又須看其膿之深淺。以手指按下。軟肉深者。其膿必深。軟肉淺者。其膿亦淺。若膿淺刀深。恐傷好肉。膿深刀淺。恐毒不出而內敗。最宜斟酌。更有伏骨之疽。膿腐於內。皮色不變者。宜以刀刺入深處。放出瘀膿。或灸開大口。放出之。不得姑息。因循。俾毒氣越爛越深也。其小刀須利刃。勿令病者見之。恐驚彼耳。砭法施于頭面及耳前後。因其漫腫無頭。急用此法以瀉。

其毒取上細磁鋒用竹箸夾定緊緊放鋒出半分對患處另以箸敲之徧刺腫處俾紫血多出爲善刺畢以精肉貼片時再用雞子清調乳香末潤之此地不宜成膿頭肉中空耳前後更多曲折提膿拔毒恒多未便故砭法斷宜早施

圍藥法五

書云用膏貼頂上敷藥四邊圍凡腫毒之大者將以成膿用烏金膏貼瘡頭上然後用萬全膏蓋之四旁用芙蓉膏敷之貼膏處取其出膿敷藥處取其消散並能箍住脚不令展開共作三層敷圍法第一層用烏金膏貼瘡頭若漫腫無頭以濕紙貼上先乾處是瘡頭也第二層萬全膏貼之第三層芙蓉膏圍之然字嘗用萬全



膏徧覆腫處連根脚一齊箍住其中消處自消潰處自潰竟收全功。可見膏藥之妙矣。

開口除膿法六

凡治瘡疽口小膿多則膿不出或出而不盡或薄膿可出硬膿難出以致瘀不去而新不生延綿難愈法當爛開大口俾瘀膿盡出爲善其爛藥烏金散最佳祛瘀肉不傷新肉且不甚掣痛爲至妙也若有膿管以綿紙撚裹藥紆入頻換數條卽化祛耳亦有頑硬之極非烏金散所能去者則用化腐紫霜膏搽之然終不若烏金散爲至穩

收口法七

凡瘡疽最難收口者山瘡肉夾襍瘀膿不盡所致庸工不識妄用



補瀉之劑。勉強收口。恐他日內毒復發。更甚於目前。惟子所用。海浮散。堪稱至寶。以此敷上。瘀肉自脫。不必用刀。新肉自生。又不藏毒。萬舉萬當也。大法先用防風湯洗之。再上末藥。洗時須避風。為主書云。頻將湯洗。切忌風吹。是已。更有體虛不能收口者。須內服補藥以助之。

總論服藥法八

凡瘡疽服藥。宜照顧脾胃爲主。不得已而用清涼。但期中病。切勿過劑。大法初起時。設有挾風寒者。宜先用芎芷香蘇散一劑以散之。散後而腫未消。隨用銀花甘草以和解之。若腫勢掀痛。大便閉結。內熱極盛者。則用衛生湯加大黃以疏利之。若病勢雖盛。而元

氣漸虛者。則清藥中須兼托補之劑。透膿散主之。若膿水已潰。必須托補元氣爲主。參耆內托散主之。如或元氣虛寒。則托補藥中須用辛熱以佐之。脾虛者。理中湯。參苓白朮散。氣虛下陷者。補中益氣湯。胃經受寒。飲食停滯者。藿香正氣散。氣血兩虛者。十全大補湯。加附子。鹿茸。輩間亦有虛而挾熱者。卽于前方中去附子。姜桂。加麥冬。銀花。丹皮等藥。以收功。是又不可不知也。大抵有陽毒有陰毒。有半陰半陽。宜細辨之。陽毒者。瘡勢紅腫。瘡頂尖聳。根脚不散。飲食如常。口渴便結。五心煩熱。脈洪數。陰毒者。瘡勢灰白。平塌。頑麻。少痛。根脚走散。食少便溏。手足厥冷。口鼻氣冷。脈沉遲。半陰半陽者。瘡腫雖紅。不甚聳尖。飲食差減。大便不結。寒熱往來。微

渴喜熱脉虛軟此三者必須細辨俾用藥寒溫得宜方爲合法治陽者清涼解毒治陰者溫中回陽半陰半陽之治清不傷胃溫不助邪如斯而已矣

復論五善七惡救援法九

或問癰疽五善七惡何謂也答曰飲食知味一也便溺調勻二也膿潰腫消膿水不臭三也神氣清爽動息自安四也脉息有神不違時令五也七惡者大渴發熱泄瀉淋閉一也膿潰尤腫膿稀臭穢二也目睛無神語聲不亮三也食少不化服藥作嘔四也恍惚嗜臥氣短力乏腰背沉重五也唇青鼻黑面目浮腫六也脉息無神或躁動不和七也古語云五善得三則吉七惡得四則凶余謂



七惡之凶不待四矣然而拯救之法正不容以不講大抵熱渴淋
閉喘急內熱皆直陰受傷宜用六味湯加麥冬五味如不應用小
珍湯加麥冬五味更不應用十全大補湯兼服六味地黃丸此乃
補陽生陰之說也若氣短倦怠昏愊乏力飲食不化乃陽虛之候
宜用補中益氣湯若睡臥不安宜用歸脾湯若飲食減少面目浮
腫宜用香砂六君子湯若兼脾胃虛寒更用理中湯腎氣虛寒須
用桂附八味丸兼用十全大補湯加附子此溫補回陽之法若瘡
疽潰後膿血去多變爲角弓反張手足搐搦肢體振搖而發痙者
并宜用參芪歸朮附子等藥以救之如不應急用十全大補湯間
有可生者當此時勢性命急如懸縷司命者宜叮嚀反覆熟思而