

欽定古今圖書集成博物彙編藝術典

第三百十卷目錄

醫部彙考二百九十

瘧門二

方一 驅瘧飲 柴胡去半夏加苦蕒湯 清中
白朮散 六丁散 柴葛二陳湯 破塊丸
湯 香薷飲 沃雪 香薷散 破塊丸
桂附 浸酒藥 新鬼丹 秘方鬼哭丹 甲藥
豆法 瘧疾方 桂枝羌活湯 桂枝芍藥湯
枝黃 枝黃 枝黃 枝黃 枝黃 枝黃
柴胡湯 柴胡湯 柴胡湯 柴胡湯 柴胡湯
音九 參胃湯 七葉湯 驅瘧飲 雄黃散
加味香薷飲 交加雙解飲 雄黃散
龍甲煎 芎歸電甲飲 四將軍飲 社稷飲
龍又方 柴胡四物湯 柴胡知母湯 平功
白朮湯 柴胡湯 柴胡湯 柴胡湯 柴胡湯
散 龍虎湯 柴胡湯 柴胡湯 柴胡湯 柴胡湯
平陳湯 地龍飲 十將軍丸 六和湯 烏頭
七葉湯 養胃丹 老龍飲 視方清脾丸
辰砂丸 養胃丹 老龍飲 視方清脾丸
癰疽 養胃丹 老龍飲 視方清脾丸
丹不飲 養胃丹 老龍飲 視方清脾丸
青安散 紅九子 養胃丹 老龍飲 視方清脾丸
方飲 養胃丹 老龍飲 視方清脾丸
物湯 桂枝黃芪知母石黃湯 定齋草餅子 虎
頭骨丸 五神驗丸 神聖藥餅子 虎
散

藝術典第三百十卷

醫部彙考二百九十

瘧門三

方一

二虎丹 中藏

治瘧

辰砂 硫黃

右熱多加辰砂寒多加硫黃並研細棗肉為丸如

龍眼大當發日新水七分一盞化下

柴胡去半夏加苦蕒湯 金匱

治瘧病發渴者亦治勞瘧

人參 黃芩 甘草各三兩 苦蕒根四兩

柴胡八兩 生薑二兩 大棗十二枚

右七味以水一斗二升煮取六升去滓再煎取三

升溫服一升日二服

清中驅瘧飲 張三錫

治瘧初起先寒後熱胃膈飽悶或戰後大渴

半夏 橘紅 柴胡 黃芩 檳榔 草果

山植 青皮 厚朴 蒼朮

右薑棗煎口乾熱多加花粉黃連瀉加五苓

六丁散

治瘧氣壯脈有力者量輕重虛實增減

檳榔一錢二分 貝母一錢五分 丁香 草果

知母 常山各一錢

右水酒各一碗煎一椀露一宿五更溫服

加減調中益氣湯

治瘧消導仍不止體倦脈弱或脈虛大者

治瘧消導仍不止體倦脈弱或脈虛大者

人參 白朮 白茯苓 陳皮 檳榔 山植

青皮 柴胡 蒼朮 黃芩 升麻 半夏

久瘧在陰分者加芍歸

白朮散

治邪氣留於經絡與衛氣相併日發瘧疾寒熱交

作者初受風寒者尤宜

麻黃 白朮 茯苓 桂心各七分 陳皮

青皮 桔梗 白芷 甘草炙 半夏製 紫蘇

烏梅肉各六分

右作一服水二盞薑三片棗一枚煎八分食遠服

正氣散 氏徐

退寒瘧正胃氣進飲食脾胃虛怯者用之尤宜

藿香 草果各二兩 半夏製 陳皮 厚朴

砂仁 甘草炙各一兩

右為細末每服三錢七生薑棗子煎俟瘧未發前

和查服

柴葛二陳湯 張辨

治一切瘧傷暑濕勞食等證

柴胡 乾葛 白朮 半夏製 黃芩 除之即

陳皮 蒼朮製 川芎 甘草各五分

右咬咀作一服水二盞生薑三片煎服乾葛川芎

蒼朮乃發散外邪之藥久瘧者及發散過者除之

不思飲食如山植麥芽枳實各五分

痰盛加貝母知母

寒痰停飲加草果仁

陽分汗多加人參黃芪去葛根

陰分加酒芍藥川當歸川芎生地黃各八分或加



升麻以提之久瘧微邪潮熱加四君子湯去祛邪之藥

欲截加常山檳榔青皮貝母各一錢

二木柴葛湯

一名驅邪湯治諸瘧必用之劑

白朮 蒼朮 柴胡 葛根 陳皮各七分

甘草五分

若一日一發及午前發者邪在陽分加枯荖茯苓半夏各一錢熱甚頭痛加川芎軟石膏各一錢口渴加石膏知母麥門冬各一錢

若間日或三日發午後或夜發者邪在陰分加川芎當歸酒炒芍藥熟地黃酒炒知母各一錢酒黃芩酒紅花各四分提在陽分可截之

若間一日連發二日或日夜各發者氣血俱病加人參黃芪白茯苓各一錢以補氣川芎地黃歸芍以補血

若陽瘧多汗用黃芪人參白朮以斂之無汗用柴胡蒼朮白朮黃芩葛根以發之

若陰瘧多汗用當歸白芍熟地黃芪黃藥以斂之無汗用柴胡蒼朮川芎紅花升麻以發之

胃氣弱飲食少或服截藥傷脾胃而食少者加人參酒芍藥大麥芽各一錢

傷食痞悶或有食積者加神麴麥芽枳實各一錢黃連五分

瘧甚加生薑半夏南星枳實炒各一錢黃連黃芩各六分

若欲截之加檳榔常山青皮黃芩各一錢烏梅肉

三箇

日久虛瘧寒熱不多或無寒但微熱者邪氣已無只八珍湯加柴胡黃芩黃芪陳皮以滋補氣血

香薷飲

治傷暑發瘧

香薷二錢 厚朴 扁豆炒各一錢

右咬咀水盞半烏梅一箇煎八分臨時入薑汁一匙溫服

沃雪湯

治山嵐瘴瘧

蒼朮炒 甘草鹽浸炙各三兩 防風 白芍藥 厚朴 乾葛各四兩 砂硝兩半研

右咬咀每服四錢水二盞煎一盞不拘時熱服服畢少時以薑蔥作羹或作粥喫了避風坐臥身體潤即愈兩滓又合煎服

香椿散

治瘧瘧惡心四肢疼痛口吐酸水不思飲食憎寒壯熱發過引飲並啞瘧

香椿嫩葉三兩酒浸炒 向日南壁土 甘草炙 陳芽茶各二兩

右爲細末每服四錢用酒調下如患久者更入甘遂柴胡各半兩空心臨臥服

破塊丸

治瘧瘧結成氣塊腹中不能消散

葶藶 大黃各一兩俱生用 右爲細末入麝香少許煉蜜丸如梧桐子大每服三十九空心冷酒下日三服

桂附二陳湯

治寒瘧但寒少熱多足腰足冷

附子炮裂 半夏製 陳皮 白茯苓 肉桂 炙甘草

右咬咀每服四錢水一盞薑三片棗一枚煎服二十四味斷瘧飲

治久瘧

常山酒炒 草果 檳榔 知母酒炒 陳皮 青皮 川芎 枳殼 柴胡 黃芩 荆芥 白芷 人參 紫蘇 蒼朮 白朮 半夏 貝薑 茯苓 桂心 葛根 甘草 杏仁 烏梅各等分

右咬咀每服一兩水二盞薑三片棗一枚煎八分發日早服

龍甲烏梅丸

治久瘧不愈

龍甲烏梅丸

龍甲酢炙一箇 常山酒炒褐色二兩 知母 貝母 檳榔各兩半 烏梅肉五錢 人參七錢 青皮去白一兩 草果仁八錢

右爲細末酒糊丸梧桐子大每服七十九酒下忌猪羊雞半月

浸酒藥

治久瘧服諸藥不效者

常山炒 蒼朮製各一兩 草果 青皮 陳皮 貝母 甘草各五錢 烏梅肉 人參各四錢 龍甲炙一箇

右咬咀用老酒半鎰入瓶中浸藥每晨服一二杯



忌怒勞冷食

斬鬼丹

明發

截瘡

人信五錢用明礬五錢蓋罐內火煨微有黑烟取出放土地上冷定入雄黃三錢明亮者

右共研勻極細五月五日五家粽角爲丸如小豆大未發前面東京水下三九嚼破吞之妙小兒一丸以吐爲度

祕方鬼哭丹

治諸瘧疾

萊豆一兩 信石明者三錢

右碾極細以蒸餅爲丸如萊豆大每服三九發日早五更以新汲水朝東吞下忌濕麪生冷葷腥

養藥豆法

治久瘧瘧母瘧塊者不宜用消痞丸散等破氣并熱藥只宜用製豆法食盡二升自然消愈

大黑豆二升 常山半斤 血竭五錢另研

枳實四兩

右用水一斗先剉常山枳實煮十餘沸入豆候熟去二味再入血竭末用文武火熬盡汁取出曬乾每日食之一二合後可灸章門二穴其瘧自消

瘧疾方

賈醫

不論新久男婦皆可服

白木土炒 白茯苓 川芎各六分 白芍酒炒

陳皮去白 當歸 山楂蒸取肉 知母鹽水炒

黃蘗鹽水炒各八分 甘草 黃連薑汁炒

青皮各三分 軟柴胡 半夏薑汁煮透曬乾

條芩酒洗各五分 枳殼麸炒二分

薑一片水煎服寒熱退去柴胡加人參三分孕婦不可用枳殼

桂枝羌活湯

下同

桂枝 羌活 防風 甘草炙各半兩

右爲粗末每服半兩水一盞半煎至一盞迎發而服之吐者加半夏麪等分

麻黃羌活湯

治瘧病頭痛項強脈浮惡風無汗者

麻黃去節 羌活 防風 甘草炙各半兩

右爲粗末每服半兩水一盞半煎至一盞溫服如吐者加半夏麪等分

麻黃桂枝湯

治瘧如前病證而夜發者

麻黃一兩去節 甘草炙三錢 黃芩五錢

桃仁三十箇去皮尖 桂枝三錢

右五味同爲細末依前服桃仁味苦甘辛肝者血之海血聚則肝氣燥經所謂邪氣深遠而入血故

夜發乃陰經有邪此湯發散血中風寒之劑

白芷湯

治瘧病先以大柴胡湯下過外微邪未盡者

白芷一兩 知母一兩七錢 石膏四兩

右爲粗末同煎服

桂枝芍藥湯

治瘧發熱大爭

桂枝三錢 黃芪 知母 石膏 芍藥各半兩

右爲粗末每服五七錢至一兩水煎如前藥服之

桂枝黃芩湯

服桂枝芍藥湯寒熱轉大者以此與服

柴胡一兩二錢 黃芩 人參 甘草各四錢半

半夏四錢 石膏 知母各五錢 桂枝二錢

右爲粗末依前服之

麻黃黃芩湯

麻黃一兩去節 桃仁三十枚去皮 黃芩五錢

甘草炙三錢 桂枝二錢半

右爲細末同煎服法桃仁味苦甘辛肝者血之海

血受邪則肝氣燥經所謂肝苦急急食甘以緩之故桃仁散血緩肝謂邪氣深遠而入血故夜發乃

陰經有邪此湯發散血中風寒之劑

桂枝石膏湯

桂枝五錢 石膏 知母各一兩半 黃芩一兩

右爲粗末分作三服水一盞同煎服

大柴胡湯

柴胡半斤 黃芩 芍藥各三兩 半夏半升洗

生薑五兩切 枳實四枚炙 大棗十二枚擘

大黃二兩

右七味以水一斗二升煮取六升去查再煎溫服

一升日三服

柴胡桂薑湯

柴胡半斤 桂枝三兩去粗皮 苦薑根四兩

乾薑 黃芩 牡蠣煅各二兩 甘草炙一兩

右七味以水一斗二升煮取六升去滓再煎取三

升溫服一升日三服

白虎加桂枝湯

仲景

脈經云朝發暮解暮發朝解

知母六兩 甘草炙二兩 桂去粗皮三兩

石膏一斤 粳米二合

右剉散每五錢水一盞半煎至八分去滓溫服汗出即愈

蜀漆散

蜀漆燒去腥 雲母燒三日夜 龍骨等分

右杵為散末發前以漿水服半錢匕如溫瘧加蜀漆一錢臨發時服一錢匕

牡蠣湯

治牡瘧

牡蠣四兩熬 麻黃 蜀漆各三兩 甘草二兩

以水八升先煮蜀漆麻黃去上沫得六升內諸藥煮取二升溫服一升若吐則勿更服

人參柴胡飲子和子

人參 柴胡 黃芩 甘草 大黃 當歸

芍藥各等分

右為粗末每服三錢水一盞薑三片煎至七分去滓溫服

澤溫服

對金飲子局方下同

治寒熱瘧疾愈後調理脾胃

橘紅炒赤黃色半斤 厚朴薑製 蒼朮製

甘草炙各二兩

右咬咀每服四錢水一盞薑三片棗一枚煎服一方加草果倍用蒼朮名草果平胃散

人參養胃湯

加桂治感寒發瘧

草果 茯苓 人參去蘆各半兩 甘草炙七錢

橘紅七錢半 厚朴去粗皮薑製 蒼朮湯洗炒

半夏湯洗各一兩 藿香洗去土五錢

右咬咀每服四錢水一盞半薑七片烏梅一枚煎至七分去滓熱服脈弱無力或寒多者加乾薑附子如脈洪有力熱多者加黃芩黃連柴胡朴蒼藿香發散也半果茯苓刮瘵也人參惟虛人最宜

四獸湯簡易方

治食瘧諸瘧和胃消痰

半夏製 人參 茯苓 白朮 橘紅 草果

生薑 烏梅 大棗各等分 甘草炙減半

右以鹽少許淹食頃濕紙厚裹慢火煨香熟每服四錢水一椀煎半椀溫服

治瘧木香丸直指方

牽牛一斤淘去浮者焙搗取末四兩 雞心檳榔

橘紅各二兩 青木香 熟附子 厚朴製

人參 官桂 京三稜 羌活 獨活 乾薑炮

甘草炙 川大黃剉焙 川芎 芍藥各半兩

肉豆蔻六箇

右為末磁器密收臨用秤牽牛末一兩諸藥末共一兩研和煉蜜丸桐子大每服二十九橘皮煎湯下以通利為度

觀音丸

取下暑毒瘴毒

半夏生 烏梅肉 母丁香 巴豆不去油各十枚

右為末薑麪糊丸麻子大上下以厚紙蓋貼有油

又再易紙每服五丸臨臥冷水下此方舟人於海

角遇一白衣授之

清脾飲清生方下同

治瘧瘧脈來弦數但熱不寒或熱多寒少口苦咽乾小便赤澀

青皮 厚朴薑製 白朮 草果 柴胡 茯苓

黃芩 半夏湯洗七次 甘草炙各等分

每服四錢水一盞半生薑三片棗一枚未發前服忌生冷油膩

七棗湯

治五臟氣虛陰陽相勝瘧瘧發作無時或寒多熱少或單寒者

附子一枚炮裂以鹽水浸再炮如此七次不浸去皮臍又方以川烏代附子以水調陳壁土為糊浸炮七次

右分作二服每服水一椀薑七片棗七枚煎七分臨發日早溫服

驅瘧飲局方下同

前胡 柴胡各四兩 桂心 桔梗 厚朴

半夏各三兩 黃芩 乾薑炮 甘草各二兩

每服四錢水一盞半薑三片棗四枚煎七分不拘時溫服

柴朴湯

柴胡 獨活 前胡 黃芩 白茯苓 半夏麪

蒼朮 厚朴 陳皮 藿香各一錢 甘草三分

水二鍾生薑五片煎一鍾發日五更服

氣弱加人參白朮

食不化加神麪麥芽山楂



加味香薷飲

香薷二錢 厚朴製 扁豆炒 白朮炒 陳皮
白茯苓 白芍藥炒 黃芩各一錢 甘草炙
黃連薑汁炒 猪苓 澤瀉各五分 木瓜七分
右生薑煎服

口渴實者

加天花粉葛根知母虛者加五味子麥
門冬人參

交加雙解飲子

治瘧疾癰瘡氣神效

肉豆蔻 草豆蔻各二枚一枚麴裏煨一枚生用
厚朴一寸一半用薑汁浸炙一半生用 甘草大者
二兩一半炙用一半生用 生薑二塊如棗大一塊
濕紙裏煨一塊生用
每服分一半用水一椀煎至一大盞去滓空心服

雄黃散

雄黃 瓜蒂 赤小豆各等分

右為細末每服半錢溫水調下以吐為度

龍甲煎丸

治瘧母

烏扇燒 黃芩 風婦熬 大黃 桂枝 石華
厚朴 紫葳 阿膠各七錢半 乾薑 人參
瞿麥 桃仁各五錢 赤硝 龍甲炙各三兩
柴胡 蜣螂熬各一兩五錢 蜂窠炙一兩
芍藥 丹皮 廬蟲炒各一兩二錢半 葶藶炒
半夏各二錢半

右二十三味為末取煨鼈下灰一斗清酒一斛五
斗浸灰候酒盡一半著鼈甲於中煮令泛爛如膠

漆絞取汁內諸藥煎為丸如桐子大空心服七丸
日三服千金方用鼈甲十二片又有海藻三分大
戟一分廬蟲五分無鼠婦赤硝二味以鼈甲煎和
諸藥為丸

瘧母丸

青皮 桃仁 紅花 神麴 鼈甲酢炙為君
三稜 蓬朮 海粉 香附俱用酢炙 麥芽

右為末神麴糊為丸如桐子大每服五七十九白
湯下

鼈甲飲子

治瘧疾久不愈脅下痞滿腹中結塊名曰瘧母

鼈甲酢炙 白朮 黃芪 草果 檳榔 川芎
橘紅 白芍藥 甘草炙 厚朴製各等分

右咬咀四錢水一盞薑七片棗一枚烏梅少許煎
七分溫服無時

消癖丸

治瘧母停水結癖腹脅堅痛

芫花炒 辰砂研細等分

右為細末蜜丸小豆大每服十九濃漿湯下下後

即服養胃湯

碧霞丹 運方

治久瘧不愈

肉桂去粗皮細研按南方 青黛別細研按北方
硫黃去沙石細研按中央 白礬別細研按西方
巴豆肉去油別研按東方 甲乙木

右件等分五月一日修治用紙裹以盤盛依方位
排定忌猫犬婦人見之安頓神前端午日午時用

五家粽尖和藥令勻丸梧子大令患人以綿裹一
丸塞鼻中男左女右於未發前一日安之約度尋
常發過少許方除

芎歸鼈甲飲

治勞瘵表裏俱虛真元未復疾雖暫止少勞復來
川芎 當歸 鼈甲酢炙 茯苓 青皮 陳皮
半夏 芍藥

右咬咀各等分每貼二兩用水二鍾生薑五片棗
二枚烏梅一枚煎至一鍾食遠服熱多加柴胡熱
少加草果

四將軍飲

治寒熱瘧疾作而仆厥手足俱冷昏不知人此雖
一時至急用之有驗

附子炮去皮二錢 訶子二錢半 陳皮三錢
甘草一錢半

右作一服水二鍾生薑七片棗七枚煎至一鍾不
拘時服

祛瘧飲

三發後可用因其衰而減之立效

知母鹽酒炒五錢 貝母九分 橘紅 山楂肉
枳殼各一錢五分 檳榔八分 柴胡七分

紫蘇一錢 甘草炙三分

用水二鍾煎至一鍾淨亦用水二鍾煎至八分俱
露一宿隔發日天明服頭煎未發前一箇時辰服
二煎

又方

治瘧乃史崇質得之四明胡君屢試屢驗



黃芪蜜炙一錢六分 人參 白朮 白茯苓
砂仁 草果 陳皮去白 五味子各一錢
甘草七分 烏梅三枚去核

水二鍾生薑三片棗二枚煎一鍾溫服

柴胡桂枝湯入門

治少陽瘧寒熱乍往乍來

柴胡二錢 桂枝 黃芩 人參 白芍藥
半夏各一錢 甘草五分

右剉一貼入薑三片棗二枚水煎服

柴胡加桂湯

治少陽瘧往來寒熱極驗

柴胡二錢 黃芩 桂枝各二錢 半夏一錢
甘草四分

右剉作一貼入薑三片棗二枚水煎服

麻黃白朮湯直指方

治風瘧

麻黃 桂皮 青皮 陳皮 川芎 白芷
半夏 紫蘇葉 赤茯苓 白朮 桔梗

細辛 檳榔 甘草各七分

右剉作一貼入薑三片棗二枚水煎服

柴胡四物湯

治三陰經溫瘧或夜發者

柴胡 生乾地黃各二錢 人參 半夏 黃芩
甘草 川芎 當歸 赤芍藥各一錢

右剉作一貼入薑三片棗二枚水煎服

柴胡知母湯齊

治熱瘧及瘧瘧

柴胡 知母各一錢半 蒼朮 黃芩 乾葛
陳皮 半夏 川芎各一錢 甘草炙七分

右剉作一貼入薑三片烏梅二枚水煎清晨服午
前又一服久瘧加人參當歸

爭功散得效

治熱瘧多效

知母 貝母 柴胡 常山 梔子 檳榔
地骨皮 甘草各一錢 蟬退二七箇

右剉作一貼入桃柳枝各五寸煎服未效加過路

葛藤五寸同煎服

龍虎湯登

治熱瘧火盛舌卷唇焦鼻如煙熏六脈洪緊

石膏二錢半 柴胡 黃連各一錢半 黃芩
知母 黃蘗各一錢 梔子八分 半夏七分

梗米百粒

右剉作一貼入薑三片棗二枚水煎服

柴陳湯門入

治瘧瘧

柴胡 半夏各二錢 人參 黃芩 陳皮
赤茯苓各一錢 甘草五分

右剉作一貼薑三片棗二枚水煎服

冷附湯得效方

瘧疾無過是痰實而脾胃弱停於胃膈所以五更
冷服使藥下達壯脾胃去痰實也

大附子一箇炮去皮臍

右切片分二貼每一貼入薑十片水煎去滓露一

宿五更初冷服

露薑飲

治瘧瘧

生薑四兩連皮搗爛止取自然汁

約明日當發隔夜安排將紗片蓋露一宿五更初
與童便合飲之或有痰吐出任之即安

平陳湯入門

治食瘧

蒼朮 半夏各二錢 甘草七分 厚朴 陳皮
赤茯苓各一錢二分半

右剉一貼薑三片棗二枚水煎服

常山飲

治勞瘧

常山 知母 草果各一錢半 良薑一錢
烏梅肉 甘草各五分

右剉作一貼入薑五片棗二枚水煎服

五勞丸直指方

治勞瘧及瘧瘧

常山三兩半 桃仁一兩二錢 辣桂七錢半

淡豉 烏梅肉各二兩半

右日乾為末蜜丸梧子大空心溫酒下三四十九

六和湯漢升

治瘧久不愈

常山二錢 知母 貝母 人參 草果 白芷
烏梅 檳榔 柴胡各一錢

右剉作一貼入薑三片棗二枚酒水相半同煎露

一宿臨發日服之

烏頭七聚湯直指方

治瘧久不愈



治勞瘧及寒瘧

大川烏一箇以鹽水浸泡七次去皮脂

右剉分二貼每貼入薑七片棗七枚葱白三莖水

煎稍冷先喫棗乃服藥

地龍飲方得效

治瘧瘧大熱煩躁

生地龍大者三條研細

用薑汁薄荷汁生蜜各少許新汲水調下熱熾加

龍腦少許

十將軍丸漢升

治久瘧及瘧母

縮砂 檳榔 常山 草果各二兩 三稜

蓬朮 青皮 陳皮 烏梅 半夏各一兩

右先將常山草果酒酢各一椀浸一宿後入八味

同浸至晚炭火煮乾為末酒酢各半打糊和丸梧

子大白湯下三四十九日二服服至八兩即除根

本方常山草果各二兩餘八味各一兩名老瘧丸

治同

一補一發丹門入

治久瘧內傷挾外感間發內治瘧外發汗

赤茯苓一兩 半夏 陳皮 柴胡 黃芩

蒼朮 葛根各七錢 常山三錢

右為末麪糊和丸梧子大白湯下七十九

辰砂丸方得效

治久瘧不損元氣

辰砂 阿魏真者各一兩

右研勻稀米糊和丸皂角子大空心以人參湯化

下一九

養胃丹監腎

治久瘧二三年不愈者

蒼朮 常山酒蒸各二兩 半夏 陳皮去白

厚朴各一兩半 赤茯苓 藿香 草果各一兩

甘草炙五錢 烏梅肉四十九箇

右為末薑湯打糊和丸梧子大薑湯下五七十九

老瘧飲門入

一名瘧瘧飲治老瘧結成癥癖在腹脅諸藥不愈

紫蘇葉 川芎各四分 蒼朮 草果 桔梗

青皮 陳皮 良薑各七分 白芷 赤茯苓

半夏 枳殼 桂心 乾薑 甘草各五分

右剉作一貼入鹽少許水煎空心服

祕方清脾丸漢升

治瘧三日一發或十日一發

白朮一兩半 半夏 青皮 黃芩各一兩

人參 檳榔 草果 蓬朮 厚朴各五錢

薑黃 甘草各三錢

右為末飯丸梧子大白湯下六七十九

黃甲丸監腎

治瘧母成塊久不愈

硃砂 阿魏 穿山甲酥炙 檳榔各五錢

雄黃 木香各二錢半

右為末泡黑豆去皮搗成泥和丸梧子大空心薑

湯下五十九

草果平胃散方得效

治脾虛作瘧不問寒熱先後宜服

蒼朮二錢 厚朴 陳皮 青皮 大腹皮

檳榔 草果各一錢 甘草五分

右剉作一貼入薑三片棗二枚水煎服

截瘧常山飲正傳

常山 草果 檳榔 知母 烏梅 穿山甲炮

甘草炙各一錢

右剉作一貼酒水相半煎露一宿臨發日早晨溫

服得吐為順一方加半夏柴胡去穿山甲如吐加

厚朴又或加青皮陳皮

截瘧七寶飲

一名七寶湯

常山 陳皮 青皮 檳榔 草果 厚朴

甘草各一錢

右剉作一貼酒水相半入薑五片烏梅二枚同煎

露一宿早晨溫服必須吐而愈

截瘧飲子

治久瘧不愈一服便差永不發如神

常山一錢半 檳榔一錢 丁香半錢 烏梅一箇

右剉作一貼好酒一盞浸一宿臨發日清晨溫服

人參截瘧飲同前

虛人截瘧宜用一切瘧並可截

人參 白朮 白茯苓 當歸 青皮 厚朴

柴胡 黃芩 知母 常山酒浸 草果仁

龍甲酥炙各八分 桂枝 甘草各三分

右剉作一貼入薑三片棗二枚烏梅一枚桃仁七

箇水煎露一宿臨發日五更空心服查再煎朝時

服糖拌烏梅下藥切忌雞魚豆腐麪食熱物



南京中醫藥大學圖書館藏

鬼哭丹

治痰瘧

常山一斤剖鮮浸春五夏三秋七冬十日曬乾

檳榔各四兩 半夏 貝母各二兩

右爲末雞子清和麪入藥末拌勻作丸梧子大每

三十九隔夜臨睡冷酒吞下次日早再一服

不二飲

一名止瘧散一名知母散治諸瘧疾一劑截住神

效

雞心檳榔要一雌一雄若重二錢則餘藥各二錢

常山 知母 貝母各等分

右剉作一貼酒一鍾煎至八分不可過熱熟則不

效露一宿臨發日五更面東溫服冷服亦可直至

已時食乾物若喫水便吐煎時不得令婦人見

勝金丸

能截一切瘧

常山四兩酒浸一宿曬乾 蒼朮泔浸曬 檳榔

草果各二兩

右爲末將浸常山餘酒煮糊和丸梧子大每服五

十九前一日臨臥時溫酒送下便臥至當發日雞

鳴時服七十九忌生冷熱物一方無蒼朮草果

玉露散

治瘧 寒水石 滑石 石膏 花粉各四兩 甘草一兩

右爲細末每服五錢新水調下

溫脾散

紫河車 萊豆各一兩 甘草半兩 砒一錢另研

右爲細末後入砒研勻每服半錢新水調下如是隔日發直待臨睡服藥如頻日發只夜深服忌葷酒魚兔等

萬安散

治一切瘧疾得病之初以其氣壯進此藥以取效

氣虛胃弱及妊婦不宜服之

蒼朮泔水浸去黑皮剉炒 厚朴薑汁炒 檳榔

陳皮去白 常山酒浸一宿 甘草炙

右六味各一錢半重和勻用水二盞酒一盞煎至

一盞半去滓夜露一宿當發日分作兩服溫早

最進一服俟其發時再進一服忌食熱物片時

紅丸子

專治食瘧

蓬朮 京三稜酢煮各二兩 青皮炒香三兩

阿魏一分酢化 胡椒一兩

右爲末別用陳倉米末同阿魏酢煮糊爲丸如梧

桐子大每服五十九加至百丸用薑湯吞下或因

食生果成瘧用麝香湯吞下一方有乾薑礬紅

孤膽丸

治邪瘧發作無時

孤膽一箇 硃砂 砒霜各半兩 阿魏 麝香

黃丹 萊豆粉各一分

右爲末於五月五日午時粽子尖和九梧子大空

心及發前冷酢湯服二九忌熱物

果附湯 治脾寒瘧疾不愈振寒少熱面青不食或大便澹

泄小便反多

草果仁 附子炮去皮臍

右等分咬咀每服半兩水二盞生薑七片棗一枚

煎至七分去滓不拘時候溫服

截瘧方

柴胡 草果 常山 知母 貝母 檳榔

右用酒水同煎露一宿臨發前二時服

又方

治瘧寒熱頭痛如破渴飲冰水外多汗出

人參 白朮 黃芪 黃芩 黃連 山梔

川芎 蒼朮 半夏 花粉

右咬咀水二鍾薑三片煎服

又方

治瘧病發渴

生地 麥門冬 天花粉 牛膝 知母 葛根

炒藥 生甘草

右咬咀水煎

截瘧青蒿丸

青蒿半斤 冬瓜葉 官桂 馬鞭草

右焙乾爲末水丸胡椒大每一兩分四服於當發

之前一時服盡一方青蒿一兩冬青葉馬鞭草桂

各二兩未知孰是姑兩存之以俟知者

又方

瘧疾後服之

白朮 半夏各一兩 黃連 陳皮各半兩

白芍三錢

右爲末粥九梧子大每服六十九薑湯下



草果 川芎 紫蘇葉 白芷 良薑 炙甘草
青皮去白炒 陳皮去白

右等分爲粗末每服三錢水一盞煎至七分去查
溫服雷查兩服併一服當發日進三服不以時

參蘇飲

橘紅 枳殼 桔梗 甘草炙各半兩 半夏

乾葛 蘇葉 前胡 人參 茯苓各七錢半

右劉每服五錢水盞半生薑七片棗一箇煎微熱
服一方有木香半兩

小柴胡湯

柴胡八兩 黃芩 人參 甘草炙各三兩
半夏半升

右劉每五錢水盞半生薑五片棗一枚煎服不拘
時

小柴胡加桂湯

小柴胡湯去人參加桂一兩

右服法與本方同

桂枝加黃芪知母石膏湯

桂枝湯加黃芪知母石膏各四錢半

右服法與本方同

白芷石膏三物湯

白芷一兩 知母一兩七錢 石膏四兩

右爲粗末每半兩水一盞半煎一盞溫服

起鬼丹

治一切瘧疾神效

砒一錢 大豆七錢 甘草七寸 雄黃 輕粉
荷葉各半錢

右爲末滴水爲丸如小豆大重午日未出不見雞
犬婦人修合每服一丸無根水下平日夜視北斗
來日服忌熱物

蒼木湯

治秋深久瘧胃中無物又無痰癖腹高而食少俗
謂瘧氣入腹

蒼木 草烏頭一錢 杏仁三十箇

右爲粗末都作一服水三升煎至一半均作三服
一日服盡迎發而服

冠效餅子

黃監下

治一切瘧疾

定粉 龍腦 麝香各半兩 硃砂一兩一分

荷葉 萊豆粉 炙甘草各五兩 信炙二兩半

右爲細末煉蜜丸每兩作二十九粒捏作餅金箔二
十五張爲衣每服一餅以新汲水磨化每日發者
未發前服間日發者不發夜服隔數日發者一日
夜服連日發者凌晨服

伏翼丸

聖惠方

治久瘧不止

蝙蝠一枚炙 蛇蛻皮一條燒 鼈甲一枚酢炙

蜘蛛一枚去足炙 麝香五分

右爲末五月五日午時研勻入煉蜜和丸麻子大
每溫酒下五丸

瞻仰丸

方局

治一切瘧

常山四兩炒存性 草果二兩炒存性

右爲末薄糊丸梧子大每臥時冷酒服五十九五

更再服忌鴨羊熱物

三聖丸

治諸瘧不拘遠近大小

恆山 檳榔各一兩 鯪鯉甲煨焦一兩半

右爲末糯粉糊丸萊豆大黃丹爲衣每服二十五
丸如上法服

定齋草果飲子

良方下

快脾治瘧

草果 厚朴薑製各二錢 蒼木米泔水浸三錢

半夏麵 陳皮各一錢半 甘草半錢 烏梅一箇

右咬咀每服半兩水一盞半薑五片棗二枚煎至
七分不拘時服寒多者加乾薑附子熱甚者加柴

胡瘧瘧加檳榔所加者各等分一方加人參一方
熱多者加石膏

虎頭骨丸

治一切瘧疾

虎頭骨酥炙二兩 硃砂細研 牡蠣粉 桂心

川大黃劉炒 知母各一兩 乳香研 甘草炙

烏梅肉炒 附子炮 枳殼蘇炒 木香 常山

麝香研各半兩 桃仁三七枚去皮尖雙仁炒

生薑一塊如雞子大半煨半生

右爲末入研藥令勻煉蜜和搗三二百杵丸如梧

桐子大每服十五丸食前用桃枝湯下

五行神驗丸

治一切瘧疾

靛花二兩方東 桂心一兩方南 乾薑一兩方西

巴豆一兩方北 硫黃一兩方中 麝香少許



右將五般藥於盤內據五方安排定取四月二十
八日夜安桌子於中庭露以香一爐當虔心如
是露七夜至端午日早修合將巴豆去殼湯煮五
十沸搗研餘藥爲散入麝香以薄糊調凝花末爲
丸如櫻桃大合時忌女子等見九子焙乾於盒內
盛發日淨手取以綿裹香火炙令熱男左女右預
前帶安耳中便利時除却淨手後再安耳中不得
女子捻觸女子患男子與安忌一切葷腥果子一
方無麝香

神聖藥師餅

治瘧疾等證

砒 雄黃各一錢半 白麪七錢半 乾臙脂一錢

右各研極細和勻滴水爲餅子如棋子大每服
三餅臨臥細嚼冷水送下忌濕麪葷腥生硬冷物
分作三十服虛實大小加減服之

截瘧散

雞骨常山 茯神去皮木 肉桂去粗皮各等分
甘草減半熱多加之

右不犯鐵器爲粗散每服半兩用常酒大半碗浸
一宿於當發日早晨空心去渣冷服服後不可吃
熱湯查再浸或略煎近發時再服一方不用肉桂
茯神却用檳榔烏梅要在人增損也凡瘧須是發
作三五次後却用截之爲妙



欽定古今圖書集成博物彙編藝術典

第三百十一卷目錄

醫部彙考二百九十一

瘧門四

方二 雙甲丸 知母湯 水香犀角丸 甘草
人參湯 獨蒜丸 朱砂丸 橘皮甘草湯 杏仁
九烏梅 獨蒜丸 茯苓丸 升麻湯 犀角湯
柴胡湯 右歸飲 五福飲 一陰煎 加減一
陰煎 三陰煎 五陰煎 大營煎 小營煎
補陰 柴胡飲 休庵飲 正柴胡飲 三柴胡飲
中飲 柴胡飲 五柴胡飲 柴胡飲 柴胡飲
大溫中飲 雲梨煎 理陰煎 柴胡飲 柴胡飲
溫胃飲 開胃煎 牛膝煎 何人飲 追瘧
飲 木賊煎

單方

鍼灸

導引

醫案

藝術典第三百十一卷

醫部彙考二百九十一

瘧門四

方二

雙甲丸 良方
下同

治肝瘧色蒼蒼然顛掉氣喘久不瘥者或久熱勞

微動如瘧

龍甲去裙襖酢浸炙 蜀漆葉 烏梅肉炒

常山 知母各一分 甘草炙 苦參 葵藿

石膏各半兩 香豉一合微炒

右爲細末煉蜜爲丸如梧桐子大每服十九丸未發
前米飲下臨發再服

知母湯

治肝瘧上焦壅滯心煩頭疼寒熱不止肌肉消瘦
不下食

知母 地骨皮 升麻各一兩 犀角鎊 人參

龍甲去裙襖酢炙黃 麥門冬去心焙 柴胡

石膏各二兩 生甘草酒拌 虎頭骨酥炙一兩半

右爲粗末搗篩每服四錢水一大盞入香豉五十
粒煎至六分去滓不拘時溫服一方無虎頭骨有
赤茯苓一兩

赤茯苓一兩

木香犀角丸

治肝瘧

木香 羚羊角鎊 犀角鎊各一兩半 升麻

元參 猪苓 檳榔各二兩半 龍甲酥炙

甘草炙各二兩 豉炒五錢

右爲細末煉蜜和丸如梧桐子大每服三十九丸用
溫酒或米飲送下日再服體熱即去一方無甘草
檳榔加大黃五兩

甘草湯

治心熱爲瘧不止或止後熱不渴乍來乍去令人

煩心甚欲飲清水反寒多不甚熱者

甘草一兩 蜀漆三兩 常山 龍甲各四兩

石膏五兩 香豉一合 梔子 烏梅各十三枚

竹葉切二升

右咬咀以水九升煮取三升分三服

麝香丸

治心瘧

麝香 黃丹炒紫色 砒霜各一分 硃砂二兩
金箔三十片

右細研令勻用粳米飯和丸如梧桐子大男左女
右中指節上用緋絹裹繫一丸發前以冷酢湯下

一丸忌食熱物

硃砂丸

治心瘧

杏仁十枚去皮尖雙仁麝炒微黃 常山一兩

光明砂半兩細研

右爲末研入硃砂令勻煉蜜和丸如梧桐子大未
發前以粥飲下十五丸欲發時再服

橘皮甘草湯

治脾臟不和瀉痢瘧疾腹痛下部無力體重足痿
腳下痛飲食中滿四肢不舉等病陸景淵方會以

治瘧甚效

橘皮生用 甘草炙 厚朴去皮薑汁製各一兩

羌活 防風 肉豆蔻 白茯苓各二錢五分

川芎半兩 吳茱萸一錢

右咬咀每服四錢水一盞半生薑三片煎至八分
去滓食前服

人參飲 良方
下同

治脾瘧

人參 甘草炙各三兩 陳橘皮湯浸去白半兩

烏梅三枚去核焙 草豆蔻十枚去皮

右剉爲末每服五錢用濕紙裹煨熟用水二盞生



薑一片聚一枚擘碎煎至一盞未發前溫服

獨蒜丸

能截脾寒

大蒜不以多少

右於五月五日搗爛次入礬紅拌勻爲丸如圓服

大每服一丸大蒜湯嚥下

良薑丸

醒脾治瘧

良薑二兩

右爲末豬膽汁和丸如梧桐子大紫蘇湯空心下

二十九

人參丸

治肺瘧心寒熱善驚如有所見

人參 龍甲去裙襴酢炙 常山 甘草炙

桃仁去皮尖雙仁炒研 肉蓯蓉酒浸切焙

升麻各三分 桂心去粗皮五錢 烏梅肉炒

龍齒研各一兩 丹砂研 阿魏研各一分

杏仁去皮尖雙仁炒研半兩

右爲末煉蜜九如梧桐子大每服十五丸空心用

米飲下未發時併二服

杏仁丸

治肺瘧

杏仁四十枚湯泡去皮尖雙仁炒 常山三分

丹砂別研五錢 甘草一分

右爲細末煉蜜和丸如菉豆大每服十五丸未發

米飲下日再服之

烏梅丸

治腎瘧令人灑灑然腰脊痛大便難目眇手足寒及諸瘧久不瘥者

烏梅肉炒一兩五錢 常山三分 豉二合炒

麝香別研一錢 虎頭骨酥炙 附子炮去皮臍

肉蓯蓉酒浸焙各五錢 桂心 知母焙各一分

桃仁湯浸去皮尖雙仁炒別研一兩

右搗研爲末拌勻煉蜜和丸如梧桐子大每服二

十九空腹米飲下未發服一方無知母

菴蓉丸

治腎瘧

肉蓯蓉酒浸切焙 烏梅肉炒 桂心 甘草炙

升麻各五錢 淡豉炒 桃仁湯浸去皮尖炒研

常山各三分

右搗研爲末和勻煉蜜爲丸如梧桐子大未發日

空腹溫酒下二十九丸飲亦得至發時更服二十

丸

升麻湯

治足少陽瘧身體解休見人心惕惕然熱多汗出

升麻 龍甲去裙襴酢炙 淡竹葉各一兩

常山一兩五錢 犀角屑 麥門冬去心焙

知母各三兩 甘草炙五錢

右咬咀如麻豆大每服五錢水一盞半煎至一盞

去滓空心日午溫服

犀角湯

治足少陽瘧解你熱多汗出

犀角鎔 甘草炙各一兩 麥門冬去心 升麻 知母 龍甲酢炙去裙襴各一兩半 石膏研二兩

右咬咀如麻豆大每服五錢水一盞半煎至一盞去滓於未發前溫服

柴胡湯

治足太陽瘧寒熱

柴胡 常山 知母焙 龍甲去裙襴酢炙黃

青蒿乾者 甘草炙 枳殼麩炒 官桂各一兩

右粗搗篩每服三錢水一盞入柳枝心七枚葱白

二寸細切同煎至七分去滓空腹溫服發前再服

順氣湯

治足陽明胃瘧胃脅支滿腹大

厚朴薑汁製 橘紅焙 白朮 半夏製各一兩

乾薑炮 柴胡 甘草炙各五錢

右粗搗篩每服三錢水一盞薑五片棗二枚擘破

煎七分去滓不拘時溫服

枳殼湯

治胃瘧心腹脹滿不食

枳殼去瓢麩炒三兩 厚朴去皮薑製 人參

白朮 白茯苓各二兩

右粗搗篩每服四錢水一盞半入生薑一棗大切

煎至一盞去滓溫服

藥餽飩

治證同前

良薑 吳茱萸 胡椒各一分

右爲細末豬脾一條剉作臚加五味炒之一半滾

藥一半不滾藥並作餽飩有藥者以墨點之遇點

者吞下無藥者嚥下一服效

大補元煎

治男婦氣血大壞精神失守危劇等證

人參少則用一二錢多則用一二兩 熟地少則用

二三錢多則用二三兩 山藥炒 杜仲各二錢

枸杞 當歸各二三錢泄瀉者去之 炙甘草一二錢

山茱萸一錢畏酸吞服者去之

水二鍾煎七分食遠溫服

右歸飲

凡命門之陽衰陰勝者宜此

熟地二三錢或加至一二兩 山藥炒 枸杞

杜仲薑製各二錢 山茱萸肉一錢 甘草炙

肉桂各一二錢 製附子一二三錢

水二鍾煎七分食遠溫服

五福飲

凡五臟氣血虧損者此能兼治之足稱王道之最

人參隨宜 熟地隨宜 白朮炒一錢五分

當歸二三錢 炙甘草一錢

水二鍾煎七分食遠溫服或加生薑三五片

一陰煎

凡瘧疾傷寒屢散之後取汗既多脈虛氣弱而煩

渴不止潮熱不退者此亦汗多傷陰水虧而然也

皆宜用此加減主之

熟地黃三五錢 生地黃 白芍藥 麥門冬

丹參各二錢 牛膝一錢五分 甘草一錢

水二鍾煎七分食遠溫服

加減一陰煎

治證如前而火之甚者宜用此方

生地黃 芍藥 麥冬各二錢 熟地黃三五錢

炙甘草五七分 知母 地骨皮各一錢

水二鍾煎服

三陰煎

凡瘧疾汗多邪散而寒熱猶不能止是皆少陽厥

陰陰虛血少之病微有火者宜一陰煎無火者宜

此主之

當歸二三錢 熟地黃三五錢 炙甘草一錢

芍藥酒炒 棗仁各二錢 人參隨宜

水二鍾煎七分食遠服

五陰煎

凡真陰虧損脾虛瘧痢等證忌用潤滑宜此主之

熟地五七錢或一兩 山藥炒 芍藥炒各二錢

白朮炒 炙甘草各一二錢 扁豆炒二三錢

茯苓一錢五分 人參隨宜 五味子二十粒

水二鍾加蓮肉去心二十粒煎服

大營煎

治真陰精血虧損等證

當歸三二錢或五錢 熟地三五七錢 枸杞

杜仲各二錢 炙甘草 肉桂去皮各一二錢

牛膝一錢五分

水二鍾煎七分食遠溫服

小營煎

治血少陰虛此性味平和之方也

當歸 芍藥酒炒 山藥炒 枸杞各二錢

熟地二三錢 炙甘草一錢

水二鍾煎七分食遠溫服

補陰益氣煎

凡屬陰氣不足而虛邪外侵者用此升散神效

參人一二三錢 當歸 山藥酒炒各二三錢

熟地三五錢或一二兩 陳皮 炙甘草各一錢

升麻三五分大浮於上者去之 柴胡一二錢無病者去之

水二鍾加生薑三五七片煎八分食遠溫服

休庵飲

此止瘧最妙之劑也若汗散既多元氣不復或以

衰老或以弱質而瘧有不能止者俱宜用此

人參 白朮炒 當歸各三四錢 炙甘草八分

何首烏製五錢

水一鍾煎七分食遠服查再煎或用陰陽水各一

鍾煎一鍾查亦如之俱露一宿次早溫服一鍾飯

後食遠再服一鍾

大和中飲

治飲食雷滯積聚等證

陳皮一二錢 枳實一錢 砂仁五分 山楂

麥芽各二錢 厚朴 澤瀉各一錢五分

水一鍾半煎七八分食遠溫服

小和中飲

治瘧病胃膈脹悶

白茯苓 陳皮 厚朴各一錢五分 山楂肉

扁豆炒各二錢 甘草五分

水一鍾半加生薑三五片煎服

一柴胡飲

凡感四時不正之氣以致寒熱如瘧等證但外有

邪而內兼火者宜此主之

柴胡二三錢 芍藥二錢 黃芩 生地黃

陳皮各一錢五分 甘草八分
水一鍾半煎七八分溫服

二柴胡飲

凡遇四時外感無火者宜此主之

陳皮 厚朴 柴胡各一錢五分 半夏二錢
細辛一二錢 生薑三五七片 甘草八分
水一鍾半煎七八分溫服

三柴胡飲

凡人素稟陰分不足或有感冒不得不從解散而
血氣虛弱不能外達者宜此主之

柴胡二三錢 白芍藥一錢五分 炙甘草
陳皮各一錢 當歸二錢諸症者以熟地代之 生薑三五片
水一鍾半煎七八分溫服

四柴胡飲

凡人元氣不足外感風寒宜此主之

柴胡一二三錢 炙甘草一錢 生薑三五七片
當歸二三錢諸症者以熟地代之 人參二三錢或五七錢
水二鍾煎七八分溫服

五柴胡飲

凡中氣不足而外邪有不散者非此不可

柴胡一二三錢 芍藥炒一錢五分 當歸
白朮各二三錢 熟地三五錢 炙甘草一錢
陳皮酌用或不必用
水一鍾半煎七分食遠熱服

正柴胡飲

治外感風寒發熱惡寒頭痛身痛痰癰初起等證
柴胡一二錢 防風 甘草各一錢 芍藥二錢

陳皮一錢五分 生薑三五片
水一鍾半煎七八分熱服

麻桂飲

治陰暑瘧疾夏月用之不必厚蓋但取津津微汗

官桂一二錢 當歸三四錢 炙甘草一錢
陳皮隨宜用或不用亦可 麻黃二三錢
水一鍾半加生薑五七片或十片煎八分去浮沫
不拘時服

大溫中飲

治一切陽虛寒瘧陰暑之證

當歸諸症者以熟地代之 白朮土炒各三五錢
甘草炙一錢 人參二三錢甚者一兩或不用
柴胡二三錢 麻黃 肉桂 乾薑炒各一二錢
或用煨生薑三五七片

水一鍾半煎七分去浮沫溫服或略蓋取微汗

柴陳煎

治傷風兼寒多痰癰等證

柴胡二三錢 陳皮一錢半 甘草一錢 半夏
茯苓各二錢 生薑三五七片
水一鍾半煎七分食遠溫服

柴苓煎

治傷寒表邪未解外內俱熱癰痢等證

柴胡 黃芩 梔子 澤瀉 木通各二錢
枳殼一錢五分
水二鍾煎八分溫服

柴胡白虎煎

治陽明溫瘧表邪不解等證

柴胡 黃芩 麥門冬各二錢 石膏三錢
細甘草七分
水一鍾半加竹葉二十片煎服

歸柴飲

治營虛不能作汗及真陰不足外感寒邪難解者

當歸一兩諸症者以熟地代之 柴胡五錢 炙甘草八分
水一鍾半煎服或加生薑三五片或加陳皮一錢
或加人參

雪梨漿

解煩熱退陰火此生津止渴之妙劑也

清香甘美大梨削去皮

別用大椀盛清冷甘泉將梨薄切浸於水中少頃
水必甘美但頻飲其水勿食其相退陰火極速也
理陰煎

通治真陰虛弱等證

熟地三五七錢或一二兩 炙甘草一二錢
當歸二三錢或五七錢 乾薑炒黃色一二三錢
或加肉桂一二錢


水二鍾煎七八分熱服此方加附子即名附子理
陰煎再加人參即名六味回陽飲治命門火衰陰
中無陽等證

養中煎

治瘧病中氣虛寒者

人參一二三錢 山藥炒黃 白茯苓各二錢
扁豆炒二三錢 甘草炙一錢 乾薑炒一二錢
水二鍾煎七分食遠服

溫胃飲



治中寒瘧病

人參一二三錢或一兩 白朮炒一二錢或一兩
扁豆炒二錢 炙甘草 陳皮各一錢或不用
乾薑炒黑一二三錢 當歸一二錢清泄者勿用

水二鍾煎七分食遠溫服

胃關煎

治脾腎虛寒瘧病

熟地三五錢或一兩 山藥炒 扁豆炒各二錢
吳茱萸製五七分 炙甘草一二錢 焦乾薑
白朮炒各一二三錢

水二鍾煎七分食遠溫服

牛膝煎

截瘧大效凡邪散已透而血氣微虛宜此主之

牛膝二錢 當歸 陳皮各三錢

右用好酒一鍾浸一宿次早加水一鍾煎至八分
溫服

何人飲

凡氣血俱虛久瘧不止宜此截之

何首烏三錢至一兩隨輕重用之 當歸二三錢
人參三五錢或至一兩 陳皮二三錢大虛者不用

煨生薑三片多寒者用三五錢

水二鍾煎八分於發前二三時溫服若善飲者以
酒一鍾浸一宿次早加水一鍾煎服亦妙再煎不
必用酒

追瘧飲

凡血氣未衰屢散之後而瘧有不止者用此截之
何首烏一兩製 當歸 甘草 半夏 青皮

陳皮 柴胡各三錢

右用井水河水各一鍾煎一鍾粗亦如之同露一
宿次早溫服一鍾食遠再服一鍾

木賊煎

凡瘧疾形實氣強多濕多痰者宜此截之大效

半夏 青皮各五錢 木賊 厚朴各三錢

白朮 蒼朮 檳榔各一錢

酒二鍾煎八分露一宿於未發之先二時溫服

單方

多霜以雞羽掃之瓶中密封陰處久亦不壞凡寒熱
瘧疾取一錢半熱酒服之本草

邪瘧取燒尸場上土同葱搗作丸塞耳或繫臍上即
止男左女右

斷絕熱瘧五月五日午時取蚯蚓屎以麪和九梧桐
子大硃砂為衣每服三丸無根水下忌生冷即止皆
效或加菖蒲末獨頭蒜同丸方書

寒熱瘧疾體虛汗多者黃丹百草霜等分為末發日
空心米飲下三錢不過二服愈或糊丸或蒜丸皆效

又方黃丹飛炒一兩恆山末三兩蜜九梧子大每服
五十九溫酒下平旦及未發將發時一服即效

端午日用黃丹炒二兩獨蒜一百箇搗九梧子大每
服九丸空心長流水面東下二三發後乃用神效亦
治痢疾方書

又方黃丹炒建茶等分為末溫酒服二錢方書

又方黃丹飛焙麪糊丸芡子大每棗子一枚去核包

一丸紙裹煨熟食之

溫瘧不止黃丹炒半兩青蒿重尿浸二兩為末每服
二錢寒多酒服熱多茶服方書

瘧疾寒熱一日一發或二日發或三日一發古城石
灰二錢頭垢五靈脂各一錢研末飯丸皂子大每服

一九五更無根水下即止方書

不二散用砒一錢麪二兩和勻香油一斤煎黃色以
草紙壓去油入茶三兩為末每服一錢發日早冷茶

下本草

瘧瘧鬼瘧食瘧蛇含石末一兩信石末一兩研勻入
水火鼎內上以錢蓋六一泥固濟煨至藥升在戔刮

下為末米糕糊丸菉豆大雄黃為衣每服一丸黑豆
研水五更送下摘元

久瘧不止用硫黃硃砂等分為末每服二錢臘茶清
下發日五更服當日或大作或不作皆其效也寒多

倍硫熱多倍砂

又方用硫黃臘茶等分為末發日早冷水服二錢二
服效寒多倍硫熱多倍茶

溫瘧不止當歸一兩水煎飲日一服聖濟總錄

諸瘧寒熱赤脚馬蘭搗汁入水少許發日早服或入
少糖亦可

瘧疾寒熱用青蒿一握水二升搗汁服之肘后

又方用端午日采青蒿葉陰乾桂心等分為末每服
一錢先寒用熱酒先熱用冷酒發日五更服之切忌

發物

溫瘧疾甚但熱不寒用青蒿二兩童子小便浸焙黃
丹半兩為末每服二錢白湯調下仁存



瘧疾寒熱齊頭蓄根滴金根各一把搗生酒一鍾未發則服以查傳寸口男左女右二日便止名方

久瘧不瘥者耳子或根莖亦可焙研末酒糊丸梧子大每酒服三十九日二服生者搗汁服亦可方集驗

勞瘧積久不止者長牛膝一握生切以水六升煮二升分三服清早一服未發前一服臨發時一服外要

瘧瘧邪熱多葵子陰乾爲末酒服二錢午日取花授手亦去瘧聖

瘧疾寒熱馬鞭草搗汁五合酒二分二服千金

緊臂瘧瘧早蓮草搗爛男左女右置寸口上以古文錢壓定帛繫住良久起小泡謂之天灸其瘧即止甚效生貴

瘧疾不止蒴藿一大握炙令赤色以水濃煎一盞欲發前服方門

瘧疾不止莢若根燒灰水服一合量人強弱用千金

截瘧用常山三兩漿水三升浸一宿煎取一升欲發前頓服取吐或浸酒飲之外臺

又方用常山一兩秫米一百粒水六升煮三升分三服先夜未發臨發時服盡附后

瘧病數年不瘥兩劑瘧一月以來者一劑瘧名恆山九恆山二兩研末雞子白和丸梧子大瓦器煮熟曬乾收之每服二十九竹葉湯下五更一服天明一服發前一服或吐或不吐即止千金

溫瘧熱多恆山一錢小麥三錢淡竹葉二錢水煎五更服甚良藥性

瘧瘧積瘧臨發時以酢和附子塗於背上附后

寒瘧積瘧巴豆一枚去心皮射罔去皮如巴豆大大

棗去皮一枚搗成丸梧子大清旦先發時各服一丸白湯下

脾寒厥瘧先寒後熱名寒瘧但寒不熱面色黑者名厥瘧寒多熱少面黃腹痛名脾瘧三者並宜服此不

蛙草烏頭削去皮沸湯泡二七度以盡蓋良久切焙研稀糊丸梧子大每服三十九薑十片棗三枚葱三根煎湯清早服以棗壓之如人行十里許再一服絕勿飲湯便不發也東坡

新久瘧疾用葛葶草一握去兩頭秋冬用乾者恆山末等分以淡漿水二大瓊浸藥星月下露一宿五更煎一錢分二服當吐痰愈

脾寒瘧疾石胡荽一把杵汁半碗入酒半碗和服甚效集簡

治瘧不止火麻葉不問榮枯鍋內文武火慢炒香取起以紙蓋之令出汗盡爲末臨發前用茶或酒下移病人原睡處其狀如醉醒即愈

又方火麻葉如上法爲末一兩加縮砂丁香陳皮各半兩酒糊丸梧子大每用酒茶任下五七丸能治諸瘧壯元氣普

諸瘧久瘧用三姓人家寒食麪各一合五月五日午時采青蒿搗自然汁和丸棗豆大臨發日早無根水下

下一丸一方向加炒黃丹少許德生

瘧疾寒熱黃芩湯飲數升大吐即愈附後

虛勞久瘧青蒿搗汁煎過如常釀酒飲

瘧疾寒熱獨頭蒜炭上燒之酒服方寸匕附後

又方用桃仁半片放內關穴上將獨蒜搗爛卷之縛住男左女右即止治人屢效簡便

瘧疾寒熱青皮一兩燒存性研末發前溫酒服一錢臨時再服聖

久瘧用真阿魏好丹砂各一兩研勻米糊和丸皂子大每空心人參湯化服一丸即愈千金

瘧瘧寒熱阿魏脂各一豆大研勻以蒜膏和覆虎口上男左女右聖濟

食瘧積瘧巴豆去皮心二錢皂莢去皮子六錢搗丸菜豆大一服一丸冷湯下附後

瘧瘧寒熱相思子十四枚水研服取吐止瘧千金

脾胃聚痰發爲瘧疾生薑四兩搗自然汁一酒杯露一夜於發日五更面北立飲即止未止再服易簡

瘧瘧發熱連背項者茴香子搗汁服之千金

男女瘧疾馬齒莧搗繫手寸口男左女右瘧疾寒熱翻白草根五七箇煎酒服之

熱瘧不止翹搖草杵汁服之方貴利

斷截瘧疾紫莢一握搗爛於周身摩擦得汗即愈臨發前一時用之

勞瘧劣弱烏梅十四枚豆豉二合桃柳枝各一虎口甘草三寸生薑一塊以童子小便二升煎一半溫服即止經圖

鬼瘧寒熱樹上自乾桃子二七枚爲末滴水丸梧子大硃砂爲衣每服一丸侵晨面東井華水下聖濟

五種瘧疾用桃奴十四枚巴豆七粒黑豆一兩研勻以冷水和勻丸如梧子大硃砂爲衣發日五更念藥王菩薩七遍井華水下

一丸立瘥不過三次妙不可言養生