


雁
治
理
辨



始出圖

順 逆 險



初出血點
淡紅潤色
形如蠶種
紫黑乾枯
圓暈成形
乾紅少潤

圓混圖

順 逆 險



氣溢血附
飽滿光潔
氣失血散
枯澀不榮
頂陷不滿
光潔有神

一二日初出之象如粟千口鼻腮耳年壽之間先發三兩點淡紅潤色者順之兆也順者不治自愈為氣得其正血得其行其毒不得妄行肆其虐也○于天庭司空太陽印堂方廣之處先發者逆之兆也逆者不治為氣溢血滯致毒妄發陽位無以當其勢○雖稠而紅潤澤成箇者險也險者毒雖犯工其氣血未離憂虞之象未可加治俟其氣血交會之後以保元陽加桂之謹防氣洩血散將無速也○若陰始交陽之降陽交陰會之初憂虞之象未可加治恐其藥性紊亂氣血交會之機若氣始定位血初歸附吉凶得失由此生焉苟失其正則宜治矣不然恐其氣血虧弱毒必內攻業是者當加調變氣尊血附乾坤道濟足以見陰陽治化收其金功矣

二三日根窠員混氣之冲滿也氣之冲滿血必歸附為順順者不治自愈為氣血得其道也○根窠無暈氣離血散為逆逆者氣血交會不足致毒乘機而犯內也○根窠雖員而頂陷者血亦難聚為險險者為氣弱不能領袖其血也以保元湯加芩桂豈有不痊者哉

形色圖

順



氣滿血榮
鮮明光澤

逆



綿密加泡
黑紫乾紅

險



根窠雖起
色慘不明

四五日觀痘勢之形色則知氣血之壯弱受毒之淺深此治法之大要也其形尖員光澤大小不一等氣和血就順也順者自愈為氣歸血附各得其道而毒自釋○其形綿密如蚕種黑陷乾紅紫泡者逆也逆而不治為氣血相離縱毒內攻也○其形根窠雖起色不光潔生意猶在險也險而治為氣弱血盛勢雖挾毒犯上然得交會分明用保元湯加芍藥桂米助衛制榮斯為調攝之妙

起發圖

順



氣會血附
紅活鮮明

逆



氣背血離
乾枯綿密

險



氣弱血榮
色昏紅紫

五六日氣盛血榮于內則發揚于外為順順者自愈為氣血豐厚毒受制也○氣雖旺而血不歸附其色灰陷或紫陷或發為水泡痒塌為逆逆者不治為氣弱血衰致毒下陷而外剝也○氣雖旺血不歸附不厚其色光白不榮為險險者易治為氣盈血弱不及歸附用保元湯加木香歸芎助血歸附氣位以全中和之道也

漿行圖

順 逆 險



氣化漿行
光潔飽滿
漿毒不行
神去色枯
氣血少足
光潤有神

五六日氣盈血附其毒自化化則成漿順也順者不治自愈為氣血得中其毒自解也○氣陷血衰其毒內伏伏則不成漿逆也逆者不治為氣血相離不能制毒而外剝也○氣交不旺血雖歸附不能成漿險也險者須急治之為氣血少寒不能振作急投保元湯加桂米助其成漿而收濟惠之功也

漿足圖

順 逆 險



氣足血微
神全光潤
氣陷不滿
色枯乾紫
氣弱血附
光潤不枯

七八日氣旺血附其毒化漿順也順則不煩治而自愈為氣旺拘血化毒之故也○氣血乖離其毒不化漿逆也逆則難治為氣血不及不能振作以制其毒以發癰發疔者可生外剝內傷者必死○其氣血少緩毒雖化而漿不滿險也險則可治為氣血有礙不能大振以保元湯加桂米發揚助漿斯可以保全矣

漿老圖

順



氣壯血化
毒始去身

逆



氣陷不滿
毒成外剝

險



氣平少冲
紅黃色潤

八九日漿足氣血之功成矣氣血功成生命定矣如無他症順而也己○漿不足者氣血盡矣氣血盡而大命臨之逆也○漿不冲滿血附線血氣弱而險也○以保元湯加姜朮以助其氣而駕其血斯漿成也



血盡圖

順



氣平血收
光色始斂

逆



氣弱血凝
枯朽剝極

險



氣少冲滿
血亦有力

十一二日血盡毒解氣調漿足此生生自然之理也為順○或血淡而漿薄或血凝而漿滯以見氣虧而毒不解為逆○血盡漿足濕潤不斂者內虛也為險以保元湯加苓朮助其收斂而結痂也

南京中醫藥大學圖書館

還元圖

結痂圖

順 逆 險

順 逆 險



氣血無恙
痂落癰明
氣血兩虧
天年盡矣
氣血功收
神化少全

氣血歸本
神化功全
氣血不全
功虧一簣
氣血効功
神化太過

十四五六日氣血功成痂落而無他症順之徵也○
痂未易落寒戰咬牙讖語狂煩疔腫作者無可生路
路逆之兆也○痂落潮熱唇紅口渴不食者險之勢
也以四君子加陳皮山查黃連渴甚加參苓白朮散
不解以大連翹飲去黃苓病去之後多有內損或餘
毒未解此則尤難治也

十三四日氣血歸本毒既殄滅漿老結痂順也○毒
未脫形諸邪並作雖云結痂此其逆也○毒雖盡解
漿老結痂之際或有雜症相仍以保元湯隨症加減
不可峻用寒涼大熱之劑恐致內損之患也



氣血獨勝受傷圖

痘之初發陰陽交會不得其一則諸惡症生矣蓋氣血不能勝毒甚至滅亡得此生者百有一焉予嘗聞其症之惡症七日前後為陷為泡為癰為疔為瘡塌為倒陷如此者有因毒勝而不治有因毒勝而自痊難予知識療理惟其陽毒內潰萌蘗於表裏受傷之初又非血氣能勝其所勝而救其危也故另立法圖式開陳于後尚冀治是者當加意審

頂陷圖

陽虛陰實
之象故性
好下陷也

七日前後五陷者氣不足也氣不足不能收血而毒不能成漿蓋氣不勝毒故也七日前後見此宜治以保元湯加芳桂糯米溫胃助氣又以水楊湯沃洗之血不榮加歸至十一三日方漿足者亦有之如血氣光澤有起勢者亦不可過于治也深恐滿而過盛反危百骸或血如死灰漿不滿足其血雖附不榮而兼內症者不可保矣

倒陷圖

內外俱虛
之象氣血
勢離故滿
而復陷也

七日前後倒陷者氣血衰也七日後根窠發足漿行之次因濕氣陷毒即隨氣血而反陷也如血不走歸附鮮明護衛之力猶在治必有可拯之理其血不顧亦必挾毒攻內禍復起於蕭牆豈可救乎急以保元湯加參朮肉豆寇渴以參苓白朮散又有峻用發泄毒劑致傷元氣而氣血隨毒氣反陷伏者有之用予保元湯豈有是哉

陽毒圖



外實內虛
陽之象也
故性外旺

七日前陽毒者凡瘡也或瘡未痊及初結癰處肉分必虛毒受氣血相擊周流百脉必趨虛處而出也蓋陽瘡陰毒癰雜一黨反勝諸毒而名之也其毒濕潤者為氣血俱盛而諸毒易成漿也其毒枯燥乾紅氣血俱弱毒與諸瘡相抗而俱不成漿也治法同彼癰陷如枯轉潤紅變白其漿自溢于此可見治者之功効也

癰毒圖

足

委中

足三陰交會之處



七日後發癰者陽毒也疽之毒併聚一處而假其名也蓋氣血不能拘收乘載其毒使氣弱血盛陽分空虛血則載毒傳注四肢合處合者海也曲池委中是也毒不成漿七日前後發者宜縱之發其毒併從此而出也若治其毒必隨疽而散內攻藏府必無可生之理如疽毒已解血氣豐盛宜解散其餘毒以保元湯加解毒湯為妙

疔毒圖



中實外虛
陰之象也
故性犯內

九日後發疔疔釘也毒泰陽位聚而自成窠穴也蓋氣位弱而血分不密其毒性不能自散放聚結而成其形如氣固血盛則毒受制歸附豈有是耶結於四肢或小或大不近藏府雖抵穿筋骨者易治結於頭面腹背逼于內者其勢必攻穿藏府難治如不穿者急治治不可加峻以保元湯加牛旁子當歸荆芥助氣逐毒待毒液滿自釋也

內潰圖



腹形凶象也

七日前內潰者胃爛也蓋因風寒所中腠理固密陰陽二分壅塞不通其毒內攻氣既不能拘血血又不能載毒藏府之間毒火炮熾則潰而成膿口舌皆白是其驗也如此尅害生靈何其慘毒識者知痘毒未出之時或有風寒阻塞氣粗熱盛身必戰動腹肚急疼謹此患以和解湯升麻湯逐散寒邪開泄腠理縱毒而出豈有是症者哉

痘治附方

生地黄汁一

生油劑二

三豆飲子三

葛根汁四

葛根散五

樺皮湯六

必勝散七

涼驚丸八

枯薑散九

升麻湯十

惺惺散十一

荊芥散十二

羌活散十三

奪命散十四

牛蒡散十五

葛根橘皮湯十六

薄荷散十七

獨勝散十八

抱龍丸十九

紫草膏

紅綿散二十

五積散二十一

麻黃湯二十二

紫草飲子二十三

髮灰飲二十四

牛蒡甘草飲二十五

兔肉醬二十六

安班散二十七

蘿蔔湯二十八

紅子湯二十九

快班散三十

甘草散三十一

紫草如聖散三十二

化毒湯三十三

調中散三十四

紫草木通湯三十五

如聖湯三十六

蟬退甘草湯三十七

紫草枳殼湯三十八



當歸散 三十九

快毒丹 四十

胡荽酒 四十一

葡萄酒 四十二

辟惡氣 四十三

燒乳香 四十四

黃土散 四十五

芒硝猪膽汁 四十六

黑牛糞 四十七

黃蘗膏 四十八

白芥子散 四十九

爛肉汁 五十

蟬蛻散 五十一

猴黎酒 五十二

麻黃紫草湯 五十三

水解散 五十四

玄參升麻湯 五十五

麻黃黃芩湯 五十六

升麻黃芩湯 五十七

葛根散 五十八

四順散 五十九

利毒丸 六十

紫霜丸 六十一

消毒散 六十一

化班散 六十三

地黃雄黃飲 六十四

犀角散 六十五

紫河車散 六十六

玳瑁湯 六十七

白虎湯 六十八

人參竹葉湯 六十九

三物散 七十

青黛散 七十一

野通散 七十二

無比散 七十三

黑豆湯 七十四

透肌散 七十五

黃連散 七十六

通關散 七十七

紫雪 七十八

竹葉湯 七十九

導赤散 八十

救生散 八十一

犀角湯 八十二

牛黃散 八十三

玉露散 八十四

犀角飲子 八十五

犀角地黃湯 八十六

猪尾膏 八十七

控心散 八十八

獨味麻湯 八十九

南金散 九十

滑石散 九十一

橄欖核水 九十二

快毒丹 九十三

紅粉丹 九十四

乳香猪血膏 九十五

紫金散 九十六

釣藤紫草散 九十七

射香猪血丸 九十八

木星飲子 九十九

四聖散 一百

脫殼散 一百一

山梔子湯 一百二

化毒散 一百三

宣毒膏 一百四

百祥丸 一百五

牛李膏 一百六

倍金散 一百七

抵聖丸 一百八

濕生蟲散 一百九

白花蛇散 一百十

敗毒牛黃丹 一百十一

大黃丸 一百十二

川黃散 一百十三

大承氣湯 一百十四

益黃散 一百十五

參朮丸 一百十六

二和散 一百十七

六神散 一百十八

治中湯 一百十九

胃風湯 一百二十

乾姜甘草湯 一百二十一

胃愛散 一百二十二

勻氣湯 一百二十三

豆乳散 一百二十四

姜附湯 一百二十五

七珍散 一百二十六

薤白湯 一百二十七

活血散 一百二十八

人齒散 一百二十九

內補散 一百三十

赤茯苓湯 一百三十一

小柴胡湯 一百三十二

大青四物湯 一百三十三

砂糖水 一百三十四

藍根散 一百三十五

甘露飲 一百三十六

槐花散 一百三十七

淨心散 一百三十八

青金丹 一百三十九

黃芩散 一百四十

燈心湯 一百四十一

黃耆散 一百四十二

硃砂膏 一百四十三

宣風散 一百四十四

甘桔湯 一百四十五

定命硃砂散 一百四十六

鼠粘子 一百四十七

班瘡入眼 一百四十八

乾葛雞頭湯 一百四十九

人參青膈散 一百五十

六味人參麥門冬散 一百五十一

七味人參白朮散 一百五十二

敗草散 一百五十三



痘治附方

新安祁門朴里汪機省之編輯

附方總一百五十三道皆前諸論中之所載也以魏君所定十六方觀之則一百五十三方似皆無所用矣今猶附之篇末意欲輯為全書有論無方非所以廣見聞也且臨症施治亦有便於檢閱免致為其所惑焉
一初生服生地黃汁仲景云孩兒初生下時用生地黃汁點在兒口中即下黑糞終身不害痘疹

二冬溫服生油劑小兒臍府伏於熱毒未成瘡疹四肢微覺有熱食物似減頭髮乾立或時額多微熱用生油一小盞以溫水一小盞旋傾入油盞內以杖子打攪水盡更打令勻如蜜即止夜卧時百日一晷至三歲每服二蜺殼五歲至七歲三蜺殼八歲至十五歲服半合大人一合至二合量大小增減服後良久令卧少時服三五服大小便利四肢熱退瘡痘不生也但瘡痘已出不可服惟服和平藥解其大熱慮熱毒太盛也

三冬溫服三豆飲子凡有時行瘟毒天行瘡痘者宜預服之

黑豆

豕豆

赤小豆各半

甘草一兩

用水九升煮豆熟為度逐日空心任意飲之七日後瘡必發快冬月溫暖小兒必發瘡痘宜預服之

四苗根汁治時行瘟毒症瘡正發預煎汁入酒飲之則不患瘡痘累用甚應本草云苗味苦治一切血病痔瘻癰瘡排膿

五葛根散治天行熱氣欲發痘瘡壯熱作疼宜此解肌出汗

葛根

麻黃各一兩

石膏二兩

黃芩

芍藥

桂枝

甘草各半兩

右為粗末每服四錢水一盞煎至半盞溫服取少汗若先自汗者去麻黃六樺皮湯治傷寒時氣豌豆瘡毒

樺皮剉水煎溫服取汗

樺皮味苦平無毒治肌熱黃疸時熱毒瘡癰腫及

乳癰初作腫硬

七必勝散治瘡泡出未能勻遍此藥透肌解毒或未及利而瘡毒已先發宜此服之牛蒡子不限多少炒熟杵細末每服一錢入荊芥二穗水一盞同煎至七分溫服如瘡疹已出服尤妙本草牛蒡子通十二經則瘡疹出齊無

阻矣又云癰未破服一枚能出癰頭故出而未透勻者宜之

八涼驚丸治瘡疹五藏皆見木勝土木歸心預防發癰

龍膽草 防風

青黛

各二錢 鈎藤二錢

牛黃

麝香各一

黃連五分

龍腦二錢

右同研末麪糊丸如粟米大每服三五丸至一二十丸煎金銀湯送下溫服
九枯萋散治癰生於心心生熱熱生風風屬肝二藏相搏風火相爭故發搐也
用此瀉心肝補其母

括萋根

白甘遂

各二錢

右同慢火炒焦黃研勻每服一字煎射香薄荷湯調

下無時

十升麻湯治大人小兒時氣瘟疫頭痛足冷脉數發熱肢體煩疼及瘡疹疑貳
之閒或未經解利而瘡毒已發又云瘡疹大便如常者並宜服之 升麻若

寒無毒主解百毒瘡痘亦毒也

葛根性平治消渴大熱解肌發表開腠理

治頭痛大抵瘡疹是蘊熱毒葛根解熱升麻去毒且二藥皆治伏熱動心恍

惚驚悸煩躁

芍藥治時行寒熱又活血痺使瘡疹易出又利小便瘡疹有

大熱者利小便也用甘草調和之且瘡疹渴燥甚者亦用炙甘草四者為治

瘡疹之要藥也是瘡疹服之則毒減而愈矣若傷風傷寒傷食驚搐兼患痘疹而稟氣怯者皆發虛熱而非實熱若服之反以為害但有壯熱面青目白睛不黃赤大便秘小便清者皆不可服裏無蘊熱故也此治瘡疹發前瘡愈之後服之消毒非正出時服升麻 葛根 芍藥 甘草 等分 為粗末每服二錢水一錢煎至半錢去滓溫服無時亦可為細末湯調服身心煩熱則溫服寒多則熱服

一惺惺散大抵渾身壯熱必由風熱瘡疹傷寒時氣且先與此也其頭痛目赤鼻流清涕者用細辛喘粗者用桔梗人參多睡者用茯苓恐傷寒時氣胃氣弱者用白朮風熱瘡疹用桔萸根桔萸根若寒治身熱煩滿大熱除腸中痼熱燥渴熱而胸痺不下乳皆攻其熱也故非裏寒者可用裏寒者身雖大熱不渴大便反利小便不赤面青目白睛不黃赤其中雖有白朮之溫終非虛熱者所宜人之藏府寒則寒藥先効熱藥未必能制之熱則熱藥先効寒熱亦莫能制之此勢之自然也用藥豈得不辨表裏冷熱小兒傷風壯熱當先服此大効如壯熱未退切不可與通利大便及涼藥恐是瘡疹反有誤矣若桔梗

