

亥 寅 卯 辰 巳 午 未 申 酉 戌 亥
亥 寅 卯 辰 巳 午 未 申 酉 戌 亥

剝 泰 鸞 氤 氲 坎 離
則 赤 為 陰 陽 陰

沈朗仲病機彙論卷之十七

吳郡馬 倅元儀校定

眩暈門

脉法

難經曰一呼三至一吸三至為適得病前大後小即頭痛目眩

丹溪曰左手脉數熱多脉濇有死血右手脉實

瘦積脉大是久病

眩屬肝虛所致

內經曰。徇蒙招尤。目冥耳聾。下實上虛。過在足少陽。厥陰甚。則入肝。許學士曰。上虛者。肝虛也。故肝虛則頭暈。徇蒙者。如以物蒙其首。招搖不定。目冥耳聾。皆暈之狀也。

眩暈多因火動

趙以德曰。順靜清謐者。水之化。動撓擾亂者。火之用也。腦者。地氣之所生。故藏于陰。目之瞳子。亦腎水至陰之所主。所以二者皆喜靜謐而惡動擾。靜則清明。內持。動則掉擾散亂。是故腦轉目眩者。皆由火也。

經曰成敗倚伏皆生于動動之清靜則生化治動之躁亂則苛疾起自此言之掉眩由人氣所動者豈止一端而已人厥陽之火有五謂之五邪或腎水不足不能制其五陽之火或中土虛衰不能隄防下氣之逆則龍雷之火得以震動于巔而諸火亦上至于頭重則搏擊為痛輕則旋轉為眩運矣

眩暈因風火相搏

原病式曰諸風掉眩皆屬肝木風主動故也所謂風氣甚而頭目眩暈者由風木旺必是金衰不能制木

木復生火。風火皆屬陽。陽主乎動。而動相搏。則為之旋轉。故火本動也。焰得風。則自然旋轉也。

眩暈分內外所因

嚴用和云。眩暈之證。經雖云皆屬於肝。風上攻所致。然體虛之人。外感六淫。內傷七情。皆能眩暈。當以脉證別之。風則脉浮。有汗。項強不仁。寒則脉緊。無汗。筋攣掣痛。暑則脉虛。煩悶。濕則脉細。沉重。吐逆。及其七情所感。遂使藏氣不平。鬱而生涎。結而為飲。隨氣上逆。令人眩暈。眉稜骨痛。眼不可開。寸脉多沉。此為異。

耳若疲勞過度。下虛上實。金瘡吐血。便利及婦人崩傷。產後去血過多。皆令人眩暈。當隨其所因而治之。

瘦飲頭眩治例

金匱云。卒嘔吐。心下痞。膈間有水。眩悸者。半夏加茯苓湯主之。假令瘦人。臍下有悸。吐涎沫而頭眩。此水也。五苓散主之。又云。心下有支飲。其人苦冒眩。澤瀉

白朮湯主之。

張子和曰。頭風眩暈。手足時復麻痺。胃脘發痛。心腹滿悶。按之如水聲。可用獨聖散吐之。吐訖可服辛涼

清上之藥仲景曰此寒痰結于胸中之致然也
丹溪曰眩暈之證屬痰者多火炎而動其痰者二陳
湯加黃芩黃連蒼朮羌活雖挾虛者治痰為主兼補
虛藥如東垣半夏白朮天麻之類

暈因火動治動有法

王肯堂曰夫火因動而起但各從其所動之因而治
之因實熱而動者治其熱因邪搏擊而動者治其邪
因厥逆逼上者下治所厥之邪因陰虛而起者補其
陰抑其陽按而收之因陽虛而氣浮上者則補其陽

欽其浮游之氣。因五志而動者。各安其藏氣以平之。
因鬱而發者。治其所鬱之邪。開之發之。因補血不足
者。補之不已。則求其屬以衰之。因勝克而動者。從盛
衰之氣而補瀉之。中氣虛衰而動者。補其土以安之。
上焦清明之氣虛。不能主持而動者。亦當補中焦之
穀氣。推而揚之。因五藏六府上注之精氣不足而動
者。察其何者之虛而補之。如是雖不專治其火而火
自息矣。凡治百病之由火而生者。皆然。非惟掉眩而

補下之法

戴復菴曰眩暈之甚擡頭則屋轉眼黑或常見有物飛動或見物為兩宜小三五七散或生料正元散加鹿茸一錢下靈砂丹若不效則獨用鹿茸一味每服半兩用無灰酒三盞煎至一盞去滓入麝香少許服綠鹿茸生于頭頭暈而治以鹿茸蓋以類相從也

論腎虛頭暈誤治之失

薛立齋曰顧上舍因會飲問舍余曰向孟陳二友俱為無嗣納寵已而得疾皆頭暈吐痰惟孟得生何也余

曰二證因腎虛不能納氣而為頭暈土虛不能制水而生痰涎陳專主攻痰行氣益專于益火補氣故耳後上舍房勞過度亦患前症或用清火化痰愈甚顧曰我病是腎虛不能納氣歸元治者不悟而歿惜哉

論眩暈不宜香竈丹藥

本事方云虛風頭旋吐痰涎不已以養正丹鎮墜之或用沉香磁石凡嚴氏云世所謂氣不歸元而用丹藥鎮墜沉香降氣之法夫香竈散氣丹藥助火其不歸之氣豈能因此而復耶內經云治病必求其本氣之

有歸求其本而用藥則善矣

一 論治暈眩補虛補實諸法

劉宗厚曰眩暈一證人皆稱為上盛下虛所致而不
明言其所以然之故蓋所謂虛者血與氣也所謂實
者痰涎風火也原病之由有氣虛者乃清氣不能上
升或汗多亡陽而致當升陽補氣有血虛者乃因亡
血過多陽無所附而然當益陰補血此皆不足之證
也有因痰涎鬱遏者宜開痰導鬱重則吐之有因風
火所動者宜清上降火若因外感而得者嚴氏雖分

四氣之異皆當散邪為主此皆有餘之證也

愚按眩暈之候當分虛實二證內經曰諸風掉眩皆屬肝木河間曰暈眩者由風木旺而木復生火風火皆屬陽陽主乎動而動相搏則為旋轉丹溪曰痰在上火在下火炎上而動其痰也此眩暈之屬實者也內經曰上氣不足頭為之苦傾目為之眩曰上虛則眩曰髓海不足則腦轉耳鳴而眩冒此眩暈之屬虛者也至于治法風則分其扶寒扶火而解之火則辨其或微或甚而清之痰則審其

屬寒屬熱而消之。若所謂上虛者，陽中之陽虛也。凡
飢飽勞倦，大吐大下，汗多亡陽者，多有之。此宜補脾
肺之氣。所謂髓海不足者，陰中之陰虛也。凡房室過
度，婦人產後，金瘡失血過多者，多有之。此宜補肝腎
之陰。又有大醉之後，濕熱上蒸而暈者，傷其陰也。有
大怒之後，木肆其強而暈者，傷其氣也。有痰飲留中，
治節不行而暈者，脾之弱也。此又有餘中之不足也。
當各因其證治而求之。

眩暈門諸方

散邪之劑

本事川芎散

治風眩頭暈

萸肉

山藥

甘菊花

茯苓

人參

小川芎

石為末每服二錢酒調下

消風散

治同前

荆芥

白芷

陳皮

麻黃

蒼朮

甘草等分

生薑二片葱白三莖煎服

不換金正氣散

治感寒頭暈

藿香二不

厚朴香

蒼朮香

陳皮不香

半夏不香

甘草

水二鍾姜五片棗二枚煎服

加川芎白芷妙

嚴氏三五七散

治陽虛風寒入腦頭痛目眩耳鳴

天雄炮去皮

細辛各三兩

乾姜炮

萸肉五兩

防風七兩

山藥炒七兩

右為末每服二錢溫酒調下

芎朮湯 治冒雨中濕眩暈嘔逆頭重不食

川芎可

半夏可

白朮可

炙甘草桑

石咬咀 每服四錢煎加姜七片

攻裡之劑

丹溪方

治眩運不可當者

大黃

三次酒炒乾為末

石 每服一錢至二錢茶調下

表裏之劑

子和芎黃湯

治上焦風熱頭目眩運