

醫統正脈全書

二七



注解傷寒論卷四

江陰朱氏校刊本

漢張仲景述 王叔和撰次 成無已注解

辨太陽病脉證并治法下第七

問曰病有結胃有藏結其狀何如答曰按之痛寸脉浮  
關脉沉名曰結胃也何謂藏結答曰如結胃狀飲食如  
故時時下利寸脉浮關脉小細沉緊名曰藏結舌上白  
胎滑者難治結胃者邪結在胃藏結者邪結在藏二者皆下後邪氣乘虛入裏所致下後邪氣入裏與陽相結者為藏結以陰受之則入五藏故爾氣宜通而塞故痛邪結陽分則陰氣不得上通邪結陰分則陽氣不得下通是二者皆心下鞭痛寸脉浮關脉沉知邪結在陽

也寸脉浮關脉小細沉緊知邪結在陰也陰結而陽不  
結雖心下結痛飲食亦自如故陰氣乘腸虛而下故時  
時自下利陰得陽則解藏結得熱證多則易治  
舌上白胎滑者邪氣結胃中亦寒故云難治 藏結無

陽證不往來寒熱其人反靜舌上胎滑者不可攻也

結藏

於法當下無陽證為表無熱不往來寒熱為半表半裏  
無熱其人反靜為裏無熱經曰舌上如胎者以丹田有  
熱胃中有寒邪氣以病發於陽而反下之熱入因作結  
表裏皆寒故不可攻

胃病發於陰而反下之因作痞所以成結胃者以下之

太早故也

發熱惡寒者發於陽也而反下之則表中陽邪入裏結於胃中為結胃無熱惡寒者發於

陰也而反下之則表中陰邪入裏結於心下為痞 結胃者項亦強如柔痙狀下

之則和宜大陷胃丸方

結胃病項強者為邪結胃中胃膈結滿心下緊實但能仰而不



能俛是項強亦如柔痊之狀也與大陷胸丸下結泄滿

# 大陷胃丸方

大黃

半斤味苦寒

葶藶

半升熬味苦寒

芒硝

半升味鹹寒

杏仁

半升去皮尖熬黑味苦甘溫

大黃芒硝之苦鹹所以下熱葶藶杏仁之苦甘所以泄滿甘遂取其直達之蜜取其潤利皆以下泄滿實也

右肆味搗篩貳味內杏仁芒硝合研如脂和散取如彈丸壹枚別搗甘遂末壹錢七白蜜貳合水貳升煮取壹升溫頓服之壹宿乃下如不下更服取下爲効

禁如藥法

結胃證其脉浮大者不可下下之則死

結胃爲邪結胃中屬上焦之分

得寸脉浮關脉沉者爲在裏則可下若脉浮大心下雖

結是在表者猶多未全結也下之重虛邪氣復結則難

可制故云結胃證悉具煩躁者亦死

結胃證悉具邪結已深也煩躁者正

氣散亂也邪氣勝正病者必死

太陽病脉浮而動數浮則爲風數則爲

熱動則爲痛數則爲虛頭痛發熱微盜汗出而反惡寒

者表未解也醫反下之動數變遲膈內拒痛胃中空虛

客氣動膈短氣躁煩心中懊懣陽氣內陷心下因鞭則

爲結胃大陷胃湯主之若不結胃但頭汗出餘處無汗

劑頸而還小便不利身必發黃也

動數皆陽脉也當責邪在表睡而汗出者

謂之盜汗為邪氣在半表半裏則不惡寒此頭痛發熱微盜汗出反惡寒者表未解也當發其汗醫反下之虛其胃氣表邪乘虛則陷邪在表則見陽脉邪在裏則見陰脉邪氣內陷動數之脉所以變遲而浮脉獨不變者以邪結胃中上焦陽結脉不得而沈也客氣者外邪乘胃中空虛入裏結於胃膈膈中拒痛者客氣動膈也金匱要略曰短氣不足以息者實也短氣躁煩心中懊憹皆邪熱為實陽氣內陷氣不得通於膈壅於心下為嘔滿而痛成結胃也與大陷胃湯以下結熱若胃中空虛陽氣內陷不結於胃膈下入於胃中者遍身汗出則為熱越不能發黃若但頭汗出身無汗劑頸而還小便不利者熱不得越必發黃也

大陷胃湯方

大黃

六兩去芒硝一升

甘遂

一錢七

大黃謂之將軍以苦蕩滌芒硝一名硝石以其鹹能  
熨鞭夫間有甘遂以通水也甘遂若夫間之遂其氣  
可以直達透結胃  
胃陷三物爲允

右叁味以水陸升先煮大黃取貳升去滓內芒硝煮

壹兩沸內甘遂末溫服一升得快利止後服

傷寒六七日結胃熱實脉沉而緊心下痛按之石鞭者

大陷胃湯主之

病在表而下之熱入因作結胃此不云  
下後而云傷寒六七日則是傳裏之實

熱也沉爲在裏緊爲裏實以心下痛按之  
實鞭是以爲結胃與大陷胸湯以下結熱傷寒十餘日

熱結在裏復往來寒熱者與大柴胡湯但結胃無大熱  
者此爲水結在胃脇也但頭微汗出者大陷胃湯主之

傷寒十餘日熱結在裏是可下之證復往來寒熱爲正邪分爭未全斂結與大柴胡湯下之但結胃無大熱者非熱結也是水飲結於胃脇謂之水結胃周身汗出者是水飲外散則愈若但頭微汗出餘處無汗是水飲不得外泄停畜而不行也太陽病重發汗而復下之不大與大陷胃湯以逐其水

便五六日舌上燥而渴日晡時小有潮熱從心下至少

腹鞭滿而痛不可近者大陷胃湯主之

重發汗而復下之則內外重亡

津液而邪熱內結致不大便五六日舌上燥而渴也日晡潮熱者屬胃此日晡小有潮熱非但在胃從心下至少腹鞭滿而痛不可近者是一腹之中上下邪氣俱甚也與大陷胃湯以下其邪

小結胃病正

在心下按之則痛脉浮滑者小陷胃湯主之

心下鞭痛手不可近

者結胃也正在心下按之則痛是熱氣猶淺謂之小結胃結胃脉沉緊或寸浮關沈今脉浮滑知熱未深結與

小陷胃湯以除  
胃膈上結熱也

# 小陷胃湯方

黃連

一兩  
苦寒

半夏

半升  
洗  
辛溫

栝蒌實

大者一箇  
苦寒

苦以泄之辛以散之黃連栝蒌實  
之苦寒以泄熱半夏之辛以散結

右叁味以水陸升先煮栝蒌取叁升去滓內諸藥煮

取貳升去滓分溫叁服

太陽病二三日不能卧但欲起心下必結脉微弱者此

本有寒分也反下之若利止必作結胃未止者四日復

下之此作協熱利也

太陽病二三日邪在表也不能卧  
但欲起心下必結者以心下結滿

卧則氣壅而愈甚故不能卧而但欲起也心下結滿有  
水分有寒分有氣分今脉微弱知本有寒分醫見心下  
結而反下之則太陽表邪乘虛入裏利止則邪氣留結  
為結胃利不止至次日復如前下利不止者是邪熱下  
攻腸胃為太陰病下之其脉促不結胃者此為欲解也  
挾熱利也

脉浮者必結胃也脉緊者必咽痛脉弦者必兩脇拘急

脉細數者頭痛未止脉沉緊者必欲嘔脉沉滑者協熱

利脉浮滑者必下血

此太陽病下之後邪氣傳變其脉促者為陽盛下後脉促為陽勝陰

也故不作結胃為欲解下後脉浮為上焦陽邪結而為結胃也經曰結胃者寸脉浮關脉沉下後脉緊則太陽之邪傳於少陰經曰脉緊者屬少陰內經曰邪客於少陰之絡令人嗌痛不可內食所以脉緊者必咽痛脉弦則太陽之邪傳於少陽經曰尺寸俱弦者少陽受病也其脉循脇絡於耳所以脉弦者必兩脇拘急下後邪氣



傳裏則頭痛當止脉細數爲邪未傳裏而傷氣也細爲氣少數爲在表故頭痛未止脉沉緊則大陽之邪傳於陽明爲裏實也沈爲在裏緊爲裏實陽明裏實故必欲嘔脉滑則太陽之邪傳於腸胃以滑爲陰氣有餘知邪氣入裏干於下焦也沈爲血勝氣虛是爲協熱利浮爲氣勝血虛是知必下血經曰不宜下而便攻之諸變不可勝數此病在陽應以汗解之反以冷水瀝之若灌之其熱被劫不得去彌更益煩肉上粟起意欲飲水反不渴者服文蛤散若不差者與五苓散寒實結胃無熱證者與三物小陷胷湯白散亦可服

病在陽爲邪在表也法當汗出而解反以冷水瀝之灌洗熱被寒水外不得出則反攻其裏彌更益煩肉上粟起者水寒之氣客於皮膚也意欲飲水者裏有熱也反不渴者寒在表也與文蛤散以散表中水寒之氣若不差是水熱相搏欲傳於裏與五苓散發汗



以和之始熱在表因水寒制之不得外泄內攻於裏結  
於胃膈心下鞭痛本以水寒伏熱為實故謂之寒實結  
胃無熱證者外無熱而熱悉收歛於裏也與  
小陷胃湯以下逐之白散下熱故亦可攻

# 文蛤散方

文蛤

五兩味鹹寒

鹹走腎則可以勝水氣

右壹味為散以沸湯和壹服湯用五合

# 白散方

桔梗

三分味辛苦微溫

巴豆

一分去皮心熬黑研如脂辛溫

貝母

三分味辛苦平

辛散而苦泄桔梗貝母之辛苦  
用以下氣巴豆之辛用以散實

右件叁味爲散內巴豆更於臼中杵之以白飲和服  
強人半錢匕羸者減之病在膈上必吐在膈下必利  
不利進熱粥壹杯利過不止進冷粥壹杯身熱皮粟  
不解欲引衣自覆者若水以撲之洗之益令熱劫不  
得出當汗而不汗則煩假令汗出已腹中痛與芍藥  
叁兩如上法

太陽與少陽併病頭項強痛或眩冒時如結胷心下痞  
鞭者當刺大椎第一間肺俞肝俞慎不可發汗發汗則  
譫語脉弦五六日譫語不止當刺期門

太陽之脉絡頭  
下項頭項強痛

者太陽表病也少陽之脉循胃絡脇如結胃心下痞鞭  
者少陽裏病也太陽少陽相併爲病不純在表故頭項  
不但強痛而或眩冒亦未全入裏故時如結胃心下痞  
鞭此邪在半表半裏之間也刺大椎第一間肺俞以瀉  
太陽之邪刺肝俞以瀉少陽之邪邪在表則可發汗邪  
在半表半裏則不可發汗發汗則亡津液損動胃氣少  
陽之邪因干於胃上爲木刑必發譫語脉弦至五六日  
傳經盡邪熱去而譫語當止若復不止爲少陽邪熱甚  
也刺期門以婦人中風發熱惡寒經水適來得之七八  
瀉肝膽之氣婦人中風發熱惡寒經水適來得之七八  
日熱除而脉遲身涼胃脇下滿如結胸狀譫語者此爲  
熱入血室也當刺期門隨其實而瀉之  
中風發熱惡寒表病也若經水  
不來表邪傳裏則入府而不入血室也因經水適來血  
室空虛至七八日邪氣傳裏之時更不入府乘虛而入  
於血室熱除脉遲身涼者邪氣內陷而表證罷也胃脇  
下滿如結胸狀譫語者熱入血室而裏實期門者肝之



募肝主血刺期門者瀉血室之熱婦人中風七八日續審看何經氣實更隨其實而瀉之

得寒熱發作有時經水適斷者此為熱入血室其血必

結故使如瘧狀發作有時小柴胡湯主之

中風七八日邪氣傳裏之

時本無寒熱而續得寒熱經水適斷者此為表邪乘血室虛入於血室與血相搏而血結不行經水所以斷也血氣與邪分爭致寒熱如瘧而發作有時與小柴胡湯以解傳經之邪婦人傷寒發熱經

水適來晝日明了暮則譫語如見鬼狀者此為熱入血

室無犯胃氣及上二焦必自愈

傷寒發熱者寒已成熱也經水適來則血室空

虛邪熱乘虛入於血室若晝日譫語為邪客於府與陽爭也此晝日明了暮則譫語如見鬼狀是邪不入府入於血室與陰爭也陽盛譫語則宜下此熱入血室不可與下藥犯其胃氣熱入血室血結寒熱者與小柴胡湯



散邪發汗此雖熱入血室而不留結不可與發汗藥犯其入血室而無滿結不可刺期門犯其中焦必自愈者以經行則熱隨血去血下也已則邪熱悉除而愈矣所為發汗為犯上焦者發汗則動衛氣衛氣出上焦故也刺期門為犯中焦者刺期門則動榮氣榮氣出中焦故也脉經曰無犯胃氣及上二焦傷寒六七日發熱微惡寒焦必自愈豈謂藥不謂針耶

支節煩疼微嘔心下支結外證未去者柴胡桂枝湯主

之傷寒六七日邪當傳裏之時支散也嘔而心下結者裏證也法當攻裏發熱微惡寒支節煩疼為外證未

去不可攻裏與柴胡桂枝湯以和解之傷寒五六日已發汗而復下之曾

脇滿微結小便不利渴而不嘔但頭汗出往來寒熱心

煩者此為未解也柴胡桂枝乾薑湯主之傷寒五六日已發汗下之



後則邪當解今胃脇滿微結小便不利渴而不嘔但頭汗出往來寒熱心煩者即邪氣猶在半表半裏之間為未解也胃脇滿微結寒熱心煩者邪在半表半裏之間也小便不利而渴者汗下後亡津液內燥也若熱消津液令小便不利而渴者其人必嘔今渴而不嘔知非裏熱也傷寒汗出則和今但頭汗出而餘處無汗者津液不足而陽虛於上也與柴胡桂枝乾薑湯以解表裏之邪復津液而助陽也

### 柴胡桂枝乾薑湯方

柴胡

半斤味苦平

桂枝

三兩去皮味辛熱

乾薑

二兩味辛熱

枳實

四兩味苦寒

黃芩

三兩味苦寒

牡蠣

二兩熬味鹹寒

甘草

二兩炙味甘平

內經曰熱淫於內以苦發之柴胡黃芩之苦以解傳裏之邪辛甘發散為陽桂枝甘草之辛甘以散在表

