

乙

證
治
理
會

趙
伯
寅
藏

澄
佑
經
會

伯
寅

證治經會卷之六目錄

產後

血暈 腹痛 惡露不下 惡露不止
發熱 惡寒 冒汗 盜汗 中風 筋攣
癰疽 疔毒 不食 汗出 驚悸 喘促
秋淫 疔毒 不食 汗出 驚悸 喘促
形痛 脇痛 身痛 不語 侵秘
以是 兒 補 語 狂 妄 不 語 侵 秘
瀉 利 脫 痢 陰 腫 乳 汁 不 通 脫 損
陰 冷 陰 瘡 陰 蝕 陰 吹 陰 痿 陰 痺
陰 痿 陰 痿 陰 痿 陰 痿 陰 痿 陰 痿

師尼寡婦獨陰坎陽方論

室女思慮傷心經閉成勞論治 健忘 自汗

心汗 盜汗 惡寒 惡熱 寒熱

小便閉 小便短少 小便過多 小便頻數

小便不禁 遺尿 交腸 關格

大小便不通 秘結 下氣 結核

癰 疔

證治經會卷六

產後

楊新產脈沉小緩消其生堅強急疾滿熱其死黑氣
起及衄其危發喘其不治
機房云胎產之病從厥陰經論母乳胃氣及上中二
焦為之三禁不可汗不可下不可利小便汗之則傷
氣下之則傷脾利小便則亡津液安證蜂起矣能不
犯三禁則藥術自和寒熱自止矣
丹溪云產後者大補氣血為主雖有雜證以末治之
宜用參朮芎歸陳皮炙甘草黃芪以養血輕劑加厥

卷後濟其重則加乾薑蓋此純有陰之氣乃陰虛
生內虛耳乾薑妙黑能於肺分引氣肺入肝分引血
藥生血所以必与補陰藥同用也

薛立齋云產後發熱惡寒或證似中風或病狀或冒
悶出汗或恍惚驚悸等證皆氣血虛極之甚也宜大
劑參芪歸朮肉桂以補養之如不應急用乾附子再
不應用人參一两熟附三錢軟服借陰未應乃藥力
未融及止惟多服自效

產後血暈

按產後眩暈因惡露上行則心下滿急口襟神昏宜
先笑散上聖散仍用薤菜入瓶中用滾醋灌之時用
搐鼻氣血盡極而暈者心下不滿意但昏悶煩亂宜
清魂散加藿歸並以枳甘枳玄血過多而暈者芎歸
湯送勞即暈者補中益氣湯
清魂散 治產後血氣暴損震大妄動血隨火上升

心神昏悶

制考日人參

澤蘭

川芎

各四

每用三錢煎湯和酒調下

產後血暈

三聖散 治惡露上行腹痛血暈

沒药 血竭 五灵脂等分 童便煎調下

近效方 治血暈 以红花 五靈脂等分 童便煎調下

國經治產後血暈昏迷 以五靈脂等分 溫酒調下一錢

一方產後血暈血上冲心昏迷不知人事者

用荊芥穗燈上燒存性每用童便煎調下三錢

又方 用鹿角燒存性為末三錢以上法服

一方 治產後惡血攻心 用真蘇合三錢燒灰存

性為末醋調下立好不必燒灰量亦可

產後腹痛

按產後腹痛按之益甚不惡食不后發或小腹有塊
此是瘀血也宜失笑散或七聖散或清血調經散
服若發寒則腹痛悠悠不止按之則稍緩此屬血
虛宜四物湯加參朮乾薑若腹中飽悶惡食若發腹
痛不可按此屬停食宜保和丸若痛而作嘔此胃氣
虛也乃君子湯痛而作泄此脾氣傷也乃君子湯送
二神丸痛而昏懷口噤冷汗不止手足厥冷陽氣虛
也乃君子湯加附子忽然胸腹痞滿此冷氣乘虛入
客於血分也當歸建中湯或五積散因怒氣腹痛四

物湯加木魚牡蛎因氣滯作痛者歸湯加木魚
青皮

周慎齋云產後小腹脹痛用益母草肉桂延胡索木
魚視痛輕重加減服後不愈或服紅花丹皮等藥
血不行下脹痛甚只宜溫中為主中氣足而血自下
以血得熱即行也用理中湯惡寒加肉桂震弱保元
湯加姜桂腹脹痛加紅花丹皮等藥或作十全大補
湯加炒乾姜昏暈不知人痰盛者歸人參益服血下
即愈按溫中一法不獨飛血為然即震人之傳
澤服消導而不愈者亦以溫中為主

一婦以毒藥去胎後發臍右結一塊痛甚則寒寒塊
與臍高一寸痛不可按肺痿數語曰此瘀血流溢
於腸外育膜之間聚結為塊也遂用補氣血行結
涕排膿之劑三日決一鋒針膿血大出內以蠶狀
丸具甚痛時恐因調氣血生肌則內外之竅自合
不旬日愈

周慎齋治一婦產後腹脹痛服散血去瘀之劑效小
腹脹痛破入大腹用蒼桂吳茱萸華撥散劑愈
衍義治一婦產後月臍腹脹滿痛不可按百效不
或作瘀血收用抵當湯曰此其治也此脾虛寒邪

出子子門以羊肉四兩煮歸以膏條後久五錢
姜一兩煎服

薛立齋治一婦產後惡血上冲心腹痛用大艾等藥
其血推下復患於痛發惡寒次日昏憒目以飛
手堅護其腹面色青白作脾氣震寒而痛用大艾
子湯加姜桂愈

失笑散 治瘀血上攻心腹絞痛及足攣攣痛

蒲黃 五灵脂 等分 醋水煎

七聖散 治產後瘀血停滯腹痛

當歸 川芎 蒲黃 炒桂心 延胡索 芍藥

益母草 益湯調射赤五厘服 一方加參附

赤芍 靈脂 生地 義木 桑木 紅花 桃仁 青皮

四神散 治產後血虛腹痛

川芎 黃芩 芍藥 乾薑 炮

意苳仁散 治腸癰腹中疝痛煩躁不安或脹滿不

食少及滿婦人產後惡露不止有此證縱非癰但於
似間使可服

苳仁 瓜蒌 牡丹 桃仁

作一服水煎不拘時服 按此方藥品平和其
功甚速或發寒或脹滿不食小通滿滯產後多

產後腹痛

有此證或月經欲行或行後作痛俱效

黑神散

治產後惡露不盡血氣攻心腹痛不止或

胞衣不下上攻胸臆及血迷血暈等證

黑荳

何半

熟地

黃歸

洗

肉桂

玄相

乾姜

甘草

白芍

蒲黃

為極細末

每服二錢

童便和

酒調服

一方有附子

一方

治光枕切痛

山查

濃煎入砂糖

煎服

一二次愈

又方

以白鷄冠

煎酒

煎服

惡露不下

此用失笑散氣滯血凝夜莖石散風冷相搏上聖散
加肉桂乾姜

蒲黃散 治產後惡露不快血上檢心煩喘急昏

迷不省人事或狂言語氣喘欲絕

乾荷葉延胡索 牡丹皮 生地 蘇合香

生蒲黃 水煎入蜜少许分作兩服

韋升治產後血不下 以益母草搗汁煎入酒和服

惡露不止

按惡露不絕因肝氣鬱而不能生血用不味地黃丸

惡露不下 惡露不止

不

肝氣震而不能藏血四物加參朮脾氣震而不能攝
血用不君子湯胃氣下隘而不能統血用補中益氣
湯脾經鬱熱而血不歸源加味歸脾湯肝經怒火而
血妄行加味四物湯氣血俱虛十全大補湯肝經風
邪而血沸騰一味防風丸產後血不止人參養榮湯

醫案

薛立齋治一婦產後因怒其血如湧仆地口噤目斜
手足搐搦此肝經血耗風生用一味丸一劑諸證
悉退但食少晡熱用四君子加柴胡丹皮芍藥愈

產後發熱惡寒

薛立齋云產後發熱惡寒皆是氣血虛弱脾胃虧損
不足之證切不可發表降火蓋陰虛則發熱陽虛則
惡寒寸口脈微為陽不足則陰氣上入陽中而惡寒
尺部脈弱為陰不足則陽氣下陷入陰中而發熱陰
不足陽往乘之則陽內陷而發熱宜以味地黃丸陽
不足陰往從之則陰氣上入陽中而惡寒宜補中益
氣湯陰陽不歸其本故寒熱交爭而惡寒發熱更宜
八珍湯十全大補湯玉露飲若發熱惡風感邪痛連
日不退的係風寒束表入安用小柴胡湯加芍藥