

聖
餘
醫
案
詮
解



聖俞醫案註解卷四目錄

痢疾類

一 某病痢紅白相兼每日百餘次腹痛甚

二 某之弟下痢赤白裏急後重臍腹痛甚大腸墜下二月之久口渴

三 某發熱惡寒下痢如清涕略帶赤絲腹痛

四 周某禁口痢二十餘日甚危殆一日三四十次肛門腫痛食不進每日
只能食點茶而已

黃疸濕熱水腫類

五 劉彭氏周身目珠發黃小便及汗均黃色心餒神短少

六 某身目發黃腹痛身重嗜臥心餒

七 某一身面目悉黃腫腹脹作水嚮聲小便不利

八 某四肢腫水氣在皮膚中四肢聶聶動

九 某脚桿腫肚脹面黃色小便多大便燥

十 曾某之姪脚桿腫肚脹胃不利大小便不調

十一 王金氏足腫過膝面皮眼睛亦稍腫飲食不消心悸耳鳴

十二 某大病後周身面目浮腫

十三 趙某之母頭痛項強周身痛發寒熱口渴有汗小便少胃不食昏運

發吐舌黃色

十四 王某之子病興寒冷二十餘日言語錯亂口渴日夜吃茶水數十次
不思食不大便小便少昏運出汗目脹頭痛

十五 某之子發熱眼脹痛舌黃白色口渴不大便胃上一餅不食腰痛

十六 某之父大小便熱肚痛舌苔厚黃白色作寒冷

十七 某心痛作寒熱發吐口渴不食不便腹內嚮

十八 朱某發燒口不渴腰痛周身麻木肚痛舌白

十九 胡某周身發癢時發寒冷四肢生瘡出黃水

女科類

二十 某之室嘔吐不止身有孕

二一 某之室產後三四月陰戶不閉

二二 鍾某之室產後發燒作冷咳嗽胃不利頭痛已十餘日

二三 鍾某之室產後頭項強痛面紅一瞬卽角弓反張

二四 某之媳產後敗血流注經絡結成腫塊疼痛難忍

二五 某之婦產後七八日忽腹脹乳腫不食

二六 張某之室年二十餘臨產十分危三四日產不下

二七 某之室產後三四日精神恍惚語言錯亂

二八 幹某之媳產後昏迷不省人事發寒熱不舉動

二九 黃某婦年三十三歲產後三日牙關緊臥牀不動只一點氣小腸脫

出五六寸長

三十 曾某之室乳腫不通無乳寒熱均作牙齦腫

三一 某之婦精神少小便無度白帶經水不調

三二 某之女月經不調肚腹骨節痛頭昏心內不安

三三 余某室人紅崩十餘日不止每日次數不定大概次數多血亦多

三四 余某之女年十五歲月水不調有半年腹腰四肢常常痛胃不利咳嗽痰昏運神少

三五 易彭氏月經不調心跳昏運胃不利多夢白帶腰與四肢均痛

三六 林谷光之女十四五歲心跳手足燒胃不利有汗口舌時痛月水不調時常想吃冷的

三七 某之女李氏腰肚足桿痛頭昏白帶

三八 某氏腰痛有帶病一身多重



三九 王某之室有孕四五月忽紅崩陰戶內出一條

四十 鮮金氏年二十餘爲鞠育多勞病帶下心燒多煩減形

四一 某之室小腹脹小便難口乾不渴

四二 某婦人始患崩症服熱藥崩止人譁狂繼服清涼開竅藥又病生服

冀口乾半夜發煩月信通人遂清醒今月信未止較初通時稍少人

覺無力大便初結後溏肛門微動

四二 某之室^年平三十餘於歲除前三日經淨今正月初一日復來卽十餘

日不止左脈有力往常經期大約二十六七日一至(誠一)

幼科類

四四 某小兒五六歲發燒咳嗽喉間嗝吼一遇外邪卽發

四五 周某之子每感風寒發燒齁欬鼻塞

四六 某半歲小兒病吐瀉已止今胃不食冷汗不止味涎沫

四七 張某之小兒發熱咳嗽吐瀉

四八 小兒發熱吐乳肚大青筋

四九 某之小兒吐乳哭不止不食乳

五十 周某之子出麻子發熱口渴出一半收一半聲不出大小便均無目閉數日不食病甚重

五一 周某之姪出麻子聲啞口偏不休日夜臥床呻吟

五二 高某之孫初生十五六日鼻塞不食乳口熱

五三 康某小兒生五六日扯風項強角弓反張手握伸口歪吐白沫

五四 小兒午後至半夜發燒燒時頭出汗氣粗右顴紅有時手顫脚桿痛頭痛鼻孔痛打嚏流涕欬喉痛小便黃不能睡初病時舌苔多

(八月)
(誠一)

五五 某小兒嘔吐初頭微燒是晚即周身發燒夜甚於晝手心甚於手背無汗舌苔多已服甘寒清熱及消食藥不應(誠一)

聖餘醫案詮解卷四

崇慶李俊子俊 著

崇慶張國銓白珩

參訂

眉山夏忠道衡門

痢疾類

一 某病痢紅白相兼每日百餘次腹痛甚

銀花

八錢

廣香

一錢

桔梗

二錢

旱連草

三錢

枳殼

二錢

當歸

三錢

生白芍

五錢

砂仁

三錢

生軍

一錢

陳皮

二錢

建曲

二錢

馬鞭稍

引

此滯下也腸胃間寒熱不和火溼鬱蒸津液腐爲糟粕故利白熱聚血傷浸淫而出如瘡之潰故利紅母日百餘次腹痛甚者金木土之鬱皆有餘而氣爭不已也



六元正紀大論曰土鬱奪之金鬱泄之故用建麴生軍廣香砂仁枳壳陳皮等消積導滯以開金土之鬱大腸與肺爲表裏病在下者取之上故用桔梗上開銀花上清上開者提之以舒其壅而下竅自利上清則治節行而二便通一切熱毒均有出路也肝通大腸大腸鬱則肝不平故用白芍以平之以上皆紅白痢之通治法而當歸活血旱蓮草清血熱則偏於治紅痢馬鞭稍之清氣分濕熱則偏於白痢也

砂仁和胃醒脾凡土濕陽鬱而舌有苔口無味者均可用無熱則爲溫劑之輔有熱則爲涼劑之佐蓋人身氣化在中溼爲濁邪必和以芳香之品斯溼濁開而氣化乃復也

二 某之弟下痢赤白裏急後重臍腹痛甚大腸墜下二月之久口渴

洋參 三錢

當歸 五錢

肉豆蔻 二錢 麵裹

廣香 八分

白芍 一兩

白朮 八錢

上桂 一錢

製附片 五錢

粟壳五分

黃連五錢 吳黃水炒

生薑三片

二付

此久痢陽虛也痢久則虛臍腹痛爲木旺土衰而健運不行大腸墜爲木旺土衰而肺氣不攝口渴爲木旺土衰而水火不交至下痢赤白乃腸脂與血液被迫而下非邪盛也裏急後重乃肝氣乘於大腸非過閏也病爲陽虛或陰虛臨症時必有色脈可憑不難一望而知也

木旺平以白芍土衰補以白朮合之附桂補下焦不足之陽黃連寫上焦下降之火木和土運火降水升則腹痛口渴及裏急後重自愈腸墜由於中虛氣弱與下虛腸滑故用洋參與肉蔻粟壳上舉下固互爲其功洋參得生薑則補中有行肉蔻粟壳得廣香則闔中有開甚歸得肉桂則血氣復其故道而不下溢縱觀全方益久痢而陽虛者之治法也

三 某發熱惡寒下痢如清涕略帶赤絲腹痛



桂枝 三錢

生白芍 八錢

生大黃 二錢

廣木香 一錢

乾薑 三錢

黃芩 二錢

當歸 五錢

生甘草 二錢

製附片 五錢

生薑 三錢

吳黃 二錢 黃連水炒

粉葛 五錢

三付

此寒溼痢也四時之氣春生夏長秋收冬藏人身之氣亦如之然天道有常人則秉質難齊奉生不一或有不能合天之常而爲病者痢疾其一也多怒多鬱酒酪厚味之人木火氣浮肺胃陰虛則變在中上而爲欬逆喘滿太陰不收之病大腸爲肺之府同與秋氣相應好食瓜果生冷之人腸胃不和暑濕內蘊則變在中下而爲腹痛裏急陽明過收之病夫秋收者時氣之正本無過不及之差而按之病情則有差者乃就邪正相爭之勢而言之耳

五藏別論曰六府者傳化物而不藏又曰魄門爲五藏使夫大腸庚金其性本



收而職司傳化者蓋聽命於五藏以盡厥職也惟其爲府而性收故能容受糟粕惟其爲使而不爭故能排除濁穢否則賤而自專匪特傳化失職而五藏之氣皆不平矣五藏之氣肝主疎泄肺主收降傳化失職則泄者不泄降者不降其不平也當以肝爲第一而肺次之然濁穢內鬱不久則積不厚外氣不收則鬱不極積不厚鬱不極則邪正之爭不烈此痢疾之所以必發於秋而腹痛裏急也至惡寒發熱則爲內外相爭與痢疾同情而異地緣上焦爲陽皮毛合肺肝肺之令旣不行於大腸則太陰不收而毛竅開則涼氣湊之而上焦陽鬱鬱則外陽虛而內陽盛故惡寒而發熱也人身之氣內和則外固下焦利則上焦平此症下不利內不和故外不固而上不平也

秋後痢疾皆因於溼而成於鬱固已而熱痢寒痢之分則因稟質之殊及溼邪之從水化從火化爲傳變就此症論之惡寒發熱乃陰陽相爭之象即寒熱錯雜之徵而白爲寒紅爲熱清稀者爲寒濃濁者爲熱此證痢如清涕又爲溼從



水化寒溼偏盛之徵雖略帶赤絲已由氣分傷及血分而寒溼真相不爲之滅其人必屬陽虛可無疑義

桂枝生薑粉葛宣上焦之陽於外以治惡寒黃芩撤上焦之熱於內以治發熱此通外即以暢內清上卽以利下也廣香大黃導滯滌腸以達肝氣之鬱白芍平肝歛陰以解大腸之迫此寫府守藏調和金木以息紛爭也薑附吳萸溫中下治本氣之虛以勝寒溼開腸胃之鬱以逐寒溼又吳萸用黃連水炒者引火歸土也當歸入血分散寒通陽與薑附吳萸相輔而行氣血並治中氣宜緩外散內攻之藥皆急而不緩故除白芍平肝守肝外更用甘草以緩脾

大黃能攻腸胃實滿陽虛則爲薑附之使變寒下爲熱下蓋古法也痢疾初起正氣未傷頗中竅要

痢疾爲金木相爭於下之病故平肝以解大腸之逼通大腸以達肝木之鬱爲不易之治亦有但通大腸而不平肝者余曾治一痢頗劇發熱口渴無汗脈數

用清熱導滯面兼青蒿丹皮薄荷粉葛等以散其外熱服二劑微汗出熱退身涼痢亦稍減左手脈平復如故惟右脈不和用升降散調蜂蜜水每服一錢早晚各一次四五日而愈繼以養胃陰爲善後又數日卽復原始終無用白芍平肝之脈證也

四、周某禁口痢二十餘日甚危殆一日三四十次肛門腫痛食不進每日只能食點茶而已

栗 壳 三錢 炙

乾 薑 五錢

地 榆 二錢

白 芍 五錢

吳 萸 二錢

倉 米 五兩

陳茶葉 三錢

黑 豆 二兩

廣台烏 二錢

五穀蟲 三錢

三付

此痢疾也痢疾古稱滯下內經謂之腸澼按莊子注澼漂也腸澼者附腸脂膏經邪熱鬱蒸發酵腐爛遂漂澼而出於大便也其初由生冷食物入于腸胃凡



腸胃間者受寒氣而氣血鬱滯之處卽暑濕蘊蓄糟粕留聚及腸脂腐壞之處鬱之愈久則熱愈甚邪愈固而膠粘腐穢之膿血愈多其發爲腸澼也亦愈甚張景岳曰口不受寒痢從何得洵不誣也夫大腸庚金本以收爲用而其職司傳導得以降濁收中又有放者乃肝以泄之脾以運之腎以節之也大腸氣鬱則肝氣尤鬱收者過收泄者必泄故下而必滯滯而必下運節皆不行矣脾主健運肝主疎泄腎主二便不食下利太陰病也後重下迫厥陰病也開闔無節少陰病也凡腸澼無不備斯三者內經稱其爲脾肝腎之病良有以也噤口痢飲食入口皆吐乃邪盛於胃而氣逆此症食不下乃寒盛於中而陽微非噤口也其肛門腫痛者乃厥陰陽明之氣開闔相爭以致溼熱毒邪逼於廣腸下端而不解也

先天重肝腎後天重脾胃痢而脈靜身涼飲食如故雖劇無害痢而脈大身熱或不能食皆危證也此症食不進及歷時之久則爲正虛而每日次數之多及

肛門腫痛又爲邪盛正虛宜補而邪盛不可補邪盛宜攻而正虛不可攻病之難治孰有逾於此者蓋猶喪亂之局民不聊生盜賊縱橫地方糜爛一於用兵則恐玉石俱焚勝算未操一於安撫則恐養寇遺殃噬臍莫及當斯時也惟有擇守形勝繕甲修隍賑恤顛連懷柔流散追賊勢孤窮然後一舉而殲之則事半功倍矣此症治法何以異是是故倉米者甘以養正淡以除溼乾薑吳萸溫中逐寒溼以輔之鞏衛倉廩重地也黑豆者靜以制動甘以解毒白芍粟壳地榆斂陰攝正氣以輔之鎮定作強重地也茶葉降火滌垢膩穀蟲清熱治穢濁烏藥開鬱散結氣共爲之使俾碩果之危得苞桑之繫可守而復可戰矣

肛門腫痛非大腸一府之戾也方主安定血氣攝回耗散俾各守其鄉而糾紛自釋雖根株未能痛斷而賊勢日孤矣

痢疾爲害有有形者有無形者如下利不食肛門腫痛此有形也若毒聚於下腎水暗消而肝木失養氣爭於下腎志不寧而真氣易散乃無形也當此邪盛

正虛補寫均非之時欲求介於補寫之間以進正退邪而可以爲君藥者捨倉米黑豆二味其誰與哉蓋黑豆甘平沈靜具除熱補水鎮腎寧志活血通脈消腫止痛之功陳倉米則甘淡冲和調胃治痢施之此症此時皆絕無而僅有者有形無形靡不適合雖無煇赫之功却有迴天之力至平至常卽至神至奇也粟壳固腎瀦腸地榆清血瀦血惟久痢正虛而邪不盛者爲宜然善用之則守正而不固邪觀心沙治欬方往往麻辛五味並用識得此中三昧神而明之則不泥矣五穀蟲以穢治穢而主毒痢茶葉不惟滌垢膩且保上焦清肅皆以平淡制勝者也

前方服二付病減八分又方

萊

菴 三錢炒

生

薑 三錢

腹 皮

五錢

砂

仁 二錢

白

芍 三兩

香

附 三錢

豆

蔻 二錢

銀

花 三錢

廣

香 五分

明

雄 三錢

生白朮

五錢

山

查 三錢

