

名醫類案卷第九

新都篁南江瓘集 後學

仁和余集蓉裳  
錢塘魏之琇玉橫  
仁和沈烺敦曾  
歙鮑廷博以文 重校

淋閉

壺仙翁治瓜州趙按察病臏脹不能食。洩遺血。衆醫以爲熱。下以大黃之劑。神乏氣脫而不能寐。召翁診其脈。告曰。病得之勞傷心血。久則脾胃俱受傷耳。所以知按察之病者。切其脈左寸沉。右寸過左一倍。兩關弦濇。尺反盛。蓋煩勞不勝。則逆鬱而不通。不通則不能升降。而作臏脹。臏脹則

木門

一印不足齋王本

不食肉沸而不下。則關橐閉而洩且。不輸故洩遺血。乃和以八補之劑。兼五鬱之藥。不數日而愈。越三月復作。如前

治立除。此案重見第四卷腫脹門

陝人高文病淋一日。口噤厥逆。見症奇一日之淋而口噤厥逆耶他醫以為

風翁曰。誤矣。此熱客膀胱。故難洩耳。投以八正散二服。而洩大行。病且愈。所以知文之病者。診其脈尺沉而大。按之而堅。知病之在下也。膀胱者。津液之府。氣化則能出。此蓋由於熱淋。而更接內。故移熱於膀胱。而使洩難也。

東垣治一人病小便不利。目睛突出。腹脹如鼓。非鼓脹因小便不出而脹

膝以上堅硬。皮膚欲裂。飲食且不下。服甘淡滲泄之藥。皆

不效。李曰：疾深矣，非精思不能處。思之半夜，曰：吾得之矣。內經有云：膀胱者，津液之府，必氣化乃能出焉。今服淡滲之藥而病益甚者，是氣不化也。啟元子云：無陽則陰無以生，無陰則陽無以化。甘淡氣薄，皆陽藥，獨陽無陰，其欲化得乎？明日以滋腎丸羣陰之劑投之，再服而愈。

方見丹溪

長安王善支，病小便不通，漸成中滿，腹大堅硬如石，壅塞之極，腿脚堅脹，裂出黃水，雙睛凸出，晝夜不得眠，飲食不下。

獨爲

痛苦不可名狀。伊戚趙謙甫詣李求治，視歸，從夜至

關

旦，耿耿不寐，究記素問有云：無陽則陰無以生，無陰則陽

無以化。又云：膀胱者，州都之官，津液藏焉，氣化則能出矣。

此病小便癃閉。是無陰而陽氣不化也。凡利小便之藥。皆淡味滲泄。爲陽止。是氣藥。陽中之陰。非北方寒水。陰中之陰。所化者也。此乃奉養太過。膏粱積熱。損北方之陰。腎水不足。膀胱腎之室。久而乾涸。小便不化。火又逆上。而爲嘔噦。非膈上所生也。獨爲關。非格病也。潔古云。熱在下焦。填塞不便。是關格之法。今病者內關外格之病。悉具。死在旦夕。但治下焦。可愈。隨處以稟北方寒水所化。大苦寒之味者。黃栢、知母、桂。爲引用。丸如桐子大。沸湯下二百丸。少時來報。服藥須臾。如刀刺前陰。火燒之痛。溺如瀑泉湧出。卧具皆濕。床下成流。顧盼之間。腫脹消散。李驚喜曰。大哉聖

人之言。豈可不遍覽而執一者也。其症小便閉塞而不渴。時見躁者是也。凡諸病居下焦皆不渴也。非先生不能道此語二者之病。一居上焦。在氣分而必渴。一居下焦。在血分而不渴。血中有濕。故不渴也。二者之殊。至易別耳。治下焦

羅謙甫治劉太保淋疾。問曰。近夏月來。同行人多有淋證。氣運使然。抑水土耶。羅曰。此間別無所患。獨公所有之。殆非氣運。水土使然。繼問公近來多食何物。曰。宣使賜木瓜百餘對。遂多蜜煎之。每客至。以此待食。日三五次。曰。淋由此也。內經曰。酸多食之。令人癢。凡治小便不利。不可用酸奪飲則已。曰。醋味致淋。其理安在。曰。小便主氣。經云。酸入于胃。其氣滲以

收。上之兩焦。弗能出入也。不出則留胃中。胃中。和濕。則下注膀胱之胞。胞薄以懦。得酸則縮。蹇約而不通。水道不行。故癰而瀦。乃作淋也。果如言而愈。

黃明之六月中小便淋莖中痛不可忍。相引脇下痛。以川練子生甘草一錢。元胡索七分。人參五分。茯苓四分。琥珀澤瀉柴胡當歸稍各三分。作一服。名曰參苓琥珀湯。用長流水三盞。煎至一盞。溫服。空心食前大效。此方可法

中書右丞合刺合孫病小便數而少。日夜約至二十餘行。臍腹脹滿。腰脚沉重。不得安卧。至元癸未季春。羅奉旨治之。診視脈得沉緩。時時帶數。常記小便不利者有三。不可一

槩而論。若津液偏滲於腸胃。大便泄瀉而小便澁少。一也。宜分利而已。若熱搏下焦津液。則熱濕而不行。二也。必滲泄則愈。若脾胃氣澁。不能通利水道。下輸膀胱而化者。三也。可順氣令施化而出也。分利滲泄順氣三法治之不可不記今右丞平素

膏粱。濕熱內蓄。不得施化。膀胱竅澁。是以起數而見少也。

非滲泄分利。則不能快利。遂處一方。名曰茯苓琥珀湯。內

經曰。甘緩而淡。滲熱搏津液內蓄。臍腹脹滿。當須緩之。泄

之。必以甘淡為主。遂以茯苓為君。滑石甘寒。滑以利竅。猪

苓琥珀之淡。以滲泄而利水道。故用三味為臣。脾惡濕。濕

氣內蓄。則脾氣不治。益脾勝濕。必用甘為助。故以甘草白

水同  
印不足齋正本

木為佐。鹹入腎。鹹味下泄為陰。澤瀉之鹹。以瀉伏水。腎惡燥。急食辛以潤之。津液不行。以辛散之。桂枝味辛。散濕潤燥。此為因用。故以二物為使。煎用長流甘爛水。使下助其腎氣。大作湯劑。令直達于下而急速也。此方尤妙于五苓散。五苓散加滑石。

琥珀君臣佐使用法不同 兩服減半。旬日良愈。

丹溪治一老人。因疝疼二十年。多服蒼朮烏附等藥。疝稍愈。

又患淋十餘年。其間服硝黃諸淋藥。不效。忽項右邊發一

大疽。連及缺盆。不能食。淋痛愈甚。叫號困憊。時當六月。脈

短。瀼左微似弦。皆前烏附積毒所致。凝積滯血。蓄滿膀胱。

脈。澁為敗血。瀼為血虛而斷為敗血亦合症而云 短為血耗。忍痛傷血。叫號



傷氣。知其溺後有如敗膿者。詢之果然。遂先治淋。令多取。

土牛膝根。莖葉濃煎湯。并四物湯。大劑。與三日後。痛與

敗膿漸減。五七日淋止。瘡勢亦定。蓋四物能生血也。但食

少。瘡未收斂。用四物加參。芪。白朮。熬膏。以陳皮。半夏。砂仁。

木香煎取清汁。調膏與之。遂漸能食。一月瘡安。先行瘀生新後調元

補胃行氣開痰故曰非開痰不足以行氣也

一人小便不通。醫用利藥益甚。脉右寸頗弦滑。此積痰在肺。

肺為上焦。膀胱為下焦。上焦閉則下焦塞。如滴水之器。必

上竅通而後下竅之水出焉。以藥大吐之。病如失。

一婦脾疼後。大小便不通。此痰隔中焦。氣聚下焦。二陳加木

林明  
五知不足齋正本

通煎服，再一服，探吐之。

沈宗常治黎守溺不下，或竄以藥，益閉，常曰：結絡不解，痰成癖。法當吐果，吐而洩，如故。

孫琳路鈐本殿前司健兒，善醫。寧宗爲郡王，病淋，日夜凡三百起。國醫罔措，有薦之者。光宗時在東宮，亟召之。至，孫求二十錢，買大蒜、淡豉、蒸餅三物，爛研合和爲丸。令以溫水下三十丸。且曰：今日進三服，病當退三分之一。明日再進如之。三日則病除，已而果然。奏官右列，或問其說。孫曰：小兒何緣有淋？只是水道不通利。蒜豉皆通利，無他巧也。

滑伯仁治一婦病，艱於小溲，中滿喘渴。一醫投以瞿麥、梔苓。

諸滑利藥而秘益甚。診其脈三部皆弦而澹。曰：經云：膀胱者，州都之官，津液藏焉，氣化則能出矣。所謂水出高源者也。臏中之氣不化，則水液不行，病因於氣。徒行水無益也。

法當治上焦，乃製朱雀湯。朱雀湯雄雀肉一隻，赤小

一兩，大棗肉一兩，小麥一兩，紫石英一兩，紫菀五錢，遠志五錢，丹參五錢，甘草三錢，和勻為粗

末，每服三錢，水煎食遠溫服。河間朱雀丸倍以枳桔

茯神二兩，沈香五錢，硃砂五錢，參湯下。煎用長流水一飲而溲，再飲氣平，數服病已。東垣案：渴分在

氣在血合前東垣案看之方知其妙

一婦年六十餘，病小溲閉，若淋狀，小腹脹，口吻渴，診其脈沉

且澹。曰：此病在下焦，血分陰火盛而水不足，法當治血。血

與水同。血有形而氣無形。有形之疾當以有形法治之。卽

以東垣滋腎丸服之而愈。

兩案一弦而瀋一沈而瀋以渴者屬氣分不渴者屬血分

韓悉治一人淋素不服藥。教以專啖粟米粥。絕他味。旬餘減

月餘痊。

虞恒德治一人年七十。秋間患小便不通。二十餘日。百方不

效。後得一方。取地膚草搗自然汁服之。遂通。

地膚草單方葉名錢掃帚

雖至微之物。而有迴生起死之功。故并載之。

吳菱山治一婦患淋瀝。數而疼痛。身煩燥。醫以熱淋治之。用

八正散。連子飲。服之愈劇。吳診脈沉數。無力。

沉數為熱在血無力為虛

在氣總歸虛熱不得用八正散知氣與火轉鬱於小腸故也。遂與木通、麥

稿節、車前子、淡竹葉、麥冬、燈心、甘草稍、大腹皮之類服之而安。蓋小腸乃多氣少血之經。今病脈係氣鬱反用大黃、梔苓味厚苦寒之藥。故寒極傷氣。病轉加矣。殊不知血中有熱者。乃有形之熱。為實熱也。氣中有熱。乃無形之熱。為虛熱也。同一熱也。而分在氣在血。血中之熱為實氣中之熱為虛。大有至理。可悟建中老人治痘之法。凡氣中有熱者。當行清涼薄劑。無不獲效。更分氣血多少之經。須辨溫涼厚薄之味。審察病機。斯無失也。

程沙隨苦血淋百藥無效。偶閱本草。因見白冬瓜治五淋。於是日煮食之。至七日而愈。

唐與正治吳巡檢病不得前洩。卧則微通。立則不能涓滴。醫

林別

七知不足齋正本

通醫類考卷九  
通用通小腸藥不效。唐因問吳常日服何藥。曰常服黑錫丹。問何人結砂。曰自爲之。唐洒然悟曰。是必結砂時鉛不死。硫黃飛去。鉛砂入膀胱。卧則偏重。猶可溲。立則正塞水道。以故不能通。令取金液丹三百粒。分爲十服。煎瞿麥湯下之。膀胱得硫黃。積鉛成灰。從水道下。猶累累如細砂。病遂愈。夷堅志

夫硫黃之化鉛。經方所載。苟不察病源。而以古方從事。未見其可也。

鄞縣尉耿夢得妻。苦砂石淋十三年。每溺時。器中剝剝有聲。痛楚不堪。一醫命採苦杖根。俗呼爲杜牛膝者。淨洗碎之。

凡一合用水五盞煎耗其四而留其一去滓以射乳香末少許研調服之一夕愈

本事方

元戎載一人小溲不通一切利小溲藥不效以其服附子太過消盡肺陰氣所不化師用黃連芩解毒而得通

劉子安病腦疽服內托散後泄不止小便大不通亦消肺陰之過諸藥不效郭子明輩用木通五苓導之愈秘劉用陳皮茯苓生甘草之類肺氣下行遂通若止用利小便藥其不知本甚矣

醫壘元戎

王仲陽治一士人弱冠未婚病遺瀝日久每作虛寒脫泄治之益甚王診得六脈弦數難記至數形骨立不能支王曰

此三焦不利。膀胱蓄熱爲五淋也。患者曰：膏血砂垢。每溺則其痛不可言。乃用局方五淋散。加山梔子、赤芍藥、川木通、瞿麥、穗、蚵、蛟、衣、草、滑石末作大劑。入燈心二十莖煎服。五七日全愈。無奈頻發。既而九日便溲俱不通。秘悶欲死。王卽令用細灰於患人連臍帶丹田作一泥塘。徑如碗大。下令用一指厚灰。四圍高起。以新汲水調朴硝一兩餘。令化。漸傾入灰塘中。勿令漫溢。須臾大小便迸然而出。溺中血條皆如指大。若非熱解氣使。則其如龜竅之小。何由連出三四日惡物復得回生。再令服黃連解毒丸。前後二三載。不下三四斤矣。至今安然不發。



一男子患淋久。囊大如毬。莖如槌。因服利藥多。痛甚。脈微弱。如線。以參。芪。歸。朮。加肉桂。元胡。各一錢。木通。山。卮。赤。芍。赤茯苓。甘草。稍等藥。一服痛稍減。二服小溲利。四服愈。

程明祐治昌江一人新娶。夏日患淋濁澁痛。投藥清利。遂苦楚。眼痛。再服瀉心涼肝。口苦下泄。久之。盜汗潮熱。程診之。脈。緩。弱。無。力。左。濇。而。微。曰。脈。之。緩。而。弱。脾。虛。也。濇。而。微。者。血。不。足。也。投。以。益。元。氣。養。血。之。劑。病。良。已。

薛立齋治大尹劉天錫。內有溼熱。大便滑利。小便濇滯。服淡滲之劑。愈加滴瀝。小腹腿膝皆腫。兩眼脹痛。此腎經虛熱。在下焦。淡滲導損陽氣。陰無以化。遂用地黃滋腎二丸。小便如故。更以補中益氣。加麥冬五味。兼服而康。