

經病
崩漏
帶下
諸病

胎前
產後
子嗣

丹溪心法附餘卷之二十

婦人門上

經病九十二

丹溪心法

○婦人經水過期血少也。四物加參朮。帶痰加南星半夏陳皮之類。
經水不及期而來者血熱也。四物加黃連。過期紫黑有塊亦血
熱也。必作痛。四物加香附黃連。過期淡色來者痰多也。二陳加川
芎當歸。過期而來是血虛。宜補血。用四物加黃芪陳皮升麻。未
及期先來。乃是氣血俱熱。宜涼氣血。柴胡黃芩當歸白芍生芩香附
之屬。經不調而血水淡白。宜補氣血。參芪芎歸香附白芍。腹痛加
膠珠艾葉玄胡索。經候過而作痛者。乃虛中有熱。所以作疼。經

水將來作疼者血實也

一云氣滯

四物加桃仁黃連香附

臨行時腰疼

腹痛乃是鬱滯有瘀血宜四物加紅花桃仁莪朮玄胡索香附木香

發熱加黃芩柴胡

紫色成塊者熱也四物加黃連柴胡之類

痰

多古住血海地位因而下多者日必漸昏肥人如此用南星蒼朮川

芎香附作丸子服之

肥人不及日數而多者痰多血虛有熱亦用

前九藥中更加黃連白朮丸服

血枯經閉者四物加桃仁紅花

軀脂滿經閉者以導痰湯加黃連川芎不可服地黃泥膈故也如用

以薑汁炒

肥胖飲食過度之人而經水不調者乃是濕痰宜蒼朮

半夏滑石茯苓白朮香附川芎當歸臨經來時肚痛者四物湯加陳

皮玄胡索牡丹皮甘草痛甚者豆淋酒痛緩者童便煮附人炒條芩

末爲丸

經水去多不能住者以三補丸加香附龜板全龜狗脊一

陰虛經脉久不通小便澁身體疼痛四物加蒼木牛膝陳皮生甘草
又用蒼莎丸加蒼耳酒芍藥為丸就煎前藥吞下

入方 治經水過多

黃芩炒

白芍藥炒

龜板炙各一兩

黃柏炒三錢

椿根白皮七錢半

香附子二錢半

右為末酒糊丸空心溫酒或白湯下每服五十丸

又方 治積痰傷經不行夜則妄語

瓜蒌子一兩

黃連半兩

吳茱萸十粒

桃仁五十箇

紅麴二錢

砂仁二兩

麻柎木

右為末生薑汁浸炊餅為丸如梧子大每服百丸空心滾水下

又方 治一切瘀血為痛

香附

四個醋煮

桃仁 二兩

牡丹皮

瓦礫子

煨二兩醋煮一晝夜

大黃

蒸熟

當歸

各一兩

川芎

紅花

各半兩

右為末蒸餅丸如梧子大每服三五十丸空心溫酒下

導痰湯

見痰類

三補丸

見補損

蒼莎丸

見咳嗽

附諸方

○月經不調

加減四物湯

治衝任虛損月水不調臍腹疔痛

當歸

川芎

芍藥

熟地

各等分

右以水煎服加減于後

若經候微少漸漸不通手足煩疼漸瘦生潮熱脉微數本方去地

黃川芎加澤蘭葉三倍甘草半分 經候過多本方去熟地加生

芩或只加黃芩白朮 經行身熱脉數頭昏本方加柴胡黃芩

經行數少或脹或痛四肢疼痛加延胡索沒藥白芷與本方等為

末淡醋湯調下 經候不調心腹疔痛只用芎歸二味名君臣散

氣冲經脉故月事頻併臍下多痛加芍藥 經欲行臍腹絞痛

加玄胡檳榔苦練炒木香減半 經水澁少加葵花紅花 經水

適來適斷或有往來寒熱先宜服小柴胡湯後以四物和之 經

候過而作痛血氣俱虛也宜本方對四君子湯服之

大溫經湯 和劑方 治衝任虛損月候不調或來多不已或過期不

行或崩中去血過多或經損娠瘀血停畱小腹急痛五心煩熱

阿膠 碎炒

芎藭

當歸 去芦

人參 去芦

肉桂 去皮

甘草 炙

芍藥

牡丹皮 各二兩

半夏

一兩半湯泡七次

吳茱萸

二兩湯洗七次

麥門冬

去心五兩半

右吹咀每服五錢水一鍾薑五片煎七分空心熱服

南嶽魏夫人濟陰丹

和劑方

治婦人血海虛冷久無孕育及數墮

胎一切經候不調崩中漏下積聚諸症

秦艽

二兩

京墨

煨醋研一兩

糯米

炒一斗

川芎

一兩半

熟地黄

酒蒸四兩

茯苓

去皮三兩

人參

去芦二兩

石斛

去根酒浸二兩

蒼朮

米泔浸去粗皮八兩

香附

沙去毛四兩

木香

炮一兩

藁本

去芦二兩

當歸

去芦酒浸二兩二兩

肉桂

去粗皮一兩半

乾薑

炮一兩半

山藥

七錢半

澤蘭葉

四兩

川椒

去目炒七錢半

細辛

去芷葉一兩半

桔梗

炒二兩

桃仁

去皮尖二兩炒

大豆黃卷

炒半斤

甘草

炙二兩

蚕布

燒灰二兩

牡丹皮

一兩

右爲末煉蜜爲劑每兩作六丸每服一丸細嚼空心溫酒醋湯仕

下以醋糊為丸如梧櫚子大亦可

交加地黃丸 治經水不調血塊氣痞肚腹疼痛

生薑一斤 老生薑一斤 玄胡索 當歸 白芍藥 川芎 各一兩

沒藥 木香 各一兩 桃仁 去皮 人參 各一兩 香附 半斤

右將地黃生薑各搗汁以生薑汁浸地黃粗地黃汁浸生薑粗皆以汁盡為度次將餘藥為末共作一處日乾同為末醋糊丸如梧子大空心服五十九薑湯下

內炙散 和劑方 治婦人血氣虛損崩中漏下淋瀝不已或凝積血

塊腰腹刺痛凡月水不調血暈頭眩皆治

藿香葉 丁香皮 熟乾地黃 洗焙 肉桂 去皮各一兩半 甘草 炙

當歸 去芦洗 白朮 山藥 白芷 各八兩 茴香 一兩半

藁本 去芦

乾薑 炮

黃芪 去苗

川芎

木香 各一兩

陳皮 去白

白芍藥 一兩

右為末每服三錢水一鍾薑五片艾十葉同煎空心熱服溫酒調

下亦可如產後下血過多加蒲黃煎惡露不快加當歸紅花煎嘔

吐加藿香生薑煎

活血散 御藥院方 治衝任經虛經事不調不以多少前後並皆治之

白芍藥

玄胡索

當歸

川芎 各四兩

肉桂 去皮

右以咀每服四錢水一鍾煎七分食後熱服

溫經湯 大全良方

治婦人血海虛寒月水不利

當歸

川芎

芍藥

桂心

牡丹皮

莪朮 各半兩

人參

甘草

牛膝 各二兩

右吹咀每服五錢水鍾半煎八分不拘時溫服

醋煮香附丸

治婦人經候不調血氣刺痛腹脇膨脹頭暈

治婦人經候不調血氣刺痛腹脇膨脹頭暈

惡心崩漏帶下便血癥瘕並宜服之

大香附

砂盆擦去皮以米醋浸半日用瓦銚慢火煮令醋盡漉出切薄片焙研為末

右用米醋煮糊丸如梧子大日乾每服五十丸淡醋湯下一方香

附子一斤艾葉四兩當歸二兩製如前法治症一同名艾附丸

如聖丹

聖惠方

治婦人經脉不調赤白帶下

粘礬

四兩

蛇床子

二兩

右為末醋糊丸如彈子大用乾胭脂為衣綿裹放陰中如熟極再

換

增損四物湯

宜明方

治月經不調心腹疼痛補血藏溫經注顏

川芎

芍藥

當歸

熟地黃

白朮

牡丹皮

各五錢
地骨皮 一兩

右咬咀每服五錢水二鍾煎一鍾去滓食前通口服

丹參散

大全良方

治婦人經脉不調或前或後或多或少產前胎

不安產後惡血不下並治之兼治冷熱勞腰脊痛骨節煩疼

丹參

去芦不以多少

右為末每服二錢酒調下經脉不調食前冷熱勞無時

桃仁散

大全良方

治婦人月水不調或淋瀝不斷斷後復來狀如

瀉水四肢虛弱不能飲食腹中堅痛不可行動月水或前或後或

月水不來舉體沉重惟欲眠多思酸物

桃仁

甘草

半夏

各一兩

赤芍藥

生地黃

各二兩

澤蘭

牛膝

當歸

相心

生丹皮

人參

蒲黃

川芎 各一兩

右咬咀每服一兩水二鍾生薑三片煎八分空心服

四製醋附丸 瑞竹堂方

治婦人女子經候不調

香附子 去毛一斤作四分

一分好酒浸七日

一分小便浸七日

一分鹽水浸七日

一分米醋浸七日 各焙乾

右為末醋糊丸如梧子大每服七十丸空心食前鹽酒送下肥人依方服瘦人加澤蘭葉赤茯苓 各二兩

○廣按香附子血中之氣藥也婦人血用事今用香附子開鬱行氣蓋氣行而血亦行矣何病之不瘳哉

當歸地黃丸

治婦人血氣不和月事不勻腰腿疼痛

當歸

川芎

白芍藥

熟地

各半兩

牡丹皮

玄胡

各二錢半

人參

黃芪

各一錢二分半

右爲末煉蜜丸如梧桐子大每服三十丸食前米湯下

○廣按月信趙前爲熱宜用涼藥以清熱藥退後爲虛宜用溫藥以補虛已上諸方不及分而爲二用者審之

○月經不通

王節齋曰婦人女子經脉不行多有脾胃損傷而致者不可便認作經閉血死輕用通經破血之藥遇有此症便須審其脾胃如何若因飲食勞倦損傷脾胃少食惡食泄瀉疼痛或因誤服汗下攻剋藥傷其中氣以致血少而不行者只宜補養脾胃用白朮爲君

茯苓藥為臣佐以黃芪甘草陳皮麥芽川芎當歸柴胡等藥

旺則能生血而經自行矣人有飲食積滯致損脾胃者亦宜消積

補脾若脾胃無病果有血塊凝結方宜行血通經

紅花當歸散 和劑方 治婦人血臟虛竭經候不調或斷續不來或

積瘀塊腰腹刺痛肢體瘦弱

劉寄奴草 五兩 當歸 去芦

牛膝 酒浸各一兩 肉桂 去芦

紅花

白芷 各一兩半 甘草 炙二兩

赤芍藥 一兩 紫葳 即凌霄花

蘇木 各二兩

右為末每服二錢空心熱酒調下如經閉濃煎紅花酒調下

通經丸 濟生方

治婦人室女經候不通臍腹疼痛或成血痕

川椒 炒去汗 蓬朮 炒去烟

乾漆 炒去烟

青皮 去白

當歸 去芦

乾薑 炒

大黃 炒

桃仁 炒

紅花

桂心 各等分

右為末將一半用米醋熬成膏和餘藥一半成劑曰中梓之丸如

梧桐子大陰乾每服五十九醋湯溫酒空心下

千金桃仁煎 簡易方

治婦人血積癥瘕月水不行等疾

桃仁 去皮尖 炒 朴硝

大黃 各二兩 蜜蟲 牛兩炒令黑色

右和勻以醋醋二升半於銀石器中慢火煎取一半却以桃仁大

黃蜜蟲末入內不住手攪度可圓時却下朴硝更不住攪良久出

之丸如梧子大五更初溫酒下五丸至日午取下如赤豆汁雞肝

蝦蟆各樣以盡為度

六合湯 濟主方

治婦人經事不行腹中結塊腰腿重痛

當歸 白芍藥 官桂 去皮 熟地黃 西 川芎

蓬木 炮各等分

右以咀每服四錢水一鍾煎七分空心服

凌花散 治婦人月水不行發熱腹脹

當歸 酒浸 凌霄花 劉寄奴 官桂 去皮 紅花 酒浸候前藥一二沸即入

牡丹皮 酒洗 川白芷 赤芍藥 延胡索 各等分

右以咀每服四錢水一鍾酒半鍾煎八分再入紅花煎熱服

玉燭散 張子和方

四物湯承氣湯朴硝各等分水煎食前服 四物湯見補損承氣湯見傷寒

二和湯 張子和方

四物湯涼膈散當歸各中停水煎服 涼膈散見濕熱

一方 治室女月經不通

紫葳 一兩 乾漆 炒 芍藥 蓬莪朮 當歸稍

右為末每服二錢空心酒調下

一方 療月經不通腹中痛

牛膝

六錢

大黃

細辛

水蛭三錢 糯米炒

川芎

當歸四錢

桃仁

去皮尖雙仁五錢炒

右為末煉蜜丸如梧子大每服二十九空心酒下

通經散

聖惠方

治室女月水不通

雄鼠屎一兩燒存性為末空心溫酒調下一錢神効

導經丸

聖惠方

治婦人經病不通臍腹連腰腿疼痛

當歸

川芎

白芍藥

甘草

炒

官桂

桃仁

炒一兩

大黃

二兩

血竭

二錢半

紅花

少許

地膽

二十個去翅足

右為末煉蜜丸如梧子大每服三十九空心溫酒下量虛實加減

服之