

S2651-7
885

少小嬰孺方

咳嗽
難病

癖結脹滿

癰疽

瘰癧

千金方衍義
七



孫真人千金方衍義卷五下

長洲張璐路玉著

南沙席世臣郢客校

小小嬰孺方下

凡四類

咳嗽第六

方十四首

小兒出胎二百許日頭身患小小瘡治護小瘡復發
五月中忽小小咳嗽微溫治之因變癰一日二十
過發四肢縮動背脊駢眊眼反須與氣絕良久復蘇
已與常治癰湯得快吐下經日不間爾後單與竹瀝
汁稍進一日一夕中合進一升許發時小疎明日與



北京中醫藥大學圖書館藏

此竹瀝湯得吐下發便大折其間猶稍稍與竹瀝

竹瀝湯方

竹瀝 五合

黃芩 三十銖

木防已

羚羊角

白朮 各六銖
作白蘇 一大黃二兩

茵芋 三銖

麻黃

白薇

桑寄生

草薺 二方

甘艸 各半兩

右十二味咬咀以水二升半煮取藥減半內竹瀝

煎取一升分服二合相去一食久進一服

衍義

咳嗽有六淫七情經絡臟腑種種不侔此專因胎

毒發瘡後變發癰與竹瀝治痰滌熱雖得小疎然



非吐下不能大朽其勢故用麻黃白薇開發肺竅
於上卽用大黃黃芩竹瀝疎利大腸於下鉛羊防
已草薺寄生茵芋專爲執毒發癰而設白朮甘
和中實脾師旅之糧餉也

紫苑湯 治小兒中冷及傷寒暴嗽或上氣咽喉

鳴氣逆或鼻塞清水出方

紫苑

杏仁

黃芩

當歸

甘艸

橘皮

青木香

麻黃

桂心

各六銖

大黃

一兩

右十味咬咀以水三升煮取九合去滓六十日至
百日兒一服二合半一百日至二百日兒一服
合

衍義

前方重在瘡毒發癰故用羚羊防己茵芋等味此

方專主寒嗽故取古今錄驗橘皮湯全方但加大
黃青木香二味以滌內積之乳癖不可拘於大人

治例也

五味子湯 治小兒風冷入肺上氣氣逆面青喘

迫咳嗽晝夜不息食則吐不下方

五味子

當歸各半兩

麻黃



乾薑

桂心

人參

紫苑

甘艸

欵冬花

細辛

各三銖

大黃

一兩半

白朮

二兩

右十二味咬咀以水二升半煮取九合去滓

服至百日一服二合半一百日至二百日一服

三合其大黃別浸一宿下一方無欵冬花大黃

有大棗三枚

符義

小兒風冷入肺咳嗽用麻桂薑辛欵冬甘苑當矣

以其有面青喘迫吐逆不下知肺胃之氣大虛非

藉人參不能安其胃氣非藉白朮不能止其吐逆

非藉五味不能斂其喘迫蓋小兒面青逆冷必非
伏熱假象但其咳嗽晝夜不息必有乳癖留滯於
中若係虛嗽火動則劇火靜則止定屬虛中救痰
之象無疑非藉大黃不能滌其乳癖非藉當歸不
能和其血氣上三方總藉麻黃大黃內外上下兼
井之力也

治小兒大人咳逆短氣胸中吸吸呵出涕唾嗽出
臭膿方

燒淡竹瀝煮二十沸小兒一服一合日五服大
人一升亦日五服不妨食息乳哺



衍義此卽前第一方所言單與竹瀝汁之法也

治小兒寒熱咳逆膈中有乳癖若吐不欲食方

乾地黃 四兩

麥冬

五味子

蜜 各半斤

大黃

硝石 各二兩



右六味咬咀以水三升煮取一升去滓內硝石蜜

煮令沸服二合日三胸中當有宿乳汁一升許出

大者服五合

衍義

地黃麥冬五味蜂蜜治久咳肺燥因膈中有乳癖

故用硝黃不用芒硝而用硝石專磨乳癖之用也

射干湯 治小兒咳逆喘息如水雞聲方

射干

麻黃

紫苑

甘艸

生薑

半夏

桂心

大棗

五枚

五寸

二十枚

五枚

右八味咬咀以水七升煮取一升五合去滓內蜜
五合煎一沸分溫服二合日三

衍義

此於金匱射干麻黃湯中除去細辛欬冬五味易

人桂心甘艸蜂蜜雖主治與金匱無異而桂心和

榮較細辛按肺之力稍緩甘艸和胃較五味收津

之味稍平蜂蜜潤燥較欬冬散結之性稍和非若

前五味子湯之有面青喘迫不得不藉參朮五味



之收斂津氣也

又方

半夏 四兩

紫苑

桂心

生薑

細辛

阿膠

甘艸 各二兩

蜜 一合

欸冬花 二合

右九味咬咀以水一斗煮半夏取六升去滓內諸

藥煮取二升五合五歲兒服一升二歲兒服六合

量兒大小多少加減之

衍義

前方專按風寒逆氣此方專按痰飲瘀結雖所見之證與前無異而受病之源不侔也



杏仁圓 治大人小兒咳逆上氣方

杏仁三升熟搗如膏蜜一升爲三分以

杏仁搗令強更內一分搗之如膏又內

熟止先食已含咽之多少自在日三每服不得

過半方寸七則利

衍義

杏仁爲辛散肺氣之峻藥生用則治傷寒喘逆熬

黑則治結胸痰垢其耗氣之性可知此與蜜三分

和搗藉其甘溫潤澤以降肺逆可爲曲盡製度之

妙然服不過半方寸七則利使肺氣從大腸降泄

無復咳逆上氣之患矣



中國醫藥大學圖書館藏

又方

半夏

二斤去皮河水洗六七度完用

甘艸

四兩

白礬

一斤研末

丁香

縮砂

艸薳

川升麻

各四兩

右七味以好酒一斗與半夏拌和勻同浸春冬三

七日夏秋七日密封口日足取出用冷水急洗風

吹乾每服一粒嚼破用薑湯下或乾喫候六十日

乾方得服

疑非孫思邈方

義衍

前方用蜂蜜製杏仁以潤肺燥咳逆此方用酒制

半夏以逐胃濕痰氣其白礬等味藉以解半夏之



北京中醫藥大學圖書館藏

毒并助胃健運之力耳

八味生薑煎 治少小嗽方

生薑 七兩

乾薑 四兩

桂心 二兩

甘艸

款冬花

紫苑 各三兩

杏仁

蜜 各一斤

右合諸藥爲末微火上煎取如飴餹量其大小多少與兒含咽之百日小兒如棗核許日四五服甚有驗

衍義

此治肺氣咳嗽氣逆用蜂蜜者藉以制薑桂之燥

也



四物欵冬圓 治小兒嗽晝瘥夜甚初不得息不

能復啼方

欵冬花

紫苑

各一兩半

桂心

半兩

伏龍肝

六銖

右為末蜜和如泥取如棗核大傅乳頭令兒飲之

日三傳之漸漸令兒飲之

^{衍義}

咳嗽晝瘥夜甚在少年當責之陰虛在老人當責

之血燥在小兒當責肺胃虛冷故用桂心伏龍肝

之辛溫實脾以助欵冬紫苑溫肺之力

荊蒲圓

治小兒暴冷嗽及積風冷嗽兼氣逆鳴



千金方卷五

方

菖蒲

烏頭

杏仁

礬石

細辛

皂莢

各錄

欵冬花

乾薑

桂心

紫苑

各十
八錄

川椒

五錄

吳茱萸

六合

數服便瘥

右十二味爲末蜜丸如梧子三歲兒飲服五丸加至十丸日三兒小以意減之兒大以意加之暴嗽

衍義

本經以菖蒲爲風寒濕痺咳逆上氣要藥世人但知其有通心利竅明耳目出聲之功咳逆絕不知



用是慮其溫燥也其辛烏薑桂椒萸總取辛溫散
冷之用其妙尤在稀涎散之皂莢礬石助菖蒲開
竅滌痰之力杏仁欬冬紫苑不過藉以引諸藥入
肺經耳

桂枝湯 治少小十日已上至五十日卒無聲咳

吐乳嘔逆暴嗽晝夜不得息方

桂枝 半兩

甘草 二兩半

紫苑 十八銖

麥冬 一兩十八銖

右四味咬咀以水二升煮取半升以綿著湯中捉
綿滴兒口中晝夜四五過與之節乳哺



麻黃湯 治少小卒肩息上氣不得安此惡風

肺方

麻黃 四兩

甘草 一兩

桂心 五寸

五味子 半斤

半夏

生薑 各二兩

右六味咬咀以水五升煮取二升百日兒服一合
大小節度服之便愈

衍義

桂枝湯風傷衛藥也以本方無治聲咳藥故去芍

藥薑棗而易紫苑門冬引領桂枝甘草以開發肺

胃逆氣 麻黃湯寒傷榮藥也以本方無治肩息

藥故借小青龍去白芍細辛易生薑以辟除惡風

