

S252/4747
1446
2部7

午集

外科正宗



外科正宗卷七

海甯許 帽辛木訂

明崇川陳實功著 吳江徐大椿靈胎評

海甯蔣光煊寅昉校

流注論第三十二

夫流者行也乃氣血之壯自無停息之機注者住也因

氣血之衰是有凝滯之患

楣案流注者其毒流走而竄注也此解似非

其

形漫腫無頭皮色不變母論穴道隨處可生凡得此

者多生於體虛之人勤勞之輩不慎調變夏秋露臥



北京中醫藥大學圖書館版權所

縱意取涼熱體當風圖身快爽或中風邪發散未盡

或慾後陰虛外寒所侵又或惱怒傷肝鬱結傷脾榮

氣不從逆於肉裏又或跌打損傷瘀血凝滯或產後

惡露未盡流宿經絡皆成斯疾既成之後當分表裏

寒熱虛實邪正新久而治之初因風寒所中表症發

散未盡者人參敗毒散散之房慾之後體虛寒氣外

侵者五積散加附子溫之

附子徐勒

勞傷鬱怒思慮傷脾

而成者歸脾湯加香附青皮散之跌撲傷損瘀血凝

滯而成者復元活血湯逐之產後惡露未盡流注經

絡而成者木香流氣飲導之此皆初起將成痛

服至三四服皆可外俱用琥珀膏敷貼其中亦

消者十中五六如服前藥不得內消者法當大養

血徐曰大培助脾胃溫暖經絡通行關節木香流氣

飲十全大補湯俱加熟附子香附熟附子徐勒培助根本

如此則未成者自消已成者自潰已潰者自斂而終

無殘敗破漏不斂之症如有膿宜急開之患者又當

慎起居戒七情遠寒就溫庶可保全若慢用寒涼剋

伐內消等藥終至不救者多矣



徐曰流注有虛痰實痰兩種

又曰流注一證由風寒入膜所致。膜在皮中旁通四達初無定處所以隨處作患。此真脈絡之病。故古人製大活絡丹以治之。其餘煎丸皆非正治。蘇州一小兒甫九歲患流注肩背腰脅十餘處百端醫治無效。余曰此惟大活絡丹能愈。服至三十餘丸未破者消已破者收口。更服補氣血之藥而愈。

此條從河溪醫案采入

流注看法

初起漫腫。皮色光亮。微熱微疼。筋骨不牽強者。順。已成
身體微熱。飲食有味。疼痛有時。腫生紅色者。順。已潰膿
稠而黃。腫消痛止。身體輕便。起坐如常者。順。潰後肉
易生。膿水易止。精神易復。膿口易合者。順。初起身體發
熱。脈細而數。皮色微腫。痛徹筋骨者。險。已成。飲食少思。
口乾作渴。身體疼痛。四肢沈重者。險。已潰。膿水清稀。腫
仍不消。虛熱不退。疼痛不減者。逆。潰後膿穢不止。肌膚
瘦削。飲食不食。發熱皮粗者。死。

徐曰。看法亦與諸症同。

流注治法

初起風寒表散未盡而後復生腫痛者再宜和解之表邪已盡而後復生流注者宜清熱消腫行散氣血暴怒所傷抑鬱所致胸膈痞悶中氣不舒宜順氣寬中腫硬已成而不得內消者宜和氣血更兼補助脾胃跌撲閃肭瘀血凝滯爲患者宜調和氣血通行經絡寒邪所襲筋攣骨痛及遍身疼痛者溫經絡行氣血產後敗血流注關節致生腫痛者當散敗瘀養氣血潰後膿水不止而形衰食少者宜滋氣血峻補脾胃

徐曰亦與諸症同

流注治驗

一男子風寒表散未盡兩腮腫痛微熱不退用小柴胡

湯加川芎天花粉

天花粉徐勒

桔梗連翹二服熱頓退又

以二陳湯加桔梗黃芩牛蒡子連翹四服十日而安

徐曰此乃風痰非流注也

一男子勞傷受寒背生三腫皮色不變寒熱交作至之

尤甚先以萬靈丹洗浴發汗寒熱頓退惟腫硬不消

以琥珀膏敷之三次腫消痛止漸平

徐曰此亦風痰所聚

婦人因怒脇下結腫將近半年方痛此肝氣鬱結之

症用本香流氣飲四服其腫漸紅蓋病久必欲停

不可內消又以十全大補湯徐曰加木香香附青皮

十餘服腫漸高又以本方加阜角刺五服其膿乃潰

清而且多此元氣已經虧損所致服人參養榮湯加

熟附子此味月餘膿始稠少本方倍參耆歸朮兩月

而愈

一男子元氣素虛因暴怒膊生腫塊疼痛牽強寒熱往



來飲食日減。以補中益氣湯

此五字徐勒批曰不切

加香附貝

母十餘服。寒熱漸止。又服益氣養榮湯。月餘而腫

間服八珍湯。外用香附餅日灸二次。

徐曰亦脾胃健不妥

而安

孀婦項間乳上各腫一塊。將近一年。漸大而痛。診之

脈細數而無力。此思慮過傷之症。用歸脾湯加桔梗

香附十餘服。腫漸高。以琥珀膏敷之。色漸紅。欲其作

膿。以十全大補湯加桔梗貝母服之。半月膿熟。針之

頭腐膿清。虛熱復作。食少不睡。仍以歸脾湯間逍遙

散服之三月而愈。

一男子平素怯弱腰後微腫一塊飲食少思口乾發熱。

此腎傷也。治當朝以附桂八味丸。

以上七字徐勒批曰大誤

人參養榮湯扶植根本為要。彼以口乾發熱為內有

火。

徐曰既有此症何得又用熱藥

欲投清涼之劑解之。

徐曰其死亦不以徒用涼

藥之故。

余辭不治。彼請內科治之以退熱為主。正合其

意。投藥三劑腹痛作瀉。又以豬苓澤瀉厚朴。

此三味徐勒批

日大

泄氣等藥投之。大熱發作。形體更變。復請余治。

余曰死期速矣。因虛致病。法當滋補。況腫在腰間。內

腎受傷口乾作渴腎水枯竭發熱不退陰虛血少
以有餘之藥而療不足之症豈有不死者哉又半月
而死

徐曰以上所載五案皆係痰毒並非流注之病流
注者纏綿不已或五或七或九愈者愈發者發變
態萬端若初生一兩箇旋即消潰皆非真流注也

流注主治方

調和榮衛湯

調和榮衛湯芎歸赤芍白芷并烏藥

獨活甘草耆大茴牛膝紅花兼陳皮

治流注初起氣血凝聚結腫不散已成未成並服

川芎

當歸

陳皮

獨活

各一錢

赤芍

白芷

烏藥

大茴香

黃耆

各八分

甘草

紅花

各五分

牛膝

下部加

水二茶鍾煎八分入酒一杯量病上下服

徐曰通治之方但少痰藥

楣案大茴香一味徐勒批曰此味不解

木香流氣飲

木香流氣飲芎歸枳殼檳榔防枳實

蘇桔青陳烏澤耆膝甘半芎大腹皮

治流注瘰癧及鬱結為腫或血氣凝滯偏身走注作

痛或心胸痞悶咽嗌不利脇腹膨脹嘔吐不食上氣



喘急咳嗽痰盛或四肢面目浮腫者。

川芎

當歸

紫蘇

桔梗

青皮

陳皮

烏藥

黃耆

枳實

茯苓

防風

半夏

白芍 各一錢

甘草節

大腹皮

木香

檳榔

澤瀉

枳殼 各五分

牛膝 下部

加一錢

水三茶鍾薑三片。棗一枚煎八分。食遠服。

徐曰。此流注主方。藥味太雜。宜擇用。

楣案青皮烏藥。大腹皮木香檳榔徐圈。



六鬱湯

六鬱湯內用川芎
甘梔蒼朮砂仁等

半夏陳苓香附同
淫痰流注即時通

治諸鬱結腫及左右二搭相串淫痰流注等症。

川芎

半夏

茯苓

香附

陳皮

山梔

各一錢

蒼朮

砂仁

甘草

各五分

水二茶鍾。薑三片煎服。

附子八物湯

附子八物湯芎芎
甘草肉桂當歸等

熟地人參朮茯苓
木香薑棗效如神

治房慾後陰虛受寒致生腫塊。又或偏身腿腳疼痛。

不能步履。

川芎

白芎

熟地

人參

白朮



茯苓

當歸

附子

各一分

肉桂

五分

木香

甘草

各三分

水二茶鍾。薑三片。棗一枚。煎八分。食遠服。

徐曰。此通治虛寒之方。非流注之方。凡立方總當

兼顧本症一二。不可全不照應。

瘡科流氣飲

瘡科流氣飲芎歸
防風枳殼香烏藥

甘桔蘇櫟芎桂耆
白芷人參厚朴隨

治流注。及一切鬱怒凝滯氣血。作腫疼痛。或胸膈痞

悶。或風寒溼毒搏於經絡。結成腫塊者。

當歸

甘草

紫蘇

人參

白芍



北京中医药大学图书馆藏

官桂

黃耆

防風

枳殼

烏藥

桔梗

厚朴

各七分

檳榔

木香

川芎

白芷

各五分

水二茶鍾煎八分食前服

徐曰此亦流注通治之方與前義同

通經導滯湯

通經導滯湯香附陳丹枳蘇甘草節

赤芍芎歸熟地隨牛膝紅花獨活宜

治婦人產後敗血流注經絡結成腫塊疼痛者

香附

赤芍

川芎

當歸

熟地

陳皮

紫蘇

牡丹皮

紅花

牛膝

