

卷十一

嵩庄尊生書

校正嵩庄尊生書

善仲



南京中医药大学图书馆版权所有

嵩崖尊生書卷之十

○周身部

任脈起于臍下四寸中極穴之下卽少腹胞宮之所由兩陰間會陰穴上毛際循腹裏之中央。腎闢元在臍下三寸至氣海在臍下寸半。越陰交在臍下一寸。臍之中央曰神闢。臍下二寸爲下腕。四寸爲中腕。五寸爲上腕。鳩尾在蔽骨下五分。膻中在兩乳之間。循是至咽喉上頸入目。其病男子內結七疝。女子帶下痕聚。

督脈起于溺孔。卽前陰繞脅貫脊歷命門穴。在十四椎至大椎卽百勞穴。在第一椎循風府。在髮下一寸上頭至腦戶。在百

會穴後四寸半百會穴在前髮上五寸下鼻至人中之水溝
穴其病脊強反折。

衝脈起于氣街卽氣衝陽明經穴在毛際兩旁。足少陰經腋
脅上行至胸中而散亦益足少陰下至足上至頭前至腹後
至背內自谿谷外自肌肉陰陽表裏無所不涉爲十二經之
海曰血海陽明爲水穀之海多血多氣主潤宗筋衝脈爲精
血之海主滲澆谿谷凡病逆氣裏急則知血海不調有餘重
滯不舒不足索然不廣。

○六淫分

上

中風必有暴仆。暴瘡蒙昧。啞邪癱瘓。不省人事。語言蹇澁。諸候無此。非中風也。古人治法。止有小續命一湯。中用附子。以其性壯。有斬關奪將之功能。升麻。麻黃。桂枝。防風。杏仁。開發腠理。驅邪表邪。引入參甘草。行十一經。追復失散之元陽。引當歸川芎入血分。滋養虧損之真陰。即防已去溼淫。石膏降胃火。黃芩清肺金。看所見症。與時月寒溫爲加減。其病自退。至劉河間出。則曰中風者。非肝木之風。內動亦非外中于風。由將息失宜。內火暴甚。水枯莫制。心神昏昧。筋骨不用。卒倒無所知。此河間主火之說。但不用六味丸。而用地黃飲子。辛熱之味。亦未是。李東垣則曰。中風者。氣虛而風邪中之。病在四

旬以後壯盛希有肥白氣痏則間有亦非尋常藥飮能療必
用三生飲生南星一兩生川烏五錢生附子五錢生薑制毒
行經絡治寒痏最捷再用人參一兩助真氣木香二錢調之
卽不治危症亦有得生者丹溪則曰西北氣寒有中風東南
氣溫非真中風皆氣血先虛溼土主痰痰生熱熱生風也治
法病在左四物加薑汁竹瀝病在右四君子加薑汁竹瀝左
右俱病八物加南星半夏薑汁竹瀝據三子主火主氣主溼
痰之說反以風爲虛象若以三子爲是則三子未出固有從
昔人而治愈者若以昔人爲是則三子旣出亦有從三子而
治愈者王安道則謂昔人三子之論皆不可偏廢而以昔人



所云爲眞中風以三子所云爲類中風。虞天民則謂眞中類中之說亦未全是。四方病此者盡因氣溼痰火挾風而作。何嘗見有真中類中之分。蓋百病皆有因。有證。古人類中風。古其證也。三子論中風。言其因也。知此則知眞中風。原因氣體虛弱。榮衛失調所致。若非體虛所致。則西北風寒大盛。宜中風者比比皆是矣。其因火因氣因溼者。亦未必無外邪侵侮。若無外邪。則火氣溼各自爲他症。豈有咽僻難煥。暴仆。暴瘡之候。治者外感重。先祛外邪。小續命湯可用。內傷重。先補中氣。六味八味四君子。四物酌用。此天民得中妙論。獨未曾說明。類症。類症有八。其因火因溼因氣。止可用。兼不可云類大

要初中風先用烏藥順氣散枳殼二兩炙草白芷桔梗各一
兩川芎殼蠶炮薑各五錢麻黃陳皮烏藥各一錢久則用
味順氣散四君子加烏藥青皮橘紅白芷此中風之大端也
而分經按症必一一詳明方可下手無誤

真中風類中風辨

中暑中寒中溼痰厥氣厥食厥熱厥虛暉皆卒倒不語但中風
必有啞邪搐搦或偏枯之症爲異而諸症惟氣厥尤近但中
風多痰氣厥無痰中風身溫氣厥身冷陽氣不能四達故也
而脉亦沉伏不若中風之浮洪

初中急救之法凡中風卒倒急以手大指掐人中候醒即提起

頭髮以通關散一字吹鼻中有嚏可治否則肺氣絕不治通
關散石膏爲君。黎蘆川芎細辛生甘人參爲末如口不開。烏
梅肉擦牙關口閉用吐法輕者用瓜蒂赤小豆名瓜蒂散或
牙皂枯白礬名稀痰散重者口閉。黎蘆末加麝香灌入鼻內
令吐如是口不開筋絕不治蘇合牛黃等丹劑勿輕用水麝
牛黃雄黃琥珀金珠等藥引邪透骨勿用大約初時當順氣
日久當活血祛風次之兼扶正氣扶正氣健脾也大忌破氣
如青皮枳實厚朴牽牛之類。

中腑中臟中經臟腑有俞俞在背中風從俞人有三中之分。
中腑必痛病在表多着四肢脉浮惡風證同傷寒太陽頭疼身

熱。春強陽明目痛。鼻乾少陽耳聾。脇痛嘔口苦。凡此俱宜小續命湯。通經發散。隨症加減。

中臟無痛。病在裏。多滯丸。厥中。肺鼻塞。中心不言。中脾脣。火大音二便閉。中肝目聟。中腎耳聾。輕則導滯丸。大黃枳實。神麩澤瀉。白朮茯苓。黃連。黃芩。重則三化湯。大黃枳實。厚朴羌活。

通其壅滯。然後隨症施治。或瀉。合半黃芩。或瀉。以蘿蔔水。報中經病。在半表半裏。外無六經之症。內無二便之閉。但見口眼喝邪。半身不遂。語言蹇澁。惟當養血通氣。大秦艽湯主之。八物去參。兼二地加秦艽。石膏。黃芩。細辛。防風。白芷。羌活。獨活。至于順時令。調陰陽。又勿膠桂。鼓瑟。或瀉。限用。蘿蔔水。報

閉牙關緊閉兩手握固是也用蘇合香丸或三生飲開之然必
實系中臟之症。是閉非脫者方可。若中腑中經卽閉亦不宜
用。謂牛麝等引邪入體如油入麵故也。

脫口開心絕手微脾絕眼直視肝絕遺尿腎絕聲鼾肺絕更有
吐沫肉脫髮直搖頭上墳面赤如粧汗出如珠皆是也。宜大
劑理中湯灸臍下可救十中之一。若誤服蘇合牛黃等。如人
井而下之石也。

不語有口噤舌強語濫。口噤者足陽明經挾口。風寒乘虛入
其筋則攣。故牙關急而口噤。先用烏梅擦牙法。更用寸許甘
草二段塗麻油炭火炙乾。抉開牙關令咬定。約人行十里許。

又換一段咬定然後以秦艽升麻湯灌之秦艽升麻葛根白芷白芍防風炙草桂枝人參芍白舌强者心脾受風腎肺挾舌本虛火上炎亦有之審係心脾用清火導痰祛風之藥審係腎火或壯水之主或益火之源外用龜尿少許點舌神效置龜新荷葉上以猪鬃截其鼻立出語澁爲聲不清有舌縱有舌麻皆以火治之節齋謂諸不語皆火與痰塞肺絡是也語澁湯烏藥殼僵蚕胆星黃芩黃連枳殼防風竹瀝薑汁半身不遂人有四肢猶木有枝幹必有根蒂人患半身不遂還延不死者猶木之根蒂未甚枯一邊枝幹先萎耳人有壯盛而忽作癱者猶木之根蒂先絕枝葉雖榮枯楊生華

之象何可久也。何謂根蒂？真火爲陽氣之根，真水爲陰氣之根。腎間之動氣是也。陽虛大劑參附峻補其陽，陰虛六味丸或十全大補，填實真陰，瘀不治而自去。仲景謂氣虛必逐，以腎氣尤補而逐之是也。督脈分左爲離，屬血陰與死血；右爲疾屬氣與炎，夫血屬左右無血乎？王節齋均主血虛兼瘀火溼熱，治極是不用風寒尤高手足不墮是脾病太過耳。下虛則補。

口眼喎斜是謂之筋脉受病。用油包頭一個燒灰，同麝五分，安蜆殼合水，扎定，卽正蛀竹屑陳曲屑草麻子麝香共碎。

蜆殼內照前法扎。

小便閉遺勿藥熱退自利 遺尿氣虛參芪加益智仁

預防入手足漸覺不遂或臂股拘節麻痺不仁皆中風先兆預防之法宜節飲食戒七情遠房慾然後察其脈之虛實而治之兩尺虛弱水衰六味丸火衰八味丸兩寸虛弱左衰四物湯右衰四君子湯左右俱衰十全大補湯若耑用搜風清氣豁痰適所以招風取中也不可不知

中風備用諸方

一切中風解表攻裏行中道治法盡矣

脉 中風浮吉滑兼痰氣其或沉滑勿以風治或浮或沉而微而虛扶元治痰風未可疏浮遲者吉急疾者死

中風之初惡風寒拘急不仁面見五色 湯治 是中腑先以麻黃一錢

人參 黃芩 白芍 甘草 川芎 杏仁 防已 官桂

中腑多看四

肢故多手足

半身不遂喘

聲如震獵猶

能自視口言

二便不閉以

此爲別

各一錢 防風一錢 炮附五分 發之 水忽 加 袢神遠志

加犀角五分 骨痛有熱去附子倍 白芍

骨冷疼倍 腹內相附

子 小便澀去附子倍 白芍 加 竹瀝 不利去

防已黃芩 加

附子白水各 半熟利去附子 腳軟加牛膝石斛各一錢

附子

身疼加秦艽一錢 腰疼加 桃仁杜仲各五分

失音加 杏仁一錢

狂妄加 麻黃三錢 八參桂木各二錢 去附子防風加

當歸一錢

自汗去 麻黃杏仁加 白水一錢 春更加 麻黃一錢 夏加 黃芩

分 七 秋加 當歸四錢 冬加 附子五分

如兼中臟則大便多澀

更服厚朴 大黃 枳實 羞活等

三花湯
攻裏

滋潤湯

微利即止

老弱則以當歸

生地 枳殼 厚朴 檳榔

大黃

火麻

杏仁

各一錢
七分
羌活
一分
紅花

一錢三
錢
分代之

愈風湯
行山道

若表裏既定別無變端

當服羌活

炙草

防風

蔓荆子

防已

黃芪

川芎

獨活

細辛

枳殼

麻黃

地骨

人參

知母

菊花

白芷

薄荷

枸杞

當歸

杜仲

秦艽

柴胡

厚朴

半夏

前胡

熟地

各四錢

茯苓

黃

芩

各六分

生地

蒼朮

石膏

白芍

各八錢

官桂

二分

久陰

加

生薑

三片

春

加

牛夏人參

柴胡

各四錢

木通

八分

夏

加

石膏黃

芩知母

各四錢

季夏

加

防已

白朮

茯苓

各四錢

加

厚朴

四分

藿

香桂

各二錢

加附子

官桂

各二錢

當歸

四分

久服大病既去



南京中医药大学图书馆版权所有

縱有小邪只以此湯加減治之自全愈

泰堯湯

泰堯

石膏

各一錢

甘草

川芎

當歸

白芍

羌活

各一分

獨活

防風

黃芩

白朮

白芷

茯苓

生地

熟地

各六分

細辛

二分

天陰

加一錢

生薑

三片

知母

四分

春是

加知母

三分

秋冬

不加

如唇吻不收舌失音鼻無聞耳塞目昧二便秘

是中
臟

多難愈

如中風面白青左肋痛筋急目動頭眩

此中
肝胆脈
左關浮弦

犀角

一錢

石膏

一錢

羌活

羚羊角

各七分

人參

菊花

獨活

各五分

分

黃芪

川芎

白朮

黃芩

天麻

枳殼

當歸

棗仁

此血病
不養筋

各六分

各六分

各六分

北京中醫藥大學圖書館版權所有

北京中醫藥大學圖書館版權所有

防風 白芷 各五分 炙草 二分 薑 五片

各五分 炙草 二分 薑 五片

中薦叢

牛黃 麝香 犀角 羚角 龍齒 防風 天麻 獨活
人參 沙參 茯神 升麻 炙草 薜皮 遠志 答薑

各二錢半

冰片

一硃砂 鐵粉

麥冬

各五錢

爲末麥冬湯下二錢

如面唇黃汗多口渴語澁身重好臥肌不仁肉動腹脹不食右
關脉浮緩或浮大 此中脾胃 防風 麻黃 人參 用菖炮附

桂心 黃芪 赤苓

棗仁 白朮 獨活 桑白 羚羊

各七分

角 分半 炙草

五分 薑

五片

眼下及手足青黑者不治

如鼻涕喘短氣自汗聲嘶四肢痿弱

此中肺大腸右寸脉浮牆短

五味子

如面赤汗多惡風心神亂語艱舌強口乾忪悸

此中心小腸左寸脉浮

如鼻涕喘短氣自汗聲嘶四肢痿弱

此中肺大腸右寸脉浮牆短