

傷寒醫訣串解



傷串

寒解

醫

譜



北京中医药大学图书馆版权所有

光緒三十四年春月
寶慶經元書局校刊



南京中医药大学图书馆版权所有

傷寒醫訣串解卷一

閩長樂陳念祖修園著

受業姪道著纂集

東冶林壽萱校訂

太陽篇第一

太陽爲寒水之經主一身之表

何謂太陽經症曰頭痛項強發熱惡寒是也有虛邪實邪之辨

脈緩自汗惡風爲虛邪宜桂枝湯○如八九日過經不解如瘧狀而熱身癢以其不得小汗故也宜桂枝麻黃各半湯因前此未汗不得不發其汗因日數頗久故小發其汗○如服桂枝湯大汗出後形如瘧日再發者以餘邪未盡故也宜桂枝二麻黃一湯大汗之後不得再行大汗之法而餘邪未盡不得不從汗而竭之但藥品宜輕耳



上海中醫藥大學圖書館藏

脈浮緊無汗惡寒爲實邪宜麻黃湯○如無汗煩躁者加石膏薑棗
名大青龍湯○如乾嘔而咳去杏仁加五味乾薑半夏細辛芍藥名
爲小青龍湯此一湯卽麻黃湯之加減總不出麻黃湯之範圍此三
法治表中之表也

何謂太陽腑症曰表邪不去必入於裏膀胱爲表中之裏也有蓄水
蓄水之辨

太陽症其人口渴煩躁不得眠脈浮小便不利水入卽吐爲膀胱蓄
水症宜五苓散

太陽症其人如狂小腹鞭滿小便自利脈沉爲膀胱蓄血症宜桃仁
承氣湯此二法治表中之裏也



何謂太陽變症。曰汗下失宜。從陰從陽之不一也。

不應下而下之。續得下利清穀。身疼痛。宜四逆湯以救清穀之裏。又以桂枝湯以救身疼痛之表。

病發熱頭痛脈反沉。若不瘥。身體疼痛。當救其裏。宜四逆湯。大汗大下利而脈冷者。四逆湯主之。

太陽病發汗太過。遂漏不止。其人惡風。小便難。四肢微急。難以屈伸。桂枝加附子湯主之。

太陽病發汗太過。動其營血。而衛邪反內伏。其人仍發熱。心下悸。頭眩。身嘔動。振振欲辟地者。真武湯主之。

已上言汗下太過。傷正而虛其陽。陽虛則從少陰陰化之症多。以太

陽少陰爲表裏也

陽盛於內。誤服桂枝湯。大汗出後。大煩大渴不解。脈洪大者。白虎加人參湯主之。

傷寒若吐若下後七八日不解。熱結在裏。表裏俱熱。時時惡風。大渴。舌上乾燥而煩。欲飲水數升者。白虎加人參湯主之。

傷寒不大便六七日爲裏症。頭痛發熱爲表症。外不解由於內不通也。下之裏和而表自解矣。與承氣湯。

病人煩熱汗出則解。又如瘧狀。日晡所發熱。屬陽明也。脈實者宜下之。與大承氣湯。脈虛者宜發汗。與桂枝湯。

發汗後惡寒者。虛故也。不惡寒但熱者。實也。當和胃氣。與調胃承氣。

湯

太陽病未解。脈陰陽俱停。停者沉滯不起也。陰陽者尺寸也。先振慄汗出乃解。但陽脈微者。先汗而解。但陰脈微者。下之而解。若欲下之。宜調胃承氣湯。按此脈微卽上文脈停也。○已上言汗下失宜。熱熾而傷其陰。陰傷則從陽明。陽化之症。多以太陽陽明遞相傳也。

何謂發汗利水爲治。太陽兩大門曰邪傷太陽病在寒水之經。驅其水氣以外出則爲汗。逐其水氣以下出後爲黃澁蓄水。前爲小便長。太陽爲寒水之經。邪之初傷。必須發汗。麻黃湯發皮膚之汗。桂枝湯發經絡之汗。葛根湯發肌肉之汗。小青龍湯發心下之汗。大青龍湯發其內擾胃中之陽氣而爲汗。此發汗之五法也。若汗之而

不能盡者則爲水。水在心下乾嘔而咳。宜小青龍湯發熱而煩渴。欲飲水。水入卽吐。名曰水逆。宜五苓散。汗後心下痞硬。乾噫食臭。脇下有水氣。腹中雷鳴下利者。病勢雖在腹中而病根猶在心下。宜生姜瀉心湯。此水氣在上焦。在上者汗而散之也。若妄下之後。自心上至小腹硬滿而痛不可近。水與氣所結脈遲名大結胃。宜大陷胸湯。若項亦強如柔痙之狀。宜大陷胸丸。蓋病勢連於下者。主以湯。病勢連於上者。主以丸。是也。若其結止在心下。按之始痛。脈浮滑。名小結胸。邪氣尙在脈絡。宜小陷胸湯。若無熱症。名寒實結胸。宜三物白散。若心下痞鞭滿引脇下痛。乾嘔短氣。汗出不惡寒。三焦升降之氣阻格難通。宜十棗湯。此水氣在中焦。中滿瀉之於內。



也。若頭痛項強，翕翕發熱，無汗，心下滿微痛，小便不利者，因膀胱之水不行，營衛不調，不能作汗，宜以桂枝去桂加茯苓白朮湯。是是水氣在下焦，在下者引而竭之是也。

內經云：太陽之上，寒氣治之。所謂本也。本之下，中之見也。見之下氣之標也。又曰：太陽從本從標。又曰：太陽爲開。又熱病論曰：傷寒一日巨陽受之，故頭項痛，腰脊強。

傷寒論云：太陽之爲病，脈浮，頭項強痛而惡寒。

又云：太陽病發熱，汗出，惡風，脈緩者，名爲中風。

又云：太陽中風，陽浮而陰弱，陽浮者熱自發，陰弱者汗出，當發惡寒。

漸漸惡風，翕翕發熱，鼻鳴乾嘔者，桂枝湯主之。

又云太陽病頭痛發熱身疼腰痛骨節疼痛惡風無汗而喘者麻黃湯主之。

太陽主一身之表六經中景外一層故表病俱屬太陽但有表中之表病在肌腠則有汗宜桂枝湯病在膚表則無汗宜麻黃湯兩法用之得當一劑可愈又有脈微惡寒面色反有熱色而身癢是邪欲出而未得遽出必得小汗而解宜桂枝麻黃各半湯又有服桂枝湯大汗出後形如瘧日再發是肌病兼見表病宜桂枝二麻黃一湯是二方即上兩法之佐也然二方能治肌腠膚表之病不能治經輸之病太陽之經輸在背內經云邪入於輸腰背乃強論中以項背強凡凡無汗惡風用葛根湯項背強凡凡反汗出惡風



用桂枝加葛根湯。二方亦上兩法之佐也。但兩法俱是太陽本寒之症。故方中取用辛熱之品。若太陽標熱之症。自汗症不得用桂枝湯。宜用芍藥甘草湯。以各證與桂枝證無異。唯腳攣急。是太陽之標熱。合少陰之本熱之病也。無汗症不得用麻黃湯。宜用麻杏甘膏湯。以各症與麻黃證相似。唯初起口渴發熱而無惡寒。或發汗已。身灼熱不似。論雖另別爲溫病。風溫之證。然節首冠以太陽病三字。蓋指太陽之標熱而言。明明爲一隅之舉。不讀內經不能解也。其云桂枝二越婢一湯爲標內陷於裏陰而化熱。又熱多寒少。而脈微弱。論曰無陽言無在表之陽也。論曰不可發汗言不可發太陽之表汗也。故用此湯直從裏陰而外越之也。此又

可借用爲上兩法之佐也。然太陽爲表而亦有裏。膀胱卽太陽之裏也。如太陽症發熱無汗而心下滿微痛小便不利不宜取桂枝。去桂加茯苓白朮湯。令小便利則愈。又有發汗後脈浮而微不利微熱消渴之症。又有中風發熱六七日不解而煩爲表症。當欲飲水爲裏症。論名曰表裏症。水入則吐。論名曰水逆證。兩證俱宜五苓散多飲煖水以出汗。此表中裏症之治法也。至若大青龍湯因脈浮緊身疼痛不汗出而煩躁爲麻黃證之重者而設。小青龍湯因表不解水停心下而咳噎變大青龍湯之大寒大散而爲發汗利水之劑。卽是麻黃湯之加減總不出麻黃湯之範圍。卽若桂枝去芍藥湯因桂枝症誤下脈促胸滿而設。桂枝去芍藥加附



子湯。又因前症脈不見促而見微。身復惡寒而設桂枝加附子湯。因發汗太過。遂漏不止。惡風小便難。四肢微急。難以屈伸。而因大汗以亡陽。因亡陽以脫液。取附子以固少陰之陽。固陽以止汗救液也。推之汗後病已解復煩。及桂枝症初服桂枝湯反煩不解。刺風池風府。欲再與桂枝湯則愈。其用甚廣。總不出於桂枝證。頭痛發熱汗出惡風八個字之外。須知太陽治法不外桂枝麻黃二湯。服麻黃湯之後復有再服桂枝湯之法。服桂枝湯之後並無再服麻黃湯之法。更須知太陽爲寒水之經。病本寒者較多。病標熱者較少。若標本兼病亦以熱多寒少爲欲愈。治傷寒者當知所重矣。此論太陽病以桂枝麻黃二湯爲主一線到底千古証。

家無此明晰外此亦即二湯之更進一步。非離乎二湯之外而立法也。太陽主一身最外一層。邪從外來。須要驅之使出。服上二湯。尙不能出。或留本經。或侵他經。必藉少陽之樞轉。以達太陽。而外出也。故小柴胡湯爲太陽篇之要劑。今人不知。擅改爲少陽主方。失之遠矣。故無論桂枝證。麻黃證。若值三日。九日。十五日。少陽主氣之期。必藉其樞轉而出。或又見往來寒熱。樞不轉。現出開閉不利之象。胸脇苦滿。胸乃大陽出入之部。脇爲少陽所主之樞。默默不欲食。心煩默默。必神機內鬱。而心煩喜嘔。不欲食。必胃氣不和。而喜嘔。嘔則逆氣少。疎故喜也。或涉於心而不涉於胃。則胸中煩而不嘔。或涉於陽明之燥氣。則渴。或涉於太陰之脾氣。則腹



中痛。或涉於厥陰之肝氣。則脇下痞。或涉於少陰之腎氣。則心下悸。而小便不利。或太陽藉少陽之樞轉。已有向外之勢。則不渴。身有微熱。或涉於太陰之肺氣。則咳者。皆以小柴胡為主。而隨其或然之證。加減而治之。若太陽病過經不解。先與小柴胡湯。嘔不止。心下急。鬱鬱微煩。與大柴胡湯下之。以平其胃。則愈。凡太陽篇有柴胡之方。或因其病家有從樞欲達之意。而以柴胡達之。抑因其久鬱未解之邪。一得柴胡。可以從樞達之。無非乘機利導之法。亦即麻黃桂枝二湯進一步之佐也。推而言之。太陽之氣外行於胸膈。不能外而病於內。實則爲大小陷胸湯證。虛則爲諸瀉心湯證。且太陽之氣上行而至於頭。下行而歸於腹。不能上而病於上。



從背而下結於胞室則爲桃仁承氣湯證從胸而下瘀於胞室則爲抵當湯證何莫非桂枝麻黃二湯應用不用或用之失法所致哉蓋太陽經正治法不過二十餘條而已其他則皆權變法耳施法也假使治傷寒者審其脈之或緩或緊辨其證之有汗無汗則從而汗之解之如桂枝麻黃等法則邪卻而病除矣其或合陽明或合少陽或合三陽者則從而解之清之如葛根湯治太陽陽明合病下利葛根加半夏湯治合病不下利而但嘔者黃芩湯治太陽少陽合病而自利黃芩加半夏生姜湯治合病而嘔者如白虎湯治三陽合病其云腹滿者爲陽明經熱合於前也其云身重者爲太陽經熱合於後也其云難以轉側者爲少陽經熱合於側也