

癇

嬰驚癇卽急慢之證但驚癇發時仆地作聲醒時吐沫急慢驚則不作聲不吐沫也 仁齋曰癇小兒之惡候也蓋小兒血脉不斂氣骨不聚爲風邪所觸爲乳哺失節停結癖積而得之其候神氣怫鬱瞪眼直視面目牽引口噤涎流腹肚脹膨手足搐掣似死似生或聲或啞或項背反張或腰脊強直但四體柔弱發而時醒者爲癇若一身強硬終日不醒則爲瘖證矣

陰陽一癰陽癰初作時病先身熱痰涎驚風已噉而

後發脉浮者爲陽癰乃急驚也內在六腑外在皮膚

爲易治若病先身冷不驚痰不啼呼而作脉沉者

爲陰癰乃慢驚也此病內在五藏外在骨髓劇者難

治曾陽癰者因感驚風三次發搐不與去風下痰

則再發然三次者非一日三次也或一月或一季一

發驚搐必經三度故曰三次所謂驚風三發便爲癰

卽此義也其病主身熱自汗兩目上視嚼沫齧牙手

足掣搦面色紅紫六脉浮數以百解散加五和湯水

煎疎解次下痰用水晶丹或半夏丸陰癰者因慢

驚後去痰不盡痰入心包而得四肢逆冷吐舌搖頭
口嚼白沫牙關緊閉但不甚驚搐作啼面色或白或
青脉息沉微故嬰孩寶書云睡中吐舌更搖頭正此
之謂治以固真湯加曰生湯同煎調寬氣飲和解

風驚食三癇

千金云小兒之癇有三風癇驚癇食癇

也風癇緣衣煖汗出風因入也初時先屈指如數物
乃作驚癇起於驚怖大啼乃作食癇其先不哺乳吐
而變熱後發然風癇驚癇時時有之十兒之中未有
一二凡是先寒後發熱者皆食癇也驚癇皆按圖灸
之風癇當以豬心湯食癇當下乃愈紫霜尤佳

按

此論三癇盖有三因之分風癇屬外因驚癇屬內因
食癇屬不內外因也又按全嬰方云風癇因將養失
度血氣不和或厚衣汗出腠理開舒風邪而入之其
病在肝肝主風驗其證目青面紅發搐宜驅風膏大
青膏琥珀散鎮驚藥有熱四順飲退後與利驚丸下
其痰涎驚癇因血氣盛實臟腑生熱或驚怖大啼精
神傷動外邪所入爲之其病在心心主驚驗其證忽
然叫聲發搐宜琥珀散紅龍散鎮心丸有熱四順飲
利驚丸下之不生別病也食癇其病在脾脾納食驗
其證嘔吐酸氣卽發搐此病或大便酸臭紫丸子下

之已上三證大同小異並屬陽也各目睛鮮斜手足潮搐或作豬聲發過卽差皆十生一死也

五藏癰

三因云古方有五癰五藏癰六畜癰等名證

不同難於備載別錄有五癰之證一曰馬癰作馬嘶鳴以馬屬在午手少陰君火主之故其病應於心二曰羊癰作羊叫聲以羊屬未足太陰濕土主之應乎脾三曰雞癰作雞叫聲以雞屬酉足陽明燥金主之應乎胃四曰豬癰作豬叫聲以豬屬亥手厥陰心包主之應乎右腎五曰牛癰作牛吼聲以牛屬丑手太陰濕土主之應乎肺此五癰應乎五畜應乎五藏者

也發則旋暈顛倒口眼相引目睜上握手反折拗背
脊強直食頃乃甦各隨所感施以治法 **錢**凡治五
癇皆隨臟治之每臟各一獸犬癇反折上竄犬叫肝
也羊癇目瞪吐舌羊叫心也牛癇目直視腹滿牛叫
脾也雞癇驚跳反折手縱雞叫肺也豬癇如尸吐沫
豬叫腎也五癇重者死病後甚者亦死輕者五色丸
主之 **薛**面赤目瞪吐舌齧舌心煩氣短其聲如羊
者曰心癇 面青唇青兩眼上竄手足攣掣反折其
聲如犬者曰肝癇 面黑目振吐涎沫形體如尸其
聲如猪者曰腎癇 面如枯骨目白反視驚跳反折

搖頭吐沫其聲如雞者曰肺癰 面色痿黃目直腹
滿自利四肢不收其聲如牛者曰脾癰 五癰通用
五色丸爲主仍參以各經之藥 心癰屬血虛者用
養心湯發熱飲冷爲實熱用虎睛丸發熱飲湯爲虛
熱用妙香散 肝癰者虛證用地黃丸抽搐有力爲
實邪用柴胡清肝散大便不通用瀉青丸 腎癰者
用地黃丸紫河車丸之類腎無瀉法故徑從虛治之
肺癰者屬氣虛用補肺散面色痿黃者土不能生
也用五味異功散面色赤者陰火上衝於肺也用地
黃丸 脾癰者用五味異功散若面青寫字飲食少

思用六君子加木香柴胡 按千金叙六畜癰無五
藏之分屬錢氏始分之而無馬癰一證曾氏謂初發
作羊犬聲者咽喉爲風痰所梗聲自如此其理甚明
言六畜者特強名耳故丹溪謂於經既無所據而治
法亦未見有五者之分所以不必分五也

治法

仁齋曰大槩血滯心竅邪氣在心積驚成癰通

行心經調平血脉順氣豁痰乃其要也假令小兒有
熱有痰不欲乳哺眠睡不安常常驚悸此皆發癰之

漸卽以紫霜丸導之

方見變
蒸熱

時間量與紫霜丸減其

盛氣則無驚風癰釣之患癰證方萌耳後高骨間

有青紋紛紛如線見之則爲爪破須令出血啼叫尤得氣通諸癰發不能言者蓋咽喉爲氣之道路風傷其氣以掩聲音道路之門抑亦血滯於心心竅不通所致耳南星炮爲末雄豬膽汁調和少許啖之輒效若夫錢氏五癰丸并南星散以菖蒲煎湯調下甘遂豬心湯和蘇合香丸一丸皆治癰之要藥也

劉小

兒神尚弱驚則神不守舍舍空則痰涎歸之或飲食失節脾胃有傷積爲痰飲以致痰迷心竅而作者治法當尋火尋痰而前人多用鎮墜清心之藥固可以治熱可以清痰若有頑痰膠固者此藥未易驅逐在

上者必用吐吐後方宜服此藥有痰實在裏亦須下之隨病輕重而用之也 潔如有客痰發熱而有

聲煎大黃荊芥湯下五色丸 潮熱有時積熱也桃

枝丸主之 方見積熱壯熱不退當用地骨皮散 方見潮熱下五

色丸 風熱當用防風黃芩湯下大青膏 身溫不

熱當用白虎湯加蒼朮下五色丸 薛此皆元氣不

足之證須以紫河車 即小兒胞衣丸為主而以補藥佐之

設若泛行尅伐復傷元氣則必不時舉發久而變危

多至不救 一老人生子方週歲秋初暴冷忽發搐

似驚瀾過則氣息淹淹此元氣虛弱所致與補中益

氣湯而愈。一小兒十歲。一小兒七歲。各有癰證。歲發二次。後因出痘。及飲食停滯。舉發頻數。用六君子補中益氣二湯而愈。一小兒患前證。每發吐痰困倦。半餉而甦。諸藥不應。年至十三。而頻發。用紫河車生研爛。入人參當歸末。凡桐子大。每服三五丸。日進三五服。乳化。下一月漸愈。又佐以八珍湯全愈。一小兒七歲。發驚癇。每作先君令其恣飲人乳。後發漸疎而輕。至十四歲復發。仍用人乳。不應。余令用肥厚紫河車研爛。入乳調如泥。日服二三次。至數具而愈。後常用加減八味丸而安。至二十三歲發而手足

厥冷仍用前法佐以八味丸十全大補湯而痊

通治五癰錢氏五色丸

硃砂研半兩

水銀壹分

雄黃熬壹兩

鉛參兩同水銀熬

真珠末研壹兩

右煉蜜丸如麻子大每服三四丸金銀薄荷湯下

三因六珍丹

雄黃

雌黃

朱鑽珍珠各壹兩

鉛貳兩熬成屑

水銀壹兩半

右研令極勻蜜丸桐子大每服三丸至五丸薑棗

湯下須搗二三萬杵乃可丸

風口議云先用化痰宣利胸膈開通關竅安鎮心神然後與治風癰藥服之又云先用化風丹去其風熱次服奪魂散定癰

散風丹 治小兒風癰先用此藥

牛膽南星

貳錢

羌活

獨活

防風

天麻

人參

川芎

荊芥穗

細辛

各壹錢

右爲末煉蜜爲丸如梧桐子大每服二丸用薄荷紫蘇湯不拘時送下

保安丸

治小兒諸風癰久後亦驗

五靈脂

半兩

川烏

生用

尖貳錢半

右爲末豬心血爲丸如梧桐子大每服一丸用生

薑湯化下不拘時服

獨活湯 治小兒風癰解表通裏

獨活

麻黃

去節

川芎

各壹錢

大黃

甘草

炒各半錢

右剉碎每服二錢用水一鍾生薑二片煎至四分

不拘時溫服

細辛大黃湯 治小兒風癰內熱

天麻

防風

各半兩

細辛

大黃焙

川芎各貳錢半

甘草炙壹錢半

右剉碎每服二錢入犀角少許用水一鍾煎至四

分不拘時服

牛黃丸 治小兒風癇迷悶抽掣涎潮

牛膽南星

全蝎焙去毒

蟬殼各貳錢半

防風

牛黃

白附子生

直殭蠶炒去絲嘴

天麻各壹錢半

麝香半錢

右爲末以煮棗去皮核取肉和水銀半錢研極細次入藥末和丸如菉豆大每服三五丸用荊芥生

薑煎湯送下不拘時服

化風丹 涼風化痰退熱定搐

牛膽南星 貳錢 羌活

獨活

天麻 防風

甘草

荊芥穗 人參

川芎 各壹錢

右件為末煉蜜為丸如皂子大每服一丸薄荷湯

化開服 一方有全蝎壹枚一方有細辛無甘艸

驚瀇口議先涼三焦利驚去熱安神定志平調藏府

溫化痰涎然後與治驚瀇藥服之

比金丹

人參

白茯苓

遠志 去心

山藥

辰砂

天麻

石菖蒲

川芎

甘草炙各壹分

天南星

炮貳錢生薑汁製

麝香壹字

右爲細末煉蜜爲丸皂子大每服一粒煎金銀薄

荷湯化下

一方有琥珀

貳錢

青黛

壹錢

無山藥

錢氏蛇黃丸

治驚癇因震駭恐怖叫號恍惚是也

蛇黃

真者三箇火煨醋淬

鬱金

米分一處爲末

麝香

另入壹匙

右爲末飯丸桐子大每服一二丸煎金銀磨刀水

化下

鎮驚丸

治小兒一切驚癇