

未16¹²³

442.

徽瘡祕錄
下



惟亨按經云不治其
虛何問其餘故以各
藏之虛察邪毒之聚
與否處方劑善矣然
此疾大抵下疳瘡為
始而後便毒而後黧
瘡而後筋攣骨痛爾
來變化為種種壞症
癰疽則異候蜂起不
可得量矣然標本略
同而治法稍異今強
記五藏謾說所見諸
症是反非治法良策
而醫家之舊弊也

黧瘡方法

海寧陳司成九韶甫著

夫黧瘡為患正氣不虛則邪毒不入如肝
氣虛邪毒乘之則發橫痃或成魚口甚則
筋疼瘡形如砂仁腎氣虛邪毒乘之則生
下疳或為蛙梗甚則骨痛瘡形如爛柿肺
氣虛邪毒乘之則毒聚於上不為筋疼必

生瘡如花脾氣虛邪毒乘之則毒流四肢
不作骨痛必生瘡如痘心氣虛邪毒乘之
則發大瘡形如楊梅左右相對而作楚有
一經獨虛而邪氣獨盛者有兩經三經同
虛而齊病者有見於外而滿身生瘡者有
伏於內而遍體骨痛者所以出入無常而
隱見不一也當詳究脉理按其毒氣有無
輕重應發表則當發表應攻裏則當攻裏

惟亨按病重而云云
是治病之準則也又
欲標本兼治者非獨
此症百病皆然如此
症則有劇易之分不
可必兼治者甚多臨
病之工必不可拘也

惟亨按凡黴毒傳染
之由染有毒之妓而

應疎利則當疎利應溫補則當溫補應涼

解則當涼解勿令虛實顛倒劉劑元神益

猶上匠之劉劑鑿柄也

淮南子曰聖人則制物也

病重而藥輕者但無近効病輕而藥重者

必生佗變所以治此症者須標本兼治不

可偏施以攻邪補元為主

主方

凡染有毒之妓或與患者接談稍有所

感不拘便毒疳瘡或髮際生瘡梳下薄

梳音所櫛也

以理髮疎者曰梳細者曰梳

得者固然矣與患者
接談而得者未嘗聞
之薄靨如麤者或手
足肌膚紅點如班隱
肉者其謂梅毒將發
之徵乎但未明了也

靨如麤或手足肌膚紅點如班隱肉當

音字小麥屑皮也

服此方使正氣足而邪自除也若間服

牛黃化毒丸取効甚捷

人參 黃芪 川芎 甘艸 各一錢 當

歸 忍冬花 漢防已 各一錢 升

二錢

五分

麻 防風 川山甲 各八分

鍾音章酒器也又俗謂酒危

用水二大鍾加生薑三片煎至半饑時

服渣再煎



惟亨按化毒丸配合
生生乳者非全無効
予亦嘗用之有試驗
然立許多類方者徒
訂鯁而已未可信也
於是新立改定化毒
丸一方不得已則時
宜用之約言嘗載之

牛黃化毒丹 治已上初見形症

基按近來和產者有上品亦烏金黃之類也

牛黃

四分

須用西黃色鮮黃者用之

烏金黃亦可肝黃形如筆管厚實

者功次之廣黃

味薄功不及半

琥珀

五分

血竭

製

大黃

雄黃

朱砂

須擇鏡面大塊不涉沙石者用之近

有煉丹不就轉與藥店賣者有大毒不入服藥

白蘚皮

川

山甲

乳香

木香

各取頭末一錢五分

蟬退

末

二錢

生生乳

一錢

沒藥

一錢七分

川貝

母

三錢



右各製為末用神麴末五錢打稠糊入

密也多也

稠音壽又音稠

藥擣勻丸如梧桐子大另研朱砂為衣

每早空心服十五丸每勉空腹服十丸

砂糖湯送下中病則已如餘毒未盡藥

不可徹服此丸切忌煩勞

形體

七情惱怒焦躁茶

惟亨按通篇服法皆可疑且送下之藥總未知何等義也

○養榮湯

治肝經形症益其正氣兼服甲字化毒

惟亨按五藏方及十干化毒本出於一方陳九韶強分別之乎要之其人走立方法未能盡用乎如何凡治法不簡將失其要陳氏亦蓋能知之然今新欲立言作方著書故反失其實也

惟亨按此方血虛發熱脇腸苦滿盜汗者可用

九標本同治

當歸

三錢

白芍

川芎

丹皮

遠志

龍膽州

夏枯州

各一錢

青皮

柴胡

各八分

用水二鍾煎八分服渣再煎七分服

甲字化毒丸

治肝經內外前後形症



惟亨按百日而成成則生生不息是何語勢未可解且此藥配合毒石假令性果平和未可言王道聖藥也妄誕虛高欺人太甚矣

升麻二錢

牛黃四分

生生乳

配礬石用佐藥煉百

日而成成則生生不息乃此症始末要藥但製度繁費不易修合如火候不到者服之無驗余識此方三年始得礬石煅煉得法十年間屢用屢効誠千古不易王道之聖藥也未有此藥不可依方修合議余方之不靈方法已著名醫會編因刻未竣今錄本方附後

雄黃

須擇舊坑所產透明不臭者用

之各一錢

硃砂

乳香

各一錢七分

月月紅

白殭蠶化毒丸注

川山甲

白蘚皮

各取頭末一錢五分

廣木香

熟大黃蓋下方所注之製大黃

牡丹皮

各二錢五分

惟亨按人參湯炒米湯効同者也乎其理似無據此書送下丸藥之藥通舉二品而氣味効用大違之品味未知爲何等之義以下不盡辨者皆倣之

又按逢三六九日增丸數之法不知何義且醫書所未嘗言不可爲法也

右各製爲末用神麴末五錢打稠糊入

藥擣勻丸如桐子大另研硃砂爲衣每

早空心服十三丸每飢空腹服九丸人

參湯送下炒米湯亦可病重者逢三六

九日加服三丸元弱者不必加病去藥

減如餘邪未盡藥不可徹服此丸切忌

惱怒焦躁茶酒止可用十分之三

補真湯

治腎經形症益其正氣兼服壬字化毒

丸標本同治

何首烏

川牛膝

枸杞子

各三錢

五

加皮

當歸身

石斛

各二錢

杜仲

黃栢

各一錢

用水二大鍾煎八分食前服渣再煎服

壬字化毒丸

治腎經內外前後形症



惟亨按亂髮灰一名
血餘今此書私立奇
名者不知為何義也

虎脰骨

炙酥

龜版

炙酥

川山甲

脆炙

硃

砂

各一錢
六分

月月紅

即血餘用童子頭
髮月剃者煨一錢

五

蟬退末

二錢

沒藥

乳香

白蘚

皮

雄黃

各一錢
五分

生生乳

一錢

牛黃

五

土貝母

二錢

沈香

七分
色黑味甜香者
取沈水

用

琥珀

七分

右各製為末用神麴末五錢打稠糊入

藥擣勻丸如桐子大另研硃砂為衣每

早空心服十五丸每廵空腹服十丸人

參湯送下枸杞湯亦可病去藥減如餘

邪未盡藥不可徹禁忌同前

保脾飲

治脾經形症益其正氣兼服戊字化毒

丸標本同治

金釵石斛 薏苡仁 忍冬花 各二錢
本草曰光澤如金釵股短而中實生石上者名金釵石斛

山藥 茯苓 牡丹皮 陳皮



人參 甘艸 木香 各六分

用水二大鍾加棗二枚煎八分服渣再

煎服

戊字化毒丸

治脾經內外前後形症

牛黃 四分 升麻 生生乳 各一錢 木香

硃砂 雄黃 川山甲 白鮮皮 乳

香 各一錢五分 擇滴 製大黃 二錢 宜九



蒸九曬每黃十兩當耗煮酒
五十兩入藥則瀉中有補

威靈仙

沒藥 血竭 貝母

各一錢
八分

右各製爲末用神麴末五錢打稠糊入

藥擣勻丸如桐子大另研硃砂爲衣每

早空心服十五丸每飢空腹服十丸人

參湯送下奇良湯亦可病去藥減如餘

邪未盡藥不可徹禁忌同前

益衛散

此可笑
用遼異而猥言亦可
此亨按人參奇良効



治肺經形症益其正氣兼服庚字化毒

丸標本同治

人參 貝母 白芨 百合 阿膠

桔梗 天門冬

各一錢

山藥 木香

甘艸

各七分

用水二大鍾煎八分通口服渣再煎服

一飲而盡也

庚字化毒丸

治肺經內外前後形症



圖基按細注紫背

天葵甘艸二種也

本綱砒石修治入

紫背天葵石龍芮

二味火煨用甘艸

水浸與此相類也

蟬退

淨去沙土

川山甲

炙

貝母

各二錢

鐘乳石

須擇湖廣產者長大脆白用天葵甘艸水煮一日研萬遍用之

色礪性堅

鬱金

二錢

生生乳

已上各一錢

牛黃

四分五釐

木香

月月紅

乳香

白鮮皮

雄黃

各一錢五分

硃砂

一錢七分

右各製為末用神麴末五錢打稠糊入

藥擣勻丸如桐子大另研硃砂為衣每

早空心服十五丸每魁空腹服十九丸

