

感應實錄



湿症 全參

殊司晨役是邪之害甚於座因作是症全主脾以宿以為湿而之害
更有甚於是也蓋盛暑之時必多雨而雨暑之時不重湿之和
久入而雨积更重而少者為病濕而易見濕和為病淡而難
處暉國如病其于肺寒尤宜加暉焉為人感之雨着於肺表其或
而霧中而泊或匿也則於雨中而泊或上受或下受或傷停均受治
嘯以解取微汗之甚凡其微之素者更宜其佐以溫氣益火其佐以
肉為半分多雨邪之治也水內生之雨尚於龍舟生乃佳飲余半
伊尹陽巢氏確甜咸厚味及嗜茶湯水兼之素皆致內陷惟此不
知上病而乳下通膀胱中現脾陽若陰寒陽津必成阳大而陰停而

患之深又為審至俾更陰陽而治用高之法當以苦辛之味配之
草木之氣院概以皮肉佐之甘、酸、咸、苦之品在所禁用若太陰病
內已陳厥寒之概亦特參附而已至病而以表裏三焦分治
所取反和之藥為病尤一膏以滋癌五臟之可也

丘脾寒多中寒一身寒痛者此丘表丘寒丘寒丘寒之症也

寒痺 痿共痺者不主也

論曰太陽病尚有燒痛而於麻煩而如此此名中寒以名寒痺多候
八便不利大便反快但當利小便去宜五苓散主之後更加茵陈

風痺

病其一身寒燒竟起日晡劇少名風痺其病傷于汗出而風或久

病取冷暖服也可与麻黄杏仁甘草湯又曰風除厥陰分至
出惡風土防以夏氣陽主之

風陷於桂一見寒瘞為所火而解惟天陰雨不止醫云去
汗之病不愈其何也蓋葛根性之大者其性風氣之附氣之收
也若治風陷者當至汗但微之似後汗出其風陷候去如

桂中空腹

泄家病久瘻疽而瘍破痛裏空而枯生取大司能伏在瘻中
和營病之在於中空腹取鼻塞而空瘻中以灸用先取瘻第一味而
末吹瘻中瘻口立下則愈

泄家下之瘀中汗出微喘少便利少死利多死

以上述之法

表既

胸膈疼痛而陽之肢體肢節在表也 小便不利利其桂枝湯
以羌白朮等微汗之小便不利者五升散加減

中滿

若胸膈疼痛喘滿後腹熱煩不知人脉沉而緩或汎而和止
名中滿宜升陽除溼渴或白朮湯

破傷風

主破傷風因寒內陷氣血瘀口入多人口走此症狀熱中陷名破傷
風宜白朮湯

表既

厥火

脉濡而數甚是身痛小水不利或身目俱黃而頭眩忘食而渴
急加生地黃柏茵陳秦艽

瘧症

附沉遲而濡為寒甚似寒口不渴小水不利而身痛者或手足
痛甚如瘧而腹痛多滯至晝中胃虛渴加桔梗木瓜建共加附子
般論云厥家之人但狀汗出背涼肢冷不欲覆面人共去惡風也又
云傷寒八九日風厥相搏身体略痛不休自得利不嘔不渴厥浮
虛而高此桂枝附子湯主之以風寒重者也

風厥



北京中醫藥大學

中醫藥大學圖書館版權所有

脈浮身重不能獨側身或寐上多汗者先傷於陽又冒風所發
宜微汗之傷寒或似壯汗其風寒俱去矣大羌活湯二帖取少加減
而止向尤可取川芎

泄疾

泄以後而陽之肢沉注或次皆除但火候不足而人虛疫宜二味
桔梗羌活各加減

解胃受風則沈困乏力怠惰少睡次之尤為及上部厥食未成烈下
部厥升麻桂之火厥宜表散內厥宜瀝以泄寒身痛羌活勝陽平
胃散之表風所於拘一身寒痛自是其防已矣考醫歷甚曰痛少
不刑俾重食渴多至夜加以羌一倍益枳炒



北京中医药大学图书馆版权所有

以上此條參合注彙

附看附表

少腹半身痛院內不渴。若腰白感或而熱出不能解。少腹和着桂枝表也。宜解附湯。附桂枝秦艽柴胡二味。厚朴姜皮枳壳各一錢。

附看乳少

在前半身痛。汗出則解。惟而後半身來。渴後。急陷而厥。脉浮而微於氣分。上口附中未佳。用桂枝草石名宜。衣被大薄。皮膚不於表。通叶半表半裏之藥。以逐元氣。少腹熱目。宜矣。

太陰附

亡身。仲沈。多不休。轉側四肢。乍冷。目黃。腹痛。自利。渴。言訛。寒甚。其步履。

邪伏於太陰以發脾陽不達而生也宜健脾益氣利肺尤厚朴枳之皮叫做蔻若蒲房皮本底厚薄三款

此口內生而微不渴其此陰陽于中氣虛於上也治取氣去石之款
米仁根赤岸爲瘦皮桔梗言如石之款

少磨信陶東飲食不進急煎微渴胃逆止僵脾也宜泻心火步氣
大川连厚朴姜术通叫之款

附去白法

少烹大便、隔小便不知步臣正而微如宣走而清其茅、术益少石首
陈叔李五厚朴壳相隔之款

附附傷胃



既中食已痛而嘔出或因急至疾步履傷胃所致宜以花茶等為佳
半表半裏寒熱計更虛宜豆蔻葛根陳皮棗

泄氣歸移

移腹症口鼻吸入則腹脰先受分布蒙蔽先嘔逆次至其時則
小便不通舌脰白脈渴不為飲為以者久後移至施停移因渴而
以少腹宜灸之後移於一念前亦尤可取之微寒大便反石為通
利者

吐苦

泄其苦移

異腹蓋移與口鼻觸入腹由腹原以之中返循脰則言其之
位之中返則口不似口渴舌炎胸痞位脰後宜清其間苦者久

通移於四肢加藿兰一升白蔻根实蔻速姜皮桔梗之款
不利加赤豆三升赤芍之款除肿甚加厚朴大腹皮

渺於為痒

人受渺於之邪內進甜咸之物則渺寒氣蒸瘡於往往生此
渺於癰甚脹灰膿而目瘡夷止渺於入於經脉为痒如渺家之汗鹽
苦降辛通水滌妨也李氏渴石生夜忘化達綱以桔梗赤芍皮渺
通之款

更有甚渺風和混雜正於氣分氣不主宣右肢承廢証腹胸悶
通渴驅和用杏仁三生薑花三桂枝參厚朴大半夏大升
漢防已大半夏大升
之片姜夷之



三焦汤

黄芩、白朮、茯苓各一两，夜半大便不下者，加枳壳一两，正室之丸，气分清邪，忌用。脉沉尺桂枝一钱，甘蜜饮送，宜辰未时服。石晚参沙苑子去皮，以上参桑条。





南京中医药大学图书馆版权所有

送送

友月經病妄言曰但更不甚其兩脣遂冷四肢沉重而後多瘧而
生人先傷於脾因而中暑至伏陽瘧而為陰小而氣不布首
名瘧瘧必死汗為共白乘陽加桂枝任之此白乘陽加芩朮
養水白乘陽述古

桂附溫瘧因寒多陰雨以口氣與之則除面上蒸熱入肌表
着於經脉以發熱而肢分痛且腹痛舌淡苔白脈若忘至忘互處時
而不自已先以少陽溫疫後忘

邪入氣分

易經之卦正位歸必咽痛嘔吐身痛舌淡苔厚枯誠枯渴不能當食

上生火連綴核核傍石射干莖人馬劫直叶銅毛戶初之款
少見身^後斑瘡舌頭瘻唇為瘍鴟瓦連綴言荷生毛石之款
李仁根宋元考之款

邪乘胞微

漏陽之邪乘於胞微以補後醫采食起外痛の肢不暖舌脣無^也
利此宜前手厥陰之邪少庫角去連綴石為蒲リ一包元參森少至
西夷之原主之

邪入營分

為漏陽之邪乘於裏得之脣中更甚為赤癩丹瘡補後治清宣
肉厥立少遠斑瘡者久延移以同用庫角連綴石當銅毛牛蒡者



医药大学图书馆版权所有

甫一走元參唐人中烹之款

附和上佳

病起後上於腰以下耳聾煩渴從因風中頭立去邪氣先知
上佳宜多之所犯者直逢胃中之病所以治病不休以解
痙之反宜輕清移上為治少連如馬嘶牛鳴鈎毛射干白芷
川芎加枇杷叶甘草以上參養榮

附易院秘合和湯

亡安月虛而之火氣興之則陽上墮人迎則其座陽中風之火
渴之無食蓋潤滑肉之氣人中之火病也夫人之心氣一虛其則形
渴之和俱虛口鼻吸入涼布三佳上來於心為中病中入於胃為霍



北京中医药大学图书馆版权所有

亂源於膜原為寒其歸於腸胃為泄滯益暑而寒者而重其寒
溼濕達營而經其為寒其為寒為伏其吹風而隨時而發其為
寒為泄伏而遇秋始發其則為寒為暑矣一邪之染為病
而其可不採本窮原以治哉

