

之間的劳动交換关系。”这种看法也是  
的。事实上，国营企业职工关于消  
的分配，既表現个人与国家之间的关  
表現生产者相互之間的关系，这两种  
不是对立的，而是统一的，因为国家  
是全人民的。国家，作为全体人民  
一定要定积累与消费的比例关系  
(胡鈞同志是承認的)，不仅要从全  
品中扣除馬克思所說的社会保險  
而且还要从剩下的全部消費基金中扣  
馬克思所說的“一般的不屬於生产的  
用”、“作为共同滿足需要的費用”，以  
失劳动力者設立的基金”等。不仅  
是在个人分配的过程中，怎样分配、  
形式分配等等，也涉及到个人与国  
。“列寧曾經指出，在国营企业中，  
者都受雇于国家。但是雇佣形式在  
表現的不是不同阶级之间的关系，不  
购买无产者的劳动力，而是各个工  
社会主义国家所代表的整个社会之間  
”<sup>①</sup>（着重点是引者加的）既然如此，  
为消費基金的分配只是个人与个人  
不涉及到个人与国家的关系呢？承  
金的分配包括双重关系：既包括个  
之间的关系，又包括个人与国家之  
，也就是承认在分配問題上，既要  
个人与个人之间的矛盾，又要正确  
与国家之间的矛盾。只有这样，才  
主义建設事业有利。

## 关于交換与分配的关系問題

和分配都决定于生产，首先是决定

于生产資料所有制的性質和形式。馬克思  
說：“一定的生产，决定一定的消費、分配和  
交換，以及这些不同的要素相互間的一定的  
关系。……在不同諸要素之間，存在着相互  
作用。凡是有机的整体总是这种情况。”<sup>②</sup> 所  
以，在社会主义制度下，我們既不能把交換  
和分配互相混淆起来，例如用分配去代替交  
換；也不应当把两者割裂开来，甚至对立起  
来。交換与分配是既有区别、又有联系的，而  
在商品生产和商品流通还存在的条件下，分  
配更不能离开交換而孤立地存在，在大多数  
的場合，消費基金的分配是借助于交換而最  
后实现的。

我们可以从两个方面來討論胡鈞同志对  
于交換与分配的关系問題的意見：

（一）胡鈞同志在某些地方，把交換和  
分配混淆起来了。例如他說：“假如說，職  
工向国家購買消費品是国家与个人間的商品  
交換关系，那就是說双方是等价交換。可是，假若工人所創造的价值与国家供应給他  
的消費品所包含的价值真的是相等的話，那  
就是說，他取回了他貢獻給社会的劳动的全  
部。但是，这样就成了拉薩爾式的‘不折不  
扣的劳动所得’了。这显然是不可能的，因为  
工人領回的只能是在扣除为社会基金劳动的  
部分后的劳动部分。工人只是以这部分劳  
动，到社会上領取与这个劳动量相当的那么  
多消費品。可是这样一来，工人貢獻給社会  
的与他所換回的就不能說是等价的。所以，  
这里根本談不到是等价关系。”

① 苏联“政治经济学教科書”，人民出版社 1959 年修訂第三版，第 526 頁。

② 馬克思：“政治经济学批判”，人民出版社 1955 年版，第 162 頁。

服前劑者較正醫林狀元壽世保元已集卷之六

初起以小

金丹化服

至消乃止

但成膿者

亦日服以

消其餘硬

使患不痛

自穿俟其

毒氣去盡

用保元湯

芪草宜生

忌炙加入

肉桂五分

# 頭痛

大醫院吏目金谿雲林龔廷賢子才編

男

龔定國校

脉頭痛短濶應須死浮滑風痰必易除寸口繫急或短或浮或弦皆主頭痛也夫頭者諸陽所聚之處也諸陰至頸而還惟足厥陰有絡上頭至顳項其脉浮緊弦長洪大者屬風熱痰火而致也其脉微弱虛濡者屬氣血兩虛必丹田竭而髓海空爲難治也甚有真頭痛者脈無神而腦中劈劈痛其心神煩亂爲真頭痛也旦發夕死夕發旦死蓋頭痛暴起者如鼻塞發熱惡寒乃感冒所致也其曰頭痛者有虛有火有痰厥頭痛者有偏有正蓋左邊宜小柴胡湯加川芎當歸防風羌活其偏於右邊頭痛者補中益氣湯加白芷獨活蔓荆子酒芩其眉稜處痛者一陳湯加酒炒片芩羌活薄荷其腦項痛者宜人參敗毒散加川芎藁本酒炒黃柏木瓜紅花酒炒大黃

日服收功

如孕婦患

之當問懷

胎月數儻

未滿六個

月犀黃丸

有麝香不

可服服防

墮胎當以

陽和湯瘡

之瘡後再

服三四劑

以代小金

丹杜其流

○一論一切頭痛主方不問左右偏正薪久皆効

清上蠲痛湯

當歸酒洗一錢

小川芎一錢

白芷一錢

細辛三分

羌活一錢

獨活一錢

一錢

蔓荆子五分

蒼朮米泔浸錢

麥門冬一錢

半芩錢

酒炒

菊花五分

甘草生三

分

防風錢

一錢

右剉一劑生姜煎服

一左邊病者加紅花七八分

柴胡一錢

龍膽草酒洗七分

生地黃二錢

一右邊痛者加黃芪一錢

乾葛八分

一正額上眉稜骨痛甚者食積痰壅用天麻

分半夏一錢

山楂一錢

枳實一錢

一當頭項痛者加藁本一錢

大黃一錢

酒洗

一風入腦髓而痛者加杏仁一錢

蒼耳子一錢

木瓜荆芥各五分

一氣血兩虛常有自汗加黃芪一錢

人參白芍生地黃各一錢

○一論年深日近偏正頭痛又治肝臟久虛血氣衰弱風毒之氣上攻頭痛頭

眩目暈悶仲煩熱百節酸痛脳昏曰偏頭鼻塞聲重頭背拘急皮膚癰瘍面上

遊風狀若蟲行及一切頭風兼療婦人血風攻注頭目昏痛並皆治之

追風散

防風去苦一兩

荆芥穗一兩

羌活五錢

川芎一兩

白芷五錢

白僵蚕炒二

丹

杜其流

定

疔毒治

法○

疔毒其害

最速生面

目耳鼻之

間顯而易

見生看足

衣遮之處

隱而不知

知覺早者

晨醫夕癆

遲者枉死

甚多故婦

天麻五錢  
石膏兩  
草烏尖五錢  
雄黃二錢  
乳香二錢  
全蝎尾五錢  
地龍錢  
川烏尖一兩  
天南星兩  
甘草炙一兩

白附子  
僵蠅去毒  
白附子  
地龍錢  
全蝎尾五錢  
天南星泡  
甘草炙一兩

白附子  
僵蠅去毒  
白附子  
地龍錢  
全蝎尾五錢  
天南星泡  
甘草炙一兩

右爲細末每服五分茶湯調食後臨臥服清頭目利咽膈消風化痰

一論痰厥頭痛其症眼黑頭旋惡心煩悶氣短促上喘無力以言心神顛倒目不敢開如在風雲中頭苦痛如裂身重如山四肢厥冷不得安臥此乃胃氣虛損停痰而致也

半夏白术天麻湯

黃柏酒洗一

乾姜炒二

澤瀉

白茯苓去皮

蜜炒

天麻

人參

蒼朮米泔浸炒各三分半

白术去芦

半夏姜炒

陳皮

神曲炒各七分半

右剉生姜三片水煎熟服可一劑而愈

麥芽炒各七分半

○一論頭痛偏左者屬血虛火盛也

加味四物湯

當歸

生地黃

川芎

黃柏酒炒

蔓荆子

知母酒炒

黃芩酒炒

黃連酒炒

梔子炒

黃柏各等分

右剉一劑水煎溫服○風盛加防風

荆芥

○一論頭痛偏右者屬痰與氣虛也

黃芪益氣湯

黃芪蜜炙

人參一兩

白术去芦

陳皮

半夏姜汁

當歸酒洗

桂枝

當歸酒洗

女而患暗

疗者誤認

傷寒致毒

攻心走黃

不救如頭

面唇鼻脣

臂手足等

處生一皰

或紫紅或

黃黑者疔

也初起刺

擠惡血見

好血而止

取拔疔散

藁本

川芎

升麻

甘草炙

分各三

黃柏酒炒

細辛各三

右剉一劑姜

棗煎服

調中益氣湯

黃芪蜜炒人參

甘草炙

各六分

蒼朮米泔浸炒

川芎各六分

升麻

蔓荆子

柴胡

陳皮各三分

黃柏酒炒

當歸各六分

細辛二分

右剉水煎

溫服

○一論偏正頭風一切頭痛諸風眩暉頭目昏重

都梁丸

香白芷切碎晒乾爲細末煉蜜爲丸如彈子大每服一丸荆芥點臘茶細

○一論眉稜骨痛者風熱并痰也

選奇湯

羌活

防風各一錢

酒片芩

二錢五分冬月不

半夏

姜汁炒

二錢

甘草生一錢夏月炙

右剉一劑水煎食後服

○一論雷頭風者頭痛而起核塊也頭面疙瘩憎惡發熱拘急狀如傷寒

升麻湯

升麻

蒼朮米泔浸薄荷葉各等分

右剉水煎服

用六君子加當歸黃芪木香炮姜而瘥

插入以膏

掩之次日

○一論頸項強急筋痛不能回顧者

烏藥順氣散加羌活獨活木瓜

疔毒化膿

○一治偏正頭痛頭風

羌活 白芷 紅辛 川芎 蔓荆子 薄荷

而癰○

紅絲疔  
治法○

防風 甘草各等分 右爲細末每服二三茶匙白湯調下

○一論頭痛發熱眩暉喘急痰涎壅盛小便頻數口乾引飲遍舌生刺縮飲如

荔枝然下唇黑裂面目俱赤煩燥不寐或時喉間如烟火上衝急飲涼茶少

解已至于死脉洪大而無倫且有力捫其身烙手此腎經虛火遊行于外投以十全大補加山茱澤瀉牡丹山藥麥門五味附子一鍾熟睡良久脉症略減三四再以八味丸服之諸症悉過後畏冷物而痊

○一論頭風腫痛偏正不拘

用艾搘爛鋪紙上將快捲成筒次將黃蠟熔化灌入筒內以滿爲度如左

○一論半邊頭痛  
紅絲始末  
經療要在

○一論半邊頭痛  
邊痛將藥燒烟入右耳右薰左卽安  
兩頭刺破

毒隨血出

祛痛膏

而痛遲則

毒入腸胃

不救凡屬

疔毒宜服

奪命湯○

刀鍼疔

## 鬚髮

治法○

醫者所論人鬚髮眉雖皆毛類而所主五臟各異故有老而鬚白眉髮不白者

疔形潤如

韭菜長有

寸餘肉色

或髮白而鬚眉不白者臟氣有所偏故也大率髮屬於心稟火氣故上生鬚  
屬於腎稟水氣故下生眉屬於肝故側生男子腎氣外行上爲鬚下爲勢故

女子宮人無勢則亦無鬚而眉髮無異於男子則知不屬腎也明矣

紫黑者名婦人無鬚無血氣乎岐伯曰今婦人之生有餘氣氣不足于血衝任之脉不榮

曰刀鍼疔

唇口故鬚不生

愚行鍼刺

宦者其鬚獨去其故何也曰宦者傷其宗筋血泄不復皮膚故鬚不生

以至繫三天宦未嘗被傷其鬚不生其故何也曰天宦稟賦不足宗筋不成故鬚不生

防風

羌活

藁本

細辛

菊花各五分

南星

草烏

白芷各一錢

右爲細末用連鬚葱一把洗淨同前藥搗成膏銅鍋頓熱量痛大小以油紙  
攤藥貼痛處周圍以生麵糊封之再用乾帕包定其痛卽止○一方加菊花  
獨活各一錢五分草烏一錢麝香一分

錢葱白七

根共搗爛  
作七塊葱

湯逐塊送

下蓋汗如

無汗再飲

葱湯催之

汗出爲度

取爛雞矢

塗患立癒

心腑致命

天下第一烏鬚方 閣老高中玄傳

五倍子一斤擇整箇者箇箇搗破去蟲土擇粗者如黃豆大次者如赤豆大又次者如菜豆大分三樣入新鍋內炒加栗殼色以青濕布包之以腳踏成餅晒乾爲末錫罐盛貯築實封口勿令泄氣聽用

紅銅末半斤淘去皮土見清水令乾入鉄鍋內炒大熱傾入釀醋少半碗拌勻濕透再炒入醋七次研爲末羅過以綿紙另包聽用

白礬

四兩爲末另包

皂礬

四兩爲末另包

白芨

四兩切片焙乾

研爲細末紙包

右每遇染鬚時量鬚多少用藥加五倍子九錢銅末一錢八分白礬白芨皂礬各九分再加食鹽九分共八于碗內再研極細八小銅灼內以濃茶滷調如稀糊放木炭火上徐徐熬之不住手攪勻熬成稠糊爲度預先以肥皂水洗淨鬚髮待乾以抿子挑藥乘熱塗鬚髮上用油紙兜住外用烏帕包裏至頂解衣護枕而睡至半夜驗藥將乾用手搜去殘藥如乾甚用茶鹵濕潤去藥至天明洗面略洗鬚髮如面上有黑處以指蘸香酒塗摩卽用軟紙擦去油跡染後仍以香油少許潤之卽明黑可觀先一月染三四次後半月染○

治○

疔毒發腫

神昏謂走

黃如在將

昏之間急

取回疔散

二錢曰湯

送服少刻

大痛痛則

許救毒化

黃水痛止

命活○

諸瘡治

法○

一次永不露白

野狐倒上樹

尚書劉三川傳

黑鉛四兩

汞二錢

右先將鉛化成汁後入汞凝成葉子剪成錢樣外用鉄絲穿作二三串聽用  
冉用大磁礮一箇八無益好醋三碗將鉛錢入礮內懸於醋上離醋二指內  
泡卷柏二箇鴨嘴膽礮四錢用磁碟封口蓋之再用黃泥封固夏月日中晒  
七日冬月糠火煨七日出礮底摘一孔出醋不用揭起碟來掃下藥霜來用  
脂皮包住收之臨用藥時將鬚髮用溫水洗淨就濕再用脂皮包手脂拈藥  
霜粘在鬚髮上自然黑到根神效切忌香肥皂水洗

烏鬚方

刺史周如梅傳

宮粉

一兩二錢五分

白礮

三錢

白石灰

二錢

樟腦

一分

麝香

一分

輕粉

三分

百草霜

八分

水銀

一錢先將鉛一錢化開八水銀結成砂子

右爲未用鹹水和熬漆塗鬚髮上燒牛炷香卽洗去

青雲獨步丹

烏鬚黑髮延年益壽

赤白何首烏

共一斤用黑豆二升半煮汁浸何首烏一晝夜去汁右將豆拌首烏木甑內蒸浸五次

當歸身

酒洗三兩

大瘡疥之

生木由於

濕故南方

赤茯苓

半斤月牛乳  
浸過煮乾

白茯苓

半斤用人乳  
浸過煮乾

補骨脂

四兩酒炒  
甘枸杞

酒浸入砂仁三兩

免絲子

半斤酒  
搗餅焙乾

懷牛膝

甘草水  
泡四兩

懷生地黃

錢同蒸乾爲末

卑下之地  
患者最多

諸書皆言

造酒烏鬚方

本府麥推府傳

濕熱所致

方中皆用

生地涼血

右忌鐵器晒乾爲末

煉蜜爲丸如梧籽

每服三十丸空心酒下午間薑湯下

右忌鐵器晒乾爲末

煉蜜爲丸如梧籽

每服三十丸空心酒下午間薑湯下

臨臥鹽湯下忌三白

懷生地黃

四兩大當歸

二兩

小紅棗肉

三兩淨

赤白何首烏

各一斤煮水製過  
地黃勿犯鐵器

真生姜汁

四兩麥門冬

三兩去心

胡桃肉

三兩淨

甘枸杞

二兩蓮肉

三兩

蓮肉

三兩土蜜

三兩

土蜜

三兩

右先用酒洗淨地黃將何首烏水去渣入地黃煮候乾再用薑汁水煨乾爲

度便將地黃搗爛以一官斗糯米水十二斤作酒麴藥如常候酒漿來方以

水調勻地黃入酒糟內過二日去糟將前藥切片入絹袋中懸酒罈內笋殼

包封切令出氣放罈內煮三炷香爲度後以酒罈埋土中三宿去

火毒任意飲三五杯

雖癒致毒

水調勻地黃入酒糟內過二日去糟將前藥切片入絹袋中懸酒罈內笋殼

包封切令出氣放罈內煮三炷香爲度後以酒罈埋土中三宿去

火毒任意飲三五杯

包封切令出氣放罈內煮三炷香爲度後以酒罈埋土中三宿去

火毒任意飲三五杯

包封切令出氣放罈內煮三炷香爲度後以酒罈埋土中三宿去

火毒任意飲三五杯

包封切令出氣放罈內煮三炷香爲度後以酒罈埋土中三宿去

火毒任意飲三五杯

歸腹定成

猪鬃刺鼻龜即

尿

猪鬃刺鼻龜即

尿

猪鬃刺鼻龜即

尿

猪鬃刺鼻龜即

尿

烏鬚秘方

用馬蝗蟇尋起數條帛要用時將雞血或豬血將馬蝗入血內令食食針出血同龜尿同研墨濃塗鬚髮上可烏一月乃烏鬚第一方也

烏鬚神妙方

本府蘇通府傳

五倍子炒黑爲末一錢

白芨未入分三分

食鹽三分

柯子未三分

沒石子未三分

白礬三分

黑礬三分

細辛未三分

右爲細末熱茶調稀重湯煮入黑礬再煮面上生光搽鬚上油帛裹立黑烏鬚狐狸倒上樹 周賓票傳自蜀中得來

山茄要極黑者收約有八九升來去蒂以夏布包洗去漿水將山茄扭自然汁四五碗入上好好墨四五錢打碎黑礬四五錢二味俱入白茄汁內貯新瓦罐中每用將竹片蘸梨汁于鬚髮上自尾倒上切莫粘肉上則洗不去了○一論烏鬚生髮良方 蒲公英摘淨切四兩血餘洗淨四兩青鹽研四兩

右用磁罐一箇盛蒲公英一層餘血一層青鹽一層鹽泥封固淹春秋五百夏三日冬七日桑柴火煅令烟盡爲度候令取出研爲末每服二錢侵晨酒

風猴癥

濕風頑癬

蛀髮癬小

兒疳肥瘍

蠟梨火珠

凍瘡麻瘡

爛腮漆瘡

諸證後列

之方皆瘡

諸證○

瘡鼓治

法○

其證當以

紅棗丸治

## 面病

難經云人面獨能耐寒者何也蓋人頭者諸陽之會也諸陰脈皆至頸項中而還獨諸陽脈皆上至頭而足陽明胃之經起鼻交額中入齒中俠口環唇倚頰車上耳前過客主人穴其或胃中風熱或風熱乘之令人面腫或面鼻色紫風刺癰疹或面熱面寒隨其經症而治之

○一論面寒者陽明經虛寒也

升麻附子湯

升麻

葛根

白芷

黃芪各七分

大附子炮七分

人參

草豆蔻各五分

益智仁三分

炙草五分

右剉一劑連鬚葱白二根水煎溫服

○一論面熱者陽明經風熱也

○一儒者因飲食勞役及惱怒鬚髮脫落余以爲勞傷精血陰火上炎所致用補中益氣加麥門冬五味又六味地黃丸加五味鬚髮頓生如故

○一男子年二十頂髮脱落盡用六味地黃丸不數日髮生寸許兩月復舊一史萬湖云有男女偶合眉髮脱落無藥調治至後數月復生

之儻遇瘡

鼓甚不

及待藥與

服菖蒲大

○一論面生瘡者上焦火也

清上防風湯

防風一錢

荆芥五分

連翹八分

山梔五分

黃連五分

薄荷五分

黃芩酒炒七分

川芎七分

白芷八分

桔梗八分

枳殼五分

甘草三分

右剉一劑水煎入竹瀝同服

○一論面唇紫黑乃陽明經不足也

升麻白芷湯

升麻一錢

防風一錢

白芷各一錢

芍藥一錢

蒼朮各三分

黃芪三分

人參七分

葛根一錢半

甘草四分

右剉一劑

姜棗煎服

宜早晚前取

天氣上升於中

於面也

○一論面生粉刺者肺火也

於前而鼓

清肺飲

蓮翹

川芎一錢

白芷一錢

黃連一錢

黃芩一錢

荆芥一錢

桑皮一錢

苦參一錢

全消仍以

山梔

貝母

甘草一錢

右剉水煎臥服

瘡治至癒

○一點瘧方

以巴豆七個右灰等分爲末以鹹水搜在盞內藏糯米於巴

升麻黃連湯

升麻葛根各一錢

白芍七分

川芎四分

薄荷三分

葛根五分

白芍二分

甘草五分

黃連酒洗五分

荆芥三分

蒼朮入分半

酒芩六分

犀角四分

白芷二分

甘草一分

甘草五分

大瘡鼓脰

證也至瘡

則易癒○

楊梅結

○出刺青方

馬肉

不拘多少儘令蒼蠅作壞生蛆出晒乾爲末以針撥

煉蓼灰各一錢

右爲末水調寫字上有泥起拂去再上

礦石灰

紫蓼灰各一錢

人參五錢加白草灰

加百草灰

○出刺青方

動青處擦藥其青自出

○

○孤破面皮

用生薑自然汁調輕粉擦患處更無痕迹

楊梅瘡又

○洗面方

每早以漱口水吐在手掌中洗面久久白光潤粉刺自

謂棉花廣

○治赤紅爛臉

水銀一錢柏油蠟一錢

共搗塗之

豆廣瘡因

○治面上瘡鼻酒刺

雄黃一錢硫黃五分鉛粉一錢

形而名然

右其爲未乳汁調塗晚上敷次日溫水洗之如此三上去矣

其感毒無

二以化毒

## 耳病

爲貴熏罨

脉兩寸脉浮洪上魚爲溢兩尺脉短而微或大而數皆屬滯虛法當補陰抑陽爲忌罨定

左寸洪數心火上炎兩尺脉洪者或數者相火上炎其人必遺精夢與鬼

復發難治

初發以三

黃丸每日

五鼓取四

錢熱陳酒

送服醉蓋

取汗或以

湯肝湯每

日早晚輪

服音書所

載升藥爲

凡雄黃爲

衣粥飲送

眼或點藥

交兩耳蟬鳴或聲

耳者屬腎而開竅於少陽之部通會於手三陽之間次離交則聚氣以司聰以善聽也開於腎而貫於腦內經曰五臟不和則九竅不通其耳鳴耳痒耳聾者皆屬腎虛水不上涼清氣上升所致也從補益門治之其壯年及小兒耳腫耳痛耳停乃二陽署熱壅遏所致也宜升陽散火湯加黃柏知母晚間兼服金花丸可矣

○一論思慮煩心而神散精脫於下則真陰不上泥丸而氣不聚故耳鳴耳腫不聽及耳內痒

安神復元湯

黃芪

蜜炒錢五分

人參

錢五分

當歸

酒先錢五分

柴胡

錢五分

升麻

五分酒炒

黃連

酒炒錢一錢

知母

一錢

黃芩

酒炒一錢

黃柏

酒炒一錢

知母

一錢

防風

一錢

莫荊子

七錢麥門冬

小草

五分一錢

茯神

一錢

酸棗仁

炒錢五分

小草

一錢

甘草

五分

甘枸杞子

五分一錢

右剉一劑圓眼肉三枚水煎服

○一論勞聾氣聲風聾虛聾毒聾久聾耳鳴勞聾者勞火鼓其聽戶也氣聾者

條一根口  
含令水之  
法萬不可

因此不費

于金補腎丸

當歸 酒洗

白芍 酒炒 懷生地黃

酒蒸 黃芪 蜜炒 人參

乾薑

藥資害人

山茱萸

酒蒸

白茯神 去核 神聚

免絲子 酒製

大附子 炙去皮臍

牡丹皮

蛇床子

性命自召

肉蓯蓉

巴戟 去心

遠志 去心

桂心

細辛

甘草 略二兩

石斛

天誅如有

石菖蒲 一兩

防風 一兩

羊腎 二枚

共二十三味

西園公加山藥

二兩殊効

因服升藥

右爲細末煉蜜爲丸如梧子大每服十五丸加至三四十九鹽湯下

○一論虛火上升痰氣鬱於耳中或閉或鳴痰火熾盛或憂鬱痞滿

咽喚不利

煩燥不眠

竝藥條薰

通明利氣湯

奄復發在

五日之內

蒼朮 益水炒

白朮 去芦炒

撫芎 八分

陳皮 益水浸

香附 二錢

童便炒

日服三黃

黃柏 酒炒

二錢

梔子仁 炒

一錢

貝母 三錢

姜汁

浸一錢

丸再取忍

木香 酒洗

二錢

五分

檳榔 一錢

粉草 約四分

黃芩 一錢半

酒浸

冬藤牛蒡

右剉二劑

生薑水煎

人竹瀝同服

經氣滯塞於聽戶也風聾者耳熱閉其聽戶也虛聾者氣血虛耗而神不用  
也毒聾者膿血壅礙妨於聽戶也久聾者病非一日邪氣壅塞也凡是聾者  
勢必耳鳴故總繫其耳鳴也

草紫花地

○一論陰虛水動而耳聾或鳴者  
丁白甘藥

六味地黃丸見補益依本方加黃柏知母石菖蒲遠志去心廩驗

煎湯當茶

○一治耳鳴主方

黃連

黃芩

梔子

當歸

陳皮

時飲如漬

膽星各一錢

香附

八分龍膽草

玄參

七分青黛

木香

各五分乾薑

炒黑三分

以渣煎湯

右剉一劑

生薑三片

煎七分入玄明粉三分痰盛加

五分食後服如作丸子

加薑薑

五分麝香

二分爲末神麴糊爲丸每服五十丸淡姜湯送下如腎虛

日洗兩度

接服聖靈

丹可祛毒

○一論耳主風者耳腫作痛牙關緊急乍寒乍熱飲食不下是也

畫色轉紅射干散

苦竹吳紹源傳

升麻桔梗射干昆布

運翹甘草

右剉水煎熟服汗出立愈并治面腫牙痛咽喉痛神效

膏貼收功

○一治耳鳴如流水聲耳痒及風聲不治久成聾

膏貼收功

如生烏頭一味掘得乘濕削如棗核大塞耳且易夜易不三日愈

燭笑等毒

○一論塞藥治耳聾殊効

石菖蒲一寸去壳巴豆一个去足屑全蝎

總不離此

右爲未葱涎爲丸如棗核大綿裹塞耳即通

有爲下疳蠟

一論塞藥治耳聾殊効

如生烏頭一味掘得乘濕削如棗核大塞耳且易夜易不三日愈