

书店标

售
价

1855



太陰之為病。腹滿而吐。食不下。自利。益甚。時腹自滿。痛。若下之。必胸脅下結硬。

太陰為濕土。濕土之下。寒水承之。故其臟之為體。常濕。常寒。而其性之所喜。在溫。在燥也。腹滿而吐。食不下。濕氣得邪而上升之。應自利。腹痛。寒氣得邪而下迫之。應此。當如下文四條所云。四逆輩以溫之。乃因腹滿痛。而用寒下之藥。則誤矣。結硬者。兼結胸痞硬而言。蓋謂前症具而脈浮。且有表症。如三條所云。宜桂枝湯者。而誤下之。則表邪內陷。而為結胸。前症具而無表邪。如四條所云。宜四逆輩者。而誤下之。則裏陰上乘。而為痞硬矣。然長沙于太陰條中。偏重痞硬。一邊結胸。不過帶說耳。蓋邪至太陰。表邪衰薄。結胸原少。而脾家最重。真陽誤下而傷之。則痞硬。一邊十居八九。故曰。臟有寒。又曰。當溫之。又曰。大寔痛者。不過于桂枝湯內加大黃。又曰。大黃宜減。其意可知矣。喻氏單言表陷之結胸。而反遺上乘之痞硬漏。

脉至脉去者
即來微去瀋
之謂也

二 太陰中風四肢煩疼陽微陰瀋而長者為欲愈

太陰之經行手足之內膝上側故四肢煩疼者太陰之表症也陽指脉之至者而言陰指脉之去者而言太陰之真陽原微大即為外邪微則其本脉也太陰之本性惡濕滑當見積利瀋則其善脉也于未微去瀋之中更見招下而長則是其陽氣調達充暢故為欲愈但四肢煩疼為太陰之表症意者從長脉中知其能透為微汗乎

三 太陰病脉浮者可發汗宜桂枝湯

五經隧道俱出而外附于太陽之皮部故皆能發熱皆有汗症五經津液俱入而內資于陽明之胃腑故皆有胃實皆有下症所謂皆有汗症者太陽姑無論陽明之葛根湯症少陽之小柴胡湯症太陰之借用桂枝湯症少陰之麻黃附子細辛湯症厥陰之當歸四逆湯症是也所謂皆有下症者陽明姑無論太陽

傷者作虛。
其人二不。
衍文。

四
自利不渴者屬太陰以其臟有寒故也。當溫之宜服四逆輩。

之大陷胸湯症。少陽之大柴胡湯症。太陰之桂枝加大黃湯症。少陰厥陰之大承氣湯症是也。此條言太陰脉浮明。浮為太陰之浮。非浮出太陽之謂。見太陰脉浮之表症。亦可以桂枝湯解太陰之表耳。喻氏謂邪還于表。乃用解肌之法。且引脉浮者與麻黃湯句。謂是此條互文。是認為浮出太陽則誤。人甚笑之。太陰脾臟其症有寒熱二者。與少厥二陰之傳經直中頗同。以三臟俱重。真陽故也。真陽寔者邪從化熱。傳未則燥其濕。反其寒而不利。若兼小便不利則成發黃一症。故後文有大寔痛。設當行二條。真陽傷者直中陰邪則脾陽幾絕。而其人濕與寒俱不能運動。濕寒故不渴不能運動故自利也。此宜四逆輩以溫之矣。曰輩者兼理中附子等湯而言。正欲酌量于濕氣寒氣之輕重而增減薑附茯苓之義。喻註將兩症混成一塊。而謂太陰濕土熱邪入而蒸動其濕。

五

故不渴而多發黃。熱邪入而消耗其水。故口渴而多煩躁。是言此條之自利不渴。係傳經之熱邪入之也。不知太少二陰凡屬傳經熱邪自利之症。少故當溫之法。亦少。直中寒邪自利之症。多故當溫之法。亦多。試問熱邪入而蒸動其濕。將成黃症者。猶能自利乎。猶可溫之以四逆輩乎。舊註為是。喻氏之說有病傷寒脈浮而緩。手足自溫者。繫在太陰。太陰當發身黃。若小便自利者。不能發黃。至七八日。雖暴煩下利。日十餘行。必自止。以脾家實。腐穢當去故也。

此係脾陽自足而傳經之化熱入太陰之症也。太陽之手足壯熱。陽明之手足熱而不壯。少陽之手足或冷或熱。少陰之手足直中者寒。傳經者手足心熱。厥陰之手足逆冷。惟太陰之手足溫。今脈見浮緩而手足溫。則知緩為太陰之本脈。而緩而浮者為太陰之表熱也。故曰繫在太陰。太陰本為濕土。邪熱乘之。濕熱相搏。蒸出脾土之氣。發于周身。故當黃。若小便利。則濕熱從溺而出。故不發。

桂枝加芍藥湯

于桂枝湯方內更加芍藥三兩。連前共六兩。餘依桂枝湯法。

七

大實痛者。桂枝加大黃湯主之。

此太陰之表未除而又見實痛之裏症者也。表未除故用桂枝湯以解太陰之表裏實痛。表未除而又見實痛之裏症者也。表未除故用桂枝湯以解太陰之表裏實痛。故隨便加大黃以清其結熱耳。或曰諸經寔痛之症俱用大承。今太陰條中既曰大實痛。乃但加大黃于桂枝湯內。何也。答曰此正長沙之神妙處。蓋脾為濕土。下承寒水。故其性喜溫燥而易動。今于辛甘而調達脾氣之桂枝湯內畧加苦寒之大黃。是于所喜之中薄投所畏。故用瀉而不傷。藥輕而功倍矣。

桂枝加大黃湯

于桂枝湯方內加芍藥三兩。加大黃一兩。以水七升。煮三升。去滓。溫服一升。日三



滿者陽不御陰痛者
陰結鬱陽

六
本太陽

黃此種症候本不該下利。況至七八日之久。寒氣化熱。尤不當下利。今暴煩而日十餘行。則知暴煩為脾中之陽氣勝而自振。而日十餘行以邪負而腐穢當去。故知自止。

此太陽病。鑿反下之。因而腹滿。時痛者。屬太陰也。桂枝加芍藥湯主之。此太陽誤下而跳。傳太陰之症也。蓋太陽之胸與陽明之心下。旁與少陽之脇。再下與太陰之腹。俱有病。機相引之路。其人脾臟之真陽比陽明少陽為較虛。故太陽下陷之邪。不從胸而傳陽明之心下。及少陽之脇。而直傳太陰之腹。此滿而時痛者。脾虛而寒氣下擊之應。故曰屬太陰。主桂枝加芍藥湯者。因邪從太陽陷入。故主桂枝加芍藥者。太陰位低而在內。故加酸斂之品。引桂甘薑。辛甘之性。下入脾臟。而調暢之。則脾陽發而腹之滿痛可除。抑亦資其自汗以解太陰之表熱耳。



桂枝加芍藥湯

于桂枝湯方內更加芍藥三兩。連前共六兩。餘依桂枝湯法。

七
大實痛者。桂枝加大黃湯主之。

此太陰之表未除。而又見實痛之裏症者也。表未除。故用桂枝湯以解太陰之表。裏實痛。故隨便加大黃以清其結熱耳。或曰。諸經寔痛之症。俱用大承。今太陰條中。既曰大實痛。乃但加大黃于桂枝湯內。何也。答曰。此正長沙之神妙處。蓋脾為濕土。下承寒水。故其性喜溫燥而易動。今于辛甘而調達脾氣之桂枝湯內。畧加苦寒之大黃。是于所喜之中。薄投所畏。故用瀉而不傷。藥輕而功倍矣。

桂枝加大黃湯

于桂枝湯方內加芍藥三兩。加大黃一兩。以水七升。煮三升。去滓。溫服一升。日三

八
也。太陰服。

太陰為病。脉弱。其人續自便利。設當行大黃芍藥者。宜減之。以其人胃氣弱。易動故也。

行。當作用。與下文連讀自見。行大黃芍藥。即上條桂枝加大黃湯是也。言太陰用下。原當浸軟。若脉弱便利者。尤當減少。蓋一則防夫脾為濕土。再則減于脉弱不勝也。

九
太陰病欲解時。從亥至丑上。

亥陰極。子二陽生。至丑則為臨。臨大也。故解。非為解於亥也。識。



傷寒論尚論篇辨似

漢長沙太守張機仲景著

少陰經

總說

江西喻昌嘉言論列編次
古越高學山漢峙校正發明
古越陳錫朋勉亭重校補註

丙小腸心

按靈素等書少陰一經有真陽元陰二氣真陽者從父母媾精之際一點溫和元氣漸鼓漸長于是積溫和而成丙丁之妙遂從命門上透溫胃貯胸其餘氣由太陽而包裹周身之表所謂衛氣是也此是少陰正氣又其私下另開一徑從本臟外出太陽所管之皮部由足內廉之後側以自通于表耳元陰者與真陽同稟于父精而為潮潤之氣靜守本臟以固戀其陽且與四臟六腑之津液隨真陽之熏蒸而貫通于其會者也其隧道自足小指斜走足心歷內踝後跟上內廉



下側貫脊屬腎。又內行貫肝膈絡心肺。循喉舌之本。故正虛則見逆冷。急愠足軟。蹇而背惡寒。并積飲洩利躁汗等症。邪寔則見脛痠熱痛煩渴微厥咽痛咽瘡并膿血等症也。其主周身之骨。故骨痠骨痛見焉。其署為腰。故正虛則如脫。邪寔則如石矣。其本鄉為腎。陽病則不能自強。故喜寐。又與肝為子母。故能直傳其臟也。其人黑色而粗理者。腎大。則善腰痛。易傷以邪。耳高者。腎高。則常苦背脊痛。目後陷者。腎下。則腰尻痛。而為狐疝耳薄不堅者。腎脆。則苦病消痺而易傷。其見于面部者。顴下三指。面中央復外二指。經曰。腎病者。顴與顏俱黑。又其色如烏羽者。吉。又曰。生于腎者。如以縞裹紫。又曰。黑如重漆。不欲如地蒼天。抵足少陰氣絕。則大骨枯槁。肉軟却齒長而垢。面黑而髮無澤者。不治。戊篤已死。其音羽。忌見宮。

少陰前篇

寒者改作邪

尚論分少陰為前後篇。而謂凡直中少陰為宜溫之症者。列前篇。傳經熱邪。凡可汗下合正治之法者。列後篇。識力最高。但其位置論條既多互失。且于宜溫及宜汗下之症未能暢發。為可惜耳。夫凡屬陰寒皆直中三陰。凡屬風寒皆太陽。傳變詳已別見。至其所以宜溫所以宜汗下之理。當再辨之以補所未逮也。蓋風邪從太陽。歷陽明少陽而傳入陰分者。以風寒既屬陽邪。且其氣挾陽經之化。遂變成大熱。若自足後。臍之後側等隧道由本經之私路而入臟。則陰寒既屬陰邪。且乘本經陰臟之氣。而為寒凝。互矣。陰寒之滲肌切骨。有驅陽絕焰之勢。不用大辛大熱助火之陽光以消慘毒。則真陽熄于陰寒而死耳。化熱之亢烈燔灼有沸河乾海之勢。不用甘涼苦寒壯水之源頭以當消燄。則元陰絕于陽熱而死耳。知此則不特喻氏分篇之是處可見。而兩篇中互失之條亦昭著矣。

沈下存一考子

表陽界虛邪直入內安
有營熱臟陽克振邪自
外趨何至脉沈

少陰病始得之反發熱脉沉者麻黃附子細辛湯主之

發熱者足少陰及手之隧道外見于手足內臟之後側而與表氣相依也脉沉
寒邪入內之影此言直中少陰而初得之病反發熱者是邪氣尚留少陰之表
雖脉見沉而有入臟之象便可因發熱以攻表因脉沉以救裏也主本湯者少
陰病難得是發熱發熱是其少陰之表陽不虛也又少陰病所忌者脉沉脉沉
是其少陰之臟陽不振也表陽不虛故可用麻黃以解表臟陽不振故必用附
子以溫裏解表者按其根而平其內入之勢溫裏者益其力而助其外禦之威
然後以細香辛利之品半以開提腎陽半以宣暢經表真剝撫兼行恩威並濟
之妙劑也

麻黃附子細辛湯

麻黃二兩去細辛二兩附子一枚炮去皮右三味以水一斗先煮麻黃減二升去
節甘熱

百下加一諸子

二 少陰病得之一二日口中和其背惡寒者當灸之附子湯主之

上沫內藥煮取三升去滓溫服一升日三服
此條之症初看似覺輕何以用此重劑乃至加附二枚而又佐以參苓朮芍
耶不知長沙巨眼卓識全從口和背寒看入微妙耳蓋背上惡寒有二一則內
有熱邪陰氣偏出陽分故所惡者為皮膚拘緊之寒二則陽氣幾絕背為胸之
腑故其所惡者從腔內陰沁而出者也長沙之意謂口不和而背惡寒則為內
熱之應今口中和則所惡者為真陽幾絕之寒且口和則能飲食背惡寒而真
陽幾絕則不能化食運飲寒邪搏之必成十三條下利不止十四條水氣為逆
等症至此投以白通真武等湯不亦晚乎故用外火灸之以急通其陽然後大
用辛熱之生附為君佐以人參之溫補以挽其將息之微明以芍藥之酸斂者
為使引入至陰而留連之加白朮以溫土茯苓以滲水則陽氣回而背寒可除

水土平而嘔利不作。長沙蓋千古見微知著之神人也。但言灸而不言所主之處。論背惡寒。當灸中行督脉。論少陰腎寒。當主兩旁二行太陽脉。以太陽為少陰之腑也。今並考之以俟取用。按素問水熱穴篇。王冰註曰。背脊中行督脉。氣所發者五穴。曰脊中。在十一椎下。不可灸。令人僂。曰懸樞。在十三椎下。曰命門。在十四椎下。曰腰俞。在二十一椎下。曰長強。在脊骶端。督脉別絡。少陰所結。俱可灸。三壯。夾督脉兩旁。去同身寸之一寸半。足太陽脉。氣所發者五穴。曰大腸俞。在十六椎旁。曰小腸俞。在十八椎旁。曰膀胱俞。在十九椎旁。曰中脘俞。在二十椎旁。曰白環俞。在二十一椎旁。俱可灸。三壯。

附子湯

附子二枚。去心。茯苓三兩。人參二兩。白朮四兩。芍藥三兩。右五味。以水八升。煮取三升。去滓。溫服一升。日三服。

三少陰病得之二三日麻黃附子甘草湯微發汗以二三日無裏症故微發汗也

喻氏曰不吐利煩躁嘔逆為無裏症病尚在少陰之表故以甘草易細辛以微發汗又溫散之緩法愚謂此條當編于第一條下蓋從其可汗之類也第一條脉沉故用細辛以開提陽氣宣發經表此條無脉沉字樣故只消易甘草以緩麻黃發越之性故曰微發汗

麻黃附子甘草湯

麻黃二兩去節甘草二兩炙附子一枚炮右三味以水七升先煮麻黃一二沸去上沫內諸藥煮取三升去滓溫服一升日三服

四

少陰病欲吐不吐心煩但欲寐五六日自利而渴者屬少陰也虛故引水自救若小便色白者少陰病形悉具小便白者以下焦虛有寒不能制水故令色白也

有物為吐則胃之權也今腎中陰寒上逆故欲吐然究非胃病故不吐也心

四

