

傷寒舌鑑

終

附傷寒兼證析義

紫	紅	灰	黑	黃	白
色	色	色	胎	胎	胎
舌	舌	舌	舌	舌	舌

妊	藍	黴
娠	色	醬
傷	胎	色
寒	紋	胎
舌	舌	舌

自序

嘗讀仲景書。止言舌白胎滑。並無黃

黑刺裂。至金鏡錄。始集三十六圖。逮

後。觀舌心法。廣至一百三十有七。何

後世證變之多。若此。寧知傷寒。自表

傳裏。舌胎必由白滑。而變他色。不似

伏邪瘟疫等。熱毒自內達外之一病。
 便見黃黑諸胎也。觀仲景論中。一見
 舌白胎滑。即言難治。安有失治而致
 變者乎。所以仲景止言白胎已見一
 班。不煩瑣屑。後人無先聖治未病之
 能。勢不得不反覆辨論。以啓蒙昧。蓋

邪氣入裏。其虛實寒熱之機。必現于
舌。非若脉法之隱而不顯也。况陰盛
格陽。與邪熱鬱伏。多有假證假脉。惟
驗舌上胎色之滑燥厚薄。昭若冰鑑。
無所遁形。由是取觀舌心法。正其錯
誤。削其繁蕪。汰其無預于傷寒者。而

自序
參入家大人治按所紀及已所親歷。
共得百二十圖。命曰傷寒舌鑑。授之
剖。以公同志。臨證之一助云。

康熙戊申如月誕先張登書于雋永

堂



休庵
不稟其遺寶
寒燠之辨
必與于

傷寒舌鑑目錄

白胎舌 二十九圖

黃胎舌 一十七圖

黑胎舌 一十四圖

灰色舌 一十一圖

紅色舌 二十六圖

紫色舌 一十二圖

黴醬色胎舌 三圖

藍色胎紋舌 二圖

妊娠傷寒舌 六圖

目錄終

卷之二十一
 卷之二十二
 卷之二十三
 卷之二十四
 卷之二十五
 卷之二十六
 卷之二十七
 卷之二十八
 卷之二十九
 卷之三十
 卷之三十一
 卷之三十二
 卷之三十三
 卷之三十四
 卷之三十五
 卷之三十六
 卷之三十七
 卷之三十八
 卷之三十九
 卷之四十
 卷之四十一
 卷之四十二
 卷之四十三
 卷之四十四
 卷之四十五
 卷之四十六
 卷之四十七
 卷之四十八
 卷之四十九
 卷之五十
 卷之五十一
 卷之五十二
 卷之五十三
 卷之五十四
 卷之五十五
 卷之五十六
 卷之五十七
 卷之五十八
 卷之五十九
 卷之六十
 卷之六十一
 卷之六十二
 卷之六十三
 卷之六十四
 卷之六十五
 卷之六十六
 卷之六十七
 卷之六十八
 卷之六十九
 卷之七十
 卷之七十一
 卷之七十二
 卷之七十三
 卷之七十四
 卷之七十五
 卷之七十六
 卷之七十七
 卷之七十八
 卷之七十九
 卷之八十
 卷之八十一
 卷之八十二
 卷之八十三
 卷之八十四
 卷之八十五
 卷之八十六
 卷之八十七
 卷之八十八
 卷之八十九
 卷之九十
 卷之九十一
 卷之九十二
 卷之九十三
 卷之九十四
 卷之九十五
 卷之九十六
 卷之九十七
 卷之九十八
 卷之九十九
 卷之百

傷寒舌鑑

清

長洲張

登誕先彙纂

同邑邵

之鵬三山較

日本

大泉前田安宅子仁

男

典子守

訂

白胎舌總論

傷寒邪在皮毛。初則舌有白沫。次則白涎白滑。再次白屑白
疱。有舌中舌尖舌根之不同。是寒邪入經之微甚也。舌乃心
之苗。心屬南方火。當赤色。今反見白色者。是火不能制金也。
初則寒鬱皮膚。毛竅不得疏通。熱氣不得外泄。故惡寒發熱。
在太陽經。則頭痛身熱。項背強。腰脊疼等證。傳至陽明經。則
有白屑滿舌。雖證有煩躁。如脉浮緊者。猶當汗之。在少陽經

者。則白胎白滑。用小柴胡湯和之。腎虛者。理中湯溫之。如白
色少變黃者。大柴胡。大小承氣。分輕重下之。白舌亦有死證。
不可忽視也。

白胎白滑論

與子中

大本 大泉前山安字平二

同色胎 之洲三山野

身既起 登臨出泉餐

微白滑胎舌




薄白滑胎舌



寒邪初入太陽。頭疼身熱惡寒。舌色微白有津。香蘇散。羌活湯之類發散之。

此太陽裏證舌也。二三日未曾汗。故邪入丹田漸深。急宜汗之。或太陽與少陽合病。有此舌者。柴胡桂枝湯主之。

厚白滑胎舌



乾厚白胎舌




病三四日。其邪只在太陽。故胎純白而厚。却不乾燥。其證頭疼發熱。脉浮而緊。解表自愈。

病四五日。未經發汗。邪熱漸深。少有微渴。過飲生冷。停積胸中。營熱胃冷。故令發熱煩躁。四肢逆冷。而胎白乾厚。滿口白屑。宜四逆散加乾薑。


此太陽病。發熱三日。未嘗

發熱。其人長用清熱。故其舌

白胎黃邊舌



白胎黃心舌



此太陽經初傳陽明府病舌也。若微黃而潤宜再汗。待胎燥裏證具則下之。若煩躁嘔吐大柴胡湯加減。亦有下淡黃水沫無稀糞者。大承氣下之。


舌中見白胎。外有微黃者。必作泄。宜用解毒湯。惡寒者五苓散。

即前經心。胎胎出不。惡寒。和。中。公。辨。黑。苔。因。其。不。辨。胎。至。則。此。實。即。胎。集。太。則。其。証。白。

乾白胎黑心舌



白滑胎尖灰刺舌





此陽明府兼太陽舌。其胎邊白。中心乾黑者。因汗不徹。傳至陽明所致。必微汗出。不惡寒。脈沉者。可下之。如二三日未曾汗。有此舌。必死。

此陽明府兼少陽舌也。三四日自利。脈長者生。弦數者死。如有宿食。用大承氣下之。十可全五。

此大關脈。其胎邊白。中心乾黑者。因汗不徹。傳至陽明所致。必微汗出。不惡寒。脈沉者。可下之。如二三日未曾汗。有此舌。必死。

白胎滑黑心舌 白胎滿刺乾舌




白胎中生滿乾黑芒刺。乃少陽之裏證也。其證不惡寒反惡熱者。大柴胡加芒硝急下之。然亦危證也。


白胎中黑。為表邪入裏之候。大熱譫語。承氣等下之。倘食復而發熱。或利不止者難治。

白胎中黑。為表邪入裏之候。大熱譫語。承氣等下之。倘食復而發熱。或利不止者難治。

半邊白滑舌



藏結白滑舌




白胎見於一邊。無論左右。皆屬半表半裏。並宜小柴胡湯。左加葛根。右加茯苓。有欬嗽引脇下痛。而見此舌。小青龍湯。夏月多汗自利。人參白虎湯。


或左或右。半邊白胎。半邊或黑或老黃者。寒邪結在藏也。黃連湯加附子。結在咽者。不能語言。宜生脈散合四逆湯。可救十中

一二。其鑑不惡寒。又惡熱。白胎中坐。戴掉黑苔。陳氏少則

白胎燥裂舌




白胎黑斑舌




白胎中有黑小斑點亂生者。乃水來尅火。如無惡候。以涼膈散承氣湯下之。十中可救一二。

傷寒胸中有寒。丹田有熱。所以舌上白胎。因過汗傷營。舌上無津。所以燥裂。內無實熱。故不黃黑。宜小柴胡加芒硝微利之。

舌根黃尖白



舌根黑胎白



舌胎白而根黑。火被水尅之象。雖下亦難見功也。

邪雖入裏。而尖白未黃。不可用承氣。宜大柴胡湯加減。下後無他證。安卧神清可生。倘再妄下。證多凶。平之十中可救一二。本來按火攻無惡效。以京觀證。白胎中宜黑。小按黑胎。上谷八