

歸女科要錄下

角上醫生莫相



婦女科要訣二卷

角上世醫莫桐蓀氏彙錄

赤白帶論

夫赤白帶下者皆因月經不調房勞過度或由產後
血虛胃中濕痰下流滲入膀胱而為帶下也腰疼頭
眩眼花小腹脹痛四肢乏力疲倦減食肥人多痰有
帶症瘦人多火亦有帶症其夢遺同治 方用八珍湯
八珍湯 四君合四物再加山藥杜仲香附烏藥可

再登



東肥人加姜半夏瘦人加黃柏飴悶去參加干

止帶丸

赤白帶同治

歸身

川芎

人參

山藥

杜仲炒

川斷

破故

牡蛎

煑

香附

酒炒

青代

椿皮

酒炒

分兩隨症加減

此藥

能治濁等症

右薦共研末蜜丸如

菉豆大米湯下腹

痛加玄胡索

小茴去參飴悶去參加砂仁半夏製

夏令加黃柏冬令加干姜肥人加半夏瘦人加荳

加減威喜丸

治帶如神

夜苓糞猪苓男此二味同煮半日取出揀去猪苓再
加煙牡蛎或分黃占或蜜丸菉豆大空心開水下七八
十九並治白濁症

當歸丸 治赤白帶不止腹內疼痛四肢癱瘓

飲食日減形容瘦怯

歸身不牡蛎

煙

阿膠

火

白芍

酒炒

川芎

酒炒

以對不地榆

炭

赤芍

或分醋糊為丸

菉豆大

每服七八

十九米湯下

加味六合丸 治上有痰火下有白帶腹痛可

下利

四物

四君

製半夏

貝母

知母

黃柏

白朮 炒陳皮

生姜分兩隨症加減共研末密

豆大每服八九十粒米湯下

收帶六合丸

治赤白帶肚腹疼痛此藥為和

脾胃燥中宮之濕提下陷之氣消火化痰

蒼术

白朮

陳皮

製半夏

茯苓

炙甘草

四物

椿皮

酒炒
焙干

防風

升麻

丹皮

黃柏

炒酒糊

丸

豆大每服八九十粒米湯下分兩隨症加減

一方

加香附枳壳

双白丸

治白带如神

真白灰弄疾

水法丸 菜豆大每服不清湯下

白芷螺蛸丸

治带如神

白芷

鱉海螺

螺

燶

胎髮燶共研末蜜丸 菜豆大每服七八十丸酒送下

虛勞論

夫虛勞者因氣結血滯外感六淫風寒暑濕燥傷七情憂愁思慮恐悲驚或情慾動心以致經事可



北京中医药大学图书馆版权所有
北京中医药大学图书馆

調燮生諸病上盛下虛手足心熱或皮焦骨蒸
怕冷夜間發熱或日夜不退五心煩熱盜汗自汗
噦咽乾脹腹作疼胸膈飽悶脾痿泄瀉痞塊
白唇紅額目眩暈腰脊酸疼四肢疲倦多卧少飲
食漸減小便赤澁重則虛火上攻而頰顴紅赤諸骨
蒸熾精液枯燥陰虛火旺治宜養血健脾醒胃滋陰
以治其本降火清痰以治其標諸症逍遙散茯苓補
心湯六味加減六味十全大補等帖出入加減全在



醫藥圖書館
藏印

對症用藥抑或回春

虛勞吐血

清肺飲

治虛勞發熱咳嗽吐血先服此以清熱止

血後服逍遙等帖

四物加天冬麥冬知母貝母

阿膠前胡陳皮炒蒲黃淡條芩藕節甘外

逍遙散

治虛勞發熱咳嗽吐血或潮熱自汗盜汗

或頭疼目眩或怔忡不寐煩熱口干或月經不調

或肚腹作疼少便重墜水道赤澁或痛或腫或可



清华大学图书馆版权所有

膿內熱作渴若腫痛者加龍胆汁

歸身白芍白朮茯苓柴胡甘草薄荷

炒煨

姜加丹

皮山杞

滋陰至寶湯

治諸般虛症五勞七傷經脉不調版

體瘦怯此方滋血脈補虛損扶元陽醒脾胃養心

肺潤咽喉清頭目定心神安魂魄退潮熱除骨蒸

止咳嗽化痰癥收盜汗止泄濁開鬱悶利胸膈療

腹疼解煩渴散寒熱祛體疼大有奇功



帰身

白芍

炒白朮

甘草

陳皮

香附

童便

知母

貝母

骨枝

麦冬

柴胡

薄荷

茯苓

加煨姜

茯苓補心湯

治虛勞熱渴無汗者凡婦人以血旺

氣衰為甚

心生血肝藏血若血衰而氣盛則心氣

虛耗不能生血又不能制乎肺金使肺金制剋于

肝木肝藏受剋定必虛損不能藏血漸至干枯血

涸經絡不榮月信不通此方能治心元之虛動可



北京
中醫藥大學

出版社

北京中醫藥大學圖書館版權所有

肺氣之盛調和榮衛滋養血脉以上諸症可愈
兼治去血過多煩燥虛熱及吐血衄血咳嗽痰喘
上壅胸膈不利 四物 二陳 加干葛

枳壳

前胡

紫蘋

人參

木香

滋陰地黃丸

治經水不調勞損吐血衄血便血潮

熱咳嗽痰喘盜汗一切勞損瘦怯之症

六味飲

加帰身

生地

大天冬

知母

香附

以見母



抑肝散 治寡居孤陰婦人惡寒發熱類全瘧疾久

而不愈漸成瘍瘻 四物湯加柴胡 丹皮青皮

地骨皮

香附

甘外炙

神曲炒連翹

山梔

臨卧時再服交感丸一丸

交感丸 治先富後貧先貴後賤或終身不得志抑
鬱成病以及婦女心情鬱結師尼寡居婢僕下人
抑鬱成病並皆宜之

香附

酒醋童便

蜀葵花

人乳浸日夜日晒七日夜露七夜

共研末神曲糊為丸數粒



子大每服一丸臨卧開水送下

求嗣息論

凡人嗣息之有無自有定數然雖有定數能積德樂善亦可人力挽回天數究而論之嗣息生產之理要論女人月經來時有兩日半有三日淨者亦有血旺氣盛六七日淨者不可拘一但看顏色何如須用潔白之物或紗或帛夾于陰戶過宿取而視之金色者乃佳期也淡紅者太過也鮮紅者未淨乃是不及也



求嗣息論
醫藥
圖書館版權所有

追隨後敗益去淨新血復生乃佳期也此時交合無
不成孕若先期而施精乃金水太盛子宮瘀塞且及
無受精之處後期而施精則子宮已閉雖施精而無
門可入胎豈有可成惟敗血既盛新血復生子宮正
虛虛則能受此時施精如火爐燥金胎成孕矣又云
經水淨單日施種則成男胎双日施種則成女胎六
日以後徒勞精神不成孕矣交合施精要在夜半子
時方可蓋于時夜氣清明一陽發動古云一陽動可



其工是也還要遇天晴月朗風清良宵以定吉日加之天月二德合日如此行房不特得子而且生子一定聰明壽貴文才過人然亦有不可拘一有等女人終身不育能成孕俗云暗有還有白身人終身不孕此乃陰陽顛倒難以常理論也夫婦人胎既成後則陰陽之精渾融一氣而精血尚嫩未老不可舉動恐動則易剋易化風邪感入損傷胎氣又切忌交後連交又忌挾持重物登高過險越堅大怒大笑大驚



中醫藥大學圖書館藏
版權所有

高語跌朴此皆損胎孕婦最要謹忌係保胎之大法
也蓋胎之結初月如荷含白露二月似桃花三月
成男女當此之際宜靜以守逸以待胎最嬌嫩切不
可妄動若再連交胎恐受損必致搖動感入風邪難
免小產雖不小產譬言之樹果花開遇風雨霧露定不
結實縱結心亦生虫風胎結後誠恐生而難育矣雖
曰可育月內脐風之禍不遠月外病痛百出終身多
瘡癆多端皆因受胎之後連交之害慎之切忌若將



產時再連交則胎必受毒穢產後生瘡難免世間配
合夫婦以為後嗣之計種種受胎之後最要靜養一
月滿足切不可交合待產後必順嬰孩非特好養而
且壽而貴才智過人若受胎後再連交一無所忌產
後不順或墮胎或橫生嬰孩或胎風或瘡癆疾痛百
出短折夭亡皆因如此所害凡婦人欲為嗣息計者
先要清心寡慾再以調經種子則必子旺嗣昌每見
無子者其經不調或前或後或将行作痛或行後作