

慎柔五書卷之四

石 震瑞章父訂正

瘦樵程永培校

顧元交剪尹父編次

癆瘵第四

脈法

勞瘵脈酉戌時洪盛寅卯時細弱者陽氣虛陷也
忌服苦寒損其陽氣當以助陽之劑復其寅卯
之位微加瀉陰火而已 若服寒涼證雖大減

脈反加數者陽鬱也

右脈大用保元湯左脈大用六味湯不減若燥者以瓜蒌生甘草散潤之

久病咳嗽氣喘若脈洪數不可即用補藥如服之虛火一退多令人痿倦不起須先用獨參湯以接其氣數日後數脈漸退方與調理爲是

總論

夫癆者勞也非一端可盡或苦心竭其心脾之神

志或酒色竭其肝腎之陰精或久痢久瘧傷寒
傷暑諸症治之不當損其氣血傷其脾胃五藏
乾枯而火起以致發熱則金受尅大腸先結燥
而水之源先涸矣宜見脈見症用藥果當無不
愈者若初熱未甚繼以治法之非久之卽成蒸
病蒸病者如甑之蒸熟之極也然使初病元氣
尚強脈氣尚旺照古方用五蒸湯加減二十三
蒸之法亦無不驗治蒸法服之病稍退又當察

症清心叅用癆病治方不可造次蒸病或十日
半月熱極致骨中血凝便化爲蟲張仲景立祛
血之法不使凝血化蟲蠱蟲丸百勞丸是也倘
治之不得其序不能祛血血化爲蟲是時病人
脈氣尚充精神尚旺猶可揉也如聲啞喉痛寒
熱大作脈細而數不思飲食精神視聽俱不能
支皆屬不治又有火鬱痰凝氣滯咳嗽發熱氣
喘葛先生保和湯保真湯次序用之火散痰開

熱退總歸八珍湯調理又有吐紅咳嗽脈雖數
有神不至于蒸極作蟲者脈洪脈數虛虛實實
通變在乎心靈矣

骨蒸由氣虛不能化血血乾則火自沸騰肉如針
刺骨熱煩疼或五心俱熱或兩肋如火或子午
相應或晝微惡寒而夜反大熱雖腎經所主傳
變不常蒸上則喘咳痰血舌黑耳鳴目眩等症
蒸下則見夢遺淋濁泄瀉腰疼脚疼等症蒸中

則見腹脹脇痛四肢倦怠等症

不問陰病陽病日久皆能傳變男子自腎傳心肺
肝脾女子自心傳肺肝脾腎五藏復傳六府而
死矣有始終只傳一經者有專着心腎而不傳
者大要以脈爲證驗

凡氣血勞倦不運則凝滯踈漏邪氣得以相乘又
飲食勞倦所傷則上焦不行下脘不通熱極蒸
胸中而內熱生矣凡頸上有核腸中有塊或當

臍冰冷或無力言動皆痰涎結聚氣血凝滯之
所致故以開關啓胃爲先蓋關脉閉則氣血乾
竭胃氣弱則藥無由行但陽虛不可偏用辛香
丁附之類陰虛不可用苦寒古方有開關定胃
散今亦難用竊其意推之

蟲爲氣血凝滯瘀血化成但平補氣血爲主加以
烏梅青蒿硃砂之類而蟲自亡矣紫河車丹紫
河車丸青蒿膏蚡蚴散

選用惟度其

虛實爲主

凡體虛者宜先用補法扶其元氣然後用王道之藥佐之以殺蟲之劑如化蟲丸史君子丸之類或追蟲後而繼以溫補亦可不然則蟲去而元氣亦散

傳屍之說不必深泥歷觀癆瘵皆因酒色之類損傷心血以致虛火妄動醫者不分陰陽用藥病者不思疾由自取往往歸咎前因甚者疑及房

室器皿墳墓及冤業飛尸遞相傳疰古人云癆
療三十六種惟陰德可以斷之不幸患此疾者
或入山林或居靜室清心戒慾專意保養庶乎
病可除根不然卽服藥不效

癆蟲須分五藏常居肺間正所謂膏之上育之下
針之不得藥之不行只宜早灸膏育四花爲佳
若蝕肺系則咯血吐痰聲嘶思食無厭病患至
此未易療治當參究古法九蟲及一十八種蟲

名之異并紫庭取蟲諸法

晝熱行陽二十五度大抵柴胡飲子夜熱行陰二十五度四順飲子平旦發熱熱在行陽之分肺氣主之故用白虎湯以瀉氣中之火曰晡潮熱熱在行陰之分腎氣主之故用地骨皮散以瀉血中之火

肝症發熱肉下骨上寅卯尤甚瀉青丸人中白散
心症發熱在血脈日中則甚單瀉心湯導赤散

硃砂安神丸脾症發熱在肌肉遇夜尤甚瀉黃散三白湯肺症發熱在皮毛日西則甚瀉白散甚者涼膈散腎症發熱在骨亥子尤甚兩手足心如火滋腎丸

尸注一症予嘗治之先癸亥夜二更六神皆聚之時灸腰眼穴七壯然後用藥倘不能待先用藥亦可注病亦似勞症但兩足無力行則痿疲是也其治法六脈洪數八物湯脾肺不足補中益

氣湯睡不穩歸脾湯不思食六君子湯隨症推
類但煎劑中須加忍冬葉三錢同煎本草以其
葉能治尸注也

凡治勞症或男或婦若淫火不退者雖治不治

骨蒸勞

夫骨蒸勞者由於積熱附于骨而名也亦曰傳尸
殭殭復連無辜其名不一此病皆由脾胃虧損
所致其形羸瘦泄痢肢體無力傳于腎則盜汗

不止腰膝痛夢鬼交侵小便赤黃傳于心則心神怯悸喜怒不時頰唇赤色乍熱乍寒傳于肺則胸滿短氣咳嗽吐痰皮膚甲錯傳于肝則兩目昏暗脇下妨痛閉戶忿怒五藏既病則難治
療立齋云前症多因經行胎產或飲食七情而傷脾胃之所致又或病後失於調攝而成也

東垣云發熱之症肺熱者輕手乃得微按全無曰西尤甚其證咳嗽寒熱輕者用瀉白散重者涼

膈散白虎湯地骨皮散心熱者微按之皮膚之
下肌肉之上在血脈也日中大甚其症心煩心
痛掌中熱而噦用黃連瀉心湯導赤散硃砂安
神丸脾熱者輕手捫之不熱重手按至筋骨又
不熱不輕不重在輕重之間在肌肉也遇夜尤
甚其症怠惰嗜臥四肢不收無氣以動用瀉黃
散肝熱者按之肌肉之下至骨之上寅卯時爲
甚其症四肢滿悶便難轉筋多怒多驚筋痿不

能起于床用瀉青柴胡湯飲腎熱者按至骨分
其熱蒸手其症骨酥如蟲蝕困熱不能起于床
用滋陰丸此治實熱之法也

薛立齋云肺經虛熱者用人參補肺湯脾虛不能
生肺者用六君子湯脾熱移于肺者用三黃丸
心經虛熱者用補心湯命門火衰不能生土者
用八味丸肝虛不能生心者用補肝散腎尅心
者用附子理中湯脾經虛熱者用人參黃芪散

土尅水者用承氣湯腎虛不能培肝者俱用六味丸

血風勞

血風勞症因氣血素虛或產後勞傷外邪所乘或內有宿冷以致腹中疼痛四肢酸倦發熱自汗及婦人月水不調面黃肌瘦當調肝脾氣血爲主

東垣云喜怒不節起居不時有所勞傷皆損其氣

氣衰則火旺火旺則乘其脾土脾主四肢故困
熱懶言動作喘乏表熱自汗心煩不安當病之
時宜安靜存養以甘寒瀉其熱氣以酸味收其
散氣以甘溫補其中氣經言勞者溫之損者溫
之要略云平人脈大爲勞以黃芪建中湯治之

冷勞

冷勞者氣血不足藏府虛寒以致臍下冷痛手足
時寒婦人月水失常飲食不消或時嘔吐惡寒