

草綱目

竹



本草綱目草部目錄第十三卷

草之二

山草類下三十九種

黃連

本經

胡黃連

開寶

黃芩

本經

秦艽

本經

柴胡

本經

前胡柴胡

本經

防風

本經

獨活羌活

本經

土當獨活羌活

都管草

圖經

升麻

本經

苦參升麻

本經

白鮮

本經

延胡索

開寶

貝母

本經

山慈姑

嘉祐

石蒜

圖經

水仙

會稽

白茅

本經

地筋

州錄卽
菅茅

芩

拾遺

龍膽

本經

細辛

本經

杜衡

本經

及已

別錄

鬼督郵

唐本

徐長卿

本經

白微

本經

白前

別錄

草犀

拾遺

釵子股

海藥

吉利草

綱目

硃砂根

綱目

辟瘟雷

拾遺

錦地羅

綱目

紫金牛

圖經

拳參

圖經

鐵線草

圖經

金絲草

綱目

右附方舊七十一新二百一十四

本草綱目草部第十三卷

草之二

山草類下三十九種

黃連

本經上品

釋名王連

本經

文連

藥性時珍曰其根連珠而色黃故名

集解

別錄曰

黃連生巫陽川谷及蜀郡太山之陽二月八月采根弘景曰巫陽在建平今西關

者色淺而虛不及東陽新安諸縣最勝臨海諸縣

者不佳用之當布揆去毛令如連珠保昇曰苗似

茶叢生一莖生三葉高尺許凌冬不凋花黃色江

左者節高若連珠蜀都者節下不連珠今秦地及

杭州柳州者佳頌曰今江湖荆夔州郡亦有而以

宣城九節堅重相擊有聲者爲勝施縣者次之東

陽歙州處州者又次之苗高一尺以來葉似甘菊

四月開花黃色六月結實似芹子色黃江左者

根黃連珠其苗經冬不凋葉如小雞尾草正月開
花作細穗淡白微黃色六七月根紫如堪采秦
蜀道者粗大味極濃苦療渴為最江東者節如連
珠療痢大善澧州者更勝時珍曰黃連漢末李當
之本草惟取蜀郡黃肥而堅者為善唐時以澧州
者為勝今雖吳蜀皆有惟以雅州蒼州者為良藥
物之興廢不同如此大抵有二種一種根粗無毛
有珠如鷹雞爪形而堅實色深黃一種無珠多毛
而中虛黃色稍淡各有所宜

根脩治

數曰凡使以布拭去肉毛用漿水屋二伏
時漉出子柳木火上焙乾用時珍曰五臟

六腑皆有火平則治動則病故有錢
其實一氣而已黃連入手少陰心

藥治本臟之火則生用之治肝膽
膽汁浸炒治肝膽之虛火則以醋即止青
上焦之

火則以酒炒治中焦之火則以薑
下焦之

火則以鹽水或朴消炒治氣分濕
則以寒

黃湯浸炒治血分塊中伏火則以乾漆水炒治食積之火則以黃土炒諸法不獨爲之引導蓋辛熱能制其苦寒鹹寒能制其燥性在用者詳酌之

氣味苦寒無毒

別錄曰微寒普曰神農岐伯黃帝雷公苦無毒李當之小寒之才曰

黃芩龍骨理石爲之使惡菊花玄參白鮮皮芫花白僵蠶畏款冬牛膝勝烏頭解巴豆毒權曰忌豬肉惡冷水敷曰服此藥至十兩不得食豬肉若服至三年一生不得食也時珍曰道書言服黃連花豬肉令人泄瀉而方家有豬肚黃連丸豬臟黃連丸豈只忌肉而不忌臟腑乎

主治熱氣

目痛皆傷泣出明目腸澀腹痛下痢婦人陰中腫

痛久服令人不忘

本經

主五臟冷熱久下洩澀膿血

止消渴大驚除水利骨調胃厚腸益膽療口瘡

別錄

治五勞七傷益氣止心腹痛驚悸煩躁潤心肺長

肉止血天行熱疾止盜汗并瘡疥猪肚蒸為丸治

小兒疳氣殺蟲大羸瘦氣急藏治鬱熱在中煩躁

惡心兀兀欲吐心下痞滿元主心病逆而盛心積

伏梁好去心竅惡血解服藥過劑煩悶及巴豆輕

粉毒時珍

發明元素曰黃連性寒味苦氣味俱厚可升可降

一也去中焦濕熱二也諸瘡必用三也去風濕四

也赤眼暴發五也止中瀉見血六也張仲景治心
種心下痞五等瀉心湯皆用之藏無已日苦入心
寒勝熱黃連大黃之苦寒以導心下之虛熱蛇得

甘則動得苦則安黃連黃蘗之苦以安蛇也好古
曰黃連苦燥苦入心火就燥瀉心者其實瀉脾也
實則瀉其子也震亨曰黃連去中焦濕熱而瀉心
火若脾胃氣虛不能轉運者則以茯苓黃芩代之
以豬膽汁拌炒佐以龍膽草則大瀉肝膽之火下
刺胃口熱禁口者用黃連人參煎湯終日呷之如
吐再強飲但得一呷下咽便好劉完素曰古方以
黃連爲治痢之最蓋治痢惟宜辛苦寒藥辛能發
散開通鬱結苦能燥濕寒能勝熱使氣宣平而已
諸苦寒藥多泄惟黃連黃蘗性冷而燥能降火去
濕而止瀉痢故治痢以之爲君宗奭曰今人多用
黃連治痢蓋執以苦燥之義下俚但見腸虛溼泄
微似有血便卽用之又顧寒熱多少惟欲盡劑
由是多致危困若氣實初病熱多血痢服之便止
不必盡劑虛而冷者慎勿輕用杲曰諸痛痒瘡瘍
皆屬心火兄諸瘡宜以黃連當歸爲君甘草黃芩
爲佐凡眼暴發赤腫痛不可忍者宜黃連當歸以
酒浸煎之宿食不消心下痞滿者須用黃連枳實

〔頌曰〕黃連治目方多而羊肝丸尤奇異今醫家洗
眼以黃連當歸芍藥等分用雪水或甜水煎湯熱
洗之冷卽再溫甚益眼目但是風毒赤目花翳用
之無不神効益眼目之病皆是血脉凝滯使然故
以行血藥合黃連治之血得熱則行故乘熱洗也
〔韓悉曰〕火分之病黃連爲主不但瀉心火而與苓
藥諸苦藥列稱者此也此目疾人以人乳浸蒸或
點或服之生用爲君佐以官桂少許煎百沸入蜜
空心服之能使心腎交於頃刻入五苓滑石大治
夢遺以黃土薑汁酒蜜四炒爲君以使君子爲臣
白芍藥酒煮爲佐廣木香爲使治小兒五疳以茱
萸炒者加木香等分生大黃倍之水丸治五痢此
皆得制方之法也〔時珍曰〕黃連治目及痢爲要藥
古方治痢香連丸用黃連木香薑連散用乾薑黃
連變通丸用黃連茱萸薑黃散用黃連生薑治消
渴用酒蒸黃連治伏暑用酒煮黃連治下血用黃
連大蒜治肝火用黃連茱萸治口瘡用黃連細辛
皆是一冷一熱一陰一陽寒因熱用熱因寒用君

臣相佐陰陽相濟最得制方之妙所以有成功而無偏勝之害也弘景曰俗方多用黃連治痢及渴道方服食長生真微曰劉宋王微黃連讚云黃連味苦左右相因斷涼滌暑闡命輕身縉雲昔御飛蹕上旻不行而至吾聞其人又梁江淹黃連頌云黃連上草丹砂之次禦孽辟妖長靈久視驂龍行天馴馬匝地鴻飛以儀順道則利時珍曰本經別錄並無黃連久服長生之說惟陶弘景言道方久服長生神仙傳載封君達黑穴公並服黃連五十年得仙竊謂黃連大苦大寒之藥用之降火燥濕中病卽當止豈可久服使肅殺之令常行而伐其生發冲和之氣乎素問載岐伯言五味入胃各歸所喜攻久而增氣物化之常也氣增而久天之由也王冰註云酸入肝爲溫苦入心爲熱辛入肺爲清鹹入腎爲寒甘入脾爲至陰而四氣兼之皆增其味而益其氣故各從本藏之氣爲用所以久服黃連苦參反熱從火化也餘藥皆然久則臟氣偏勝卽有偏絕則有暴天之道是以絕粒服餌之人

不暴亡者無五味偏助也又秦觀與喬希聖論黃連書云聞公以眼疾餌黃連至十數兩猶不已殆不可也醫經有久服黃連苦參反熱之說此雖大寒其味至苦入胃則先歸於心久而不已心火偏勝則熱乃其理也况眼疾本於肝熱肝與心為子母心火也肝亦火也腎孤臟也人患一水不勝二火豈可久服苦藥使心有所偏勝是以火救火其可乎秦公此書蓋因王公之說而推詳之也我明荆端王素多火病醫令服金花丸乃岑連卮藥四味餌至數年其火愈熾遂至內障喪明觀此則寒苦之藥不但使人不能長生久則氣增偏勝速天之由矣當以素問之言為法陶氏道書之說皆謬談也楊士瀛云黃連能去心竅惡血

附方

舊二十二新四十

心經實熱

瀉心湯用黃連七錢水一盞半煎一盞食遠溫

服小兒減之

卒熱心痛

黃連八錢

水煎食遠溫

肝火

和劑局方

外臺秘要

為痛

黃連薑汁炒為末粥糊丸梧子大每服三

同炒為末神麴糊丸梧子大每服三四十九白湯下

丹溪方伏暑發熱惡及亦

白痢消渴腸風酒毒泄瀉諸病並宜酒煮黃龍丸

主之川黃連一斤切以好酒二升半煮乾焙研糊

丸梧子大每服五十丸熟陽毒發狂奔走不定宣

水下日三服和劑局方黃連寒水石

等分為末每服三錢濃骨節積熱漸漸黃瘦黃連

煎甘草湯下易簡方四分切以童子

小便五大合浸經宿微煎三四小兒疳熱流注遍

沸去滓分作二服廣利方血清心之藥佐之

或潮熱肚脹作渴猪肚黃連丸用猪肚一箇洗淨

宣黃連五兩切碎水和納入肚中縫定放在五升

梗米上蒸爛石臼搗于杵或入少飯同杵丸綠豆

大每服二十九丸米飲下仍服調血

蓋小兒之病不出于疳則出三消骨蒸黃連末以

于熱常須識此直指方冬瓜自然

汁浸一夜晒乾又浸如此七次為末以冬瓜井和
丸梧子大每服三四十九大麥湯下尋常渴只一

服見効○消渴尿多肘後方用黃連末蜜丸梧子

易簡方大每服三十丸白湯下○寶鑑用黃連半斤酒一升浸重湯內煮一伏時取晒

為末水丸梧子大每服五十丸溫水下○崔氏治

消渴小便滑數如油黃連五兩栝樓根五兩為末

生地黃汁丸梧子大每牛乳下五十九日二服忌

冷水猪肉、總錄用黃連末入猪濕熱水病黃連

肚肉蒸爛搗丸梧子大飯飲下末蜜

丸梧子大每服二丸至四五破傷風病黃連五錢

丸飲下日三四服范汪方酒一盞煎

七分人黃蠟三錢溶化熱服小便白淫因心腎氣

之高文虎蓼花洲閑錄不足思想

無窮所致黃連白茯苓等分為末酒糊丸梧子大

每服三十九煎補骨脂湯下日三服普濟方

熱毒血痢宣黃連一兩水二升煮取半升露一

空腹熱服

臥將息一二日即止

子

金赤痢久下

累治小瘥黃連一兩雞子白和為餅炙紫為末以漿水三升慢火煎成膏

每服半合溫米飲下

一方只

熱毒赤痢

黃連二兩切瓦焙令

以雞子白和丸服

勝金方

焦當歸一兩焙為末入麝香少許每服二錢陳

米飲下佛智和尚在闍以此濟人

本事方

赤

白久痢

並無寒熱只日久不止用黃連四十九箇鹽梅七箇入新甌內燒烟盡煮研每服二

錢鹽米湯下

楊子建護命方赤白暴痢

如鴛鴨肝者痛不可忍用黃連黃芩各一兩水

二升煎一升分三

次熱服經驗方

冷熱諸痢胡洽九盞湯治下痢

休息久下悉主之黃連長三寸三十枚重一兩半龍骨如碁子大四枚重一兩大附子一枚乾薑一

兩半膠一兩半細切以水五合著銅器中去火三寸煎沸便取下坐土上沸止又上水五合如此九

上九下納諸藥入木內再煎沸輒取下沸止又上九上九下度可得一升頓服即止

圖經本草

下痢腹痛

赤白痢下冷人下部寒重故名重下日

升者取一升半分再服

治痢香連丸

李絳兵部手

當止絞痛也

肘後方

痢裏急後重腹痛用宜黃連青木香等分搗篩白

蜜丸梧子大每服二三十九空腹飲下日再服其

効如神久冷者以煨蒜搗和在之不拘大人嬰孺

皆効。易簡方黃連菜萸炒過四兩木香麴煨一

兩粟米飯丸。錢仲陽香連丸治小兒冷熱痢加

煨熟調子肉。又治小兒瀉痢加煨熟肉豆蔻

又治小兒氣虛瀉痢腹痛加白附子。劉河間

治久痢加龍骨。朱丹溪治禁口痢加石蓮肉

王氏治痢渴加烏梅

五疳八痢

四治黃連丸用連

肉以阿膠化和為丸

四分一分用酒浸炒一分用自然鹽升炒一分用

吳茱萸湯浸炒一分用益智仁同炒去益智研末

白芍藥酒煮切焙四兩使君子仁焙四兩廣木香

二兩為末蒸餅和丸綠豆大每服三十九水飲食

前下日三服忌猪肉

冷水 韓氏醫通

傷寒下痢

不能食者黃連一升烏梅二十枚去

核炙燥為末蠟一碁子大蜜一升合煎和九梧子大一服二十丸日三服。又方黃連二兩熟艾如

鴨子大一團水三升煮取一升頓服立止 並肘後方

氣痢後重

裏急或下泄杜玉方

薑連散用宣連一兩乾薑半兩各為末收每用連一錢薑半錢和勻空心溫酒下或米飲下神妙。

濟生方秘傳香連丸用黃連四兩木香二兩生薑四兩以薑鋪砂鍋底次鋪連上鋪香新汲水三盞

煮焙研醋調倉米糊為丸如常日服五次 小兒下痢

赤白多時體弱不堪以宜連用水濃

煎和蜜日服五六次 子母秘錄

諸痢辟泄

藏毒下血雅州黃連半斤去毛切裝肥猪

大腸內紮定入砂鍋中以水煎煮爛取連焙研末揭腸和丸梧子大每服百丸朱湯下極効 直指

濕痢腸風

度及腸風下血一選方變通丸治赤白下痢日夜無

湯泡通各二兩同炒香鹽出各為末以粟米飯和

丸梧子大各散每服三十九丸赤痢甘草湯下黃連

丸白痢薑湯下茱萸丸赤白痢各用十五丸米湯

下此乃浙西河山純老方殺人甚効○局方戊巳

丸治脾胃受濕下痢腹痛米穀不化用積熱下血

二味加白芍藥同炒研末餅和丸服

聚金丸治腸胃積熱或因酒毒下血腹痛作渴脉

弦數黃連四兩分作四分一分生用一分切炒一

分炮切一分水浸晒研末條黃芩一兩防風一兩

為末麴糊丸梧子大每服五十九丸米醋浸枳殼

水食前送下冬月加酒蒸厥毒下血黃連為末獨

大黃一兩楊氏家藏方

丸梧子大每空心陳米酒下血黃連酒浸煮熟

飲下四十丸濟生方

子大每服三四十九丸白湯下一方

用自然薑汁浸焙煉

之加赤小豆末

斗門方

痔病秘結用此寬腸黃連枳殼等