

數

10398

重刊萬方類纂

六止

萬方類纂卷第八

山陰宋穆饌次

臨桂謝元福審正

下部第八

關格

大小便閉

搗葱白和酢封小腹上仍灸七壯  
薑汁各二升微火煎至二升下酒五合和

煎分服

用白花胡葵子為末濃汁服之  
雄鼠屎

砂一匙

安臍中冷水滴之令透自通也

末敷臍中

立效 亂髮灰三指撮投半升水服

蜂房燒末

酒服二三錢日二服不拘大人小兒

甌帶煮汁

和蒲灰末方寸匕服日三次 皂莢燒

碾粥飲下

三錢立通 皂莢炙去皮子為末酒麯

糊丸每服

五十九丸酒下 用皂莢燒烟于桶內坐

上熏之即通

巴豆連油黃連各半兩搗作餅子

先滴葱鹽汁

在臍內安餅于上灸二七壯取利為

度 檳榔為末

蜜湯調服二錢或以童子小便葱

白同煎服之亦良 桃葉杆汁半升服冬用榆皮  
酸草一大把車前草一握搗汁入砂糖一錢調  
服一盞不通再服 土馬驥水淘淨五焙過切每  
服二錢水一盞煎服 甘遂末以生麴糊調傳臍  
中及丹田內仍艾三壯飲甘草湯以通為度又太  
山赤皮甘遂末一兩煉蜜和勻分作四服日一服  
取利 生草烏豆為末以葱頭蘸藥納穀道中名  
霹靂箭 鹽和苦酒傳臍中乾即易仍以鹽汁灌  
臍內并內用紙裏鹽投水中飲之 白礬末填滿  
臍中以新汲水滴之覺冷透腹內即自然通臍平  
者以紙圍環之 諸藥不效紫花扁竹根瑯射生  
水邊者佳碾汁一盞服即通 脹悶欲死二三  
即殺人膩粉一錢生麻油一合相和空心服又芒  
消三兩泡湯一升服取吐即通又胡椒二十一粒  
打碎水一盞煎六分去滓入芒硝半兩煎化服又  
烏相東南根白皮乾為末熱水服二錢先以芒硝  
二兩煎湯服取吐甚效又貝齒三枚甘遂二銖為  
末漿水和服須臾即通也又蜀葵花一兩搗爛麝  
香半錢水一大盞煎服根亦可用又蔓菁子油一  
合空腹服之即通通後汗出勿怪 經月欲死者

本事推車散用推車客七個男用頭女用身土狗  
七個男用身女用頭新瓦焙碾末用虎目樹卽樗  
樹南向皮煎汁調服只一服卽通一方云並男用  
頭女用身不通六七月尋牛糞中大蟻螂十餘  
枚線穿陰乾收之臨時取一個全者放淨磚上四  
面以灰火烘乾當腰切斷如大便不通用上截小  
便不通用卽解下截各爲細末取井華水服之二便不  
通全用卽解 脹急者生冬葵根二斤搗汁三合  
生薑四兩取汁一合和勻分二服連用卽通也  
鼓脹氣促八角茴香七個大麻仁半兩爲末生葱  
白三七根同碾煎湯調五苓散末服之日一服  
脹滿者獨頭蒜燒熟去皮綿裹納下部氣立通也  
升納猪脂一雞子頓服又葵子二升水四升煮取一  
子大每服五 十丸效止

# 氣壅關格

不通小便淋結臍下妨悶兼痛滑石粉一兩水調服又徐長卿炙半兩茅根三分木

通冬葵子一兩滑石二兩檳榔一分瞿麥穗半兩每服五錢水煎入朴硝一錢溫服日二服

濕熱壅脹

一人素多酒色病下極脹痛二便不通不能坐臥立哭呻吟者七晝夜醫用通利藥

不效此乃濕熱之邪在精道壅脹隧路病在二陰之門故前阻小便後阻大便病不在大腸膀胱也

用棟實茴香穿山甲諸藥入牽牛加倍水煎服一服而減三服而平

癰閉不通

小腹急痛無問久新荆芥大黃為末等分每溫水服三錢小便不通大黃減半大便

不通荆芥減半名倒換散

正水脹急

大小不利欲死甘草五錢半生半炒胭脂坯子十文碾勻每以一錢白麴四兩水和

作碁子大水煮令浮淡食之大小便利後用平胃散加熟附子每以二錢煎服

下部閉塞

蒴藿根一把搗汁水和絞去滓強人每服一升

利大小便

莧實為末半兩分二服新汲水下

結燥

大便不通

以葦筒納入下部三寸猪膽汁灌之立下

捻作挺令頭銳大如指長寸半許候冷即硬納便

道中少頃即通也一法加皂角細辛為末少許尤

速枳實皂莢等分為末飯丸米飲下白膠香

半棗大鼠糞二枚碾勻水和作挺納入肛內良久

自通烏柏木根方長一寸劈破水煎半盞服之

立通不用多喫其功神聖兼能取水瓜蒂七枚

碾末綿裹塞入下部即通生薑削長二寸塗鹽

納下部立通冬麻子半斤碾碎水濾取汁入梗

米二合煮稀粥下葱椒鹽豉空心食牽牛子半

生半熟為末每服二錢薑湯下未通再以茶服一

方加大黃等分一方加生檳榔等分土瓜根搗

汁少水解之筒吹入肛門內二便不通前後吹之

取通當歸白芷等分為末每服二錢米湯下

皂礬一錢巴霜二個同碾入雞子內攪勻封頭濕

紙裹煨熟食之酒下即通十日至一月者冬葵

子三升水四升煮取一升服不瘥更作又用葵子

末人乳汁等分和服立通氣奔欲死者烏梅  
十顆湯浸去核丸棗大納入下部少時即通

大便秘塞

羊膽汁灌入即通  
錢屋簷爛草節七個為末每用一錢竹筒

吹入肛內一寸即通  
服一錢 陳皮連白酒煮焙碾末每溫酒服二錢

米飲下

大便秘塞

大棗一枚去核入輕粉半錢縛  
定煨熟食之仍以棗湯送下

大腸乾結

厚朴生碾猪藏煮搗和丸梧子大每薑水  
下三十丸 大便卒結羊蹄根一兩水一

大盞煎六分溫服

大便秘塞

膩粉半錢砂糖一彈丸碾丸梧子大每服  
五丸臨臥溫水下 膩粉二錢黃丹一錢

為末每米飲服一錢

大便秘

疾藜子炒一兩猪牙皂莢去皮酥炙五錢  
為末每服一錢鹽茶湯下 香白芷炒為

末每服二錢米飲入蜜少許連進二服 大腸風

秘結濟牽牛子微炒搗頭末一兩桃仁去皮尖麩

炒半兩為末熟蜜丸梧

子大每湯服三十丸

粒

大便秘 松子仁柏子仁麻子仁等分碾泥溶白蠟

鬚葱一根薑一塊鹽一捻淡豉三七粒搗作餅烘

揜臍中紮定良久氣通即通不通再作 因汗多

津液耗涸者沈香一兩肉蓯蓉酒浸焙二兩各碾

末以麻仁碾汁作糊丸梧子大每服一百丸蜜湯

下 風人虛人脚氣人大腸或秘或利皂角子一

千二百個洗淨以少酥熬香為末蜜丸梧子大每

四

大腸濕悶

腸胃有濕大便閉塞大檳榔一枚麥門冬煎湯磨汁溫服或以蜜湯調末二錢服亦可

燥渴腸秘

九月十月熟栝樓實取瓢拌乾葛粉銀石器中慢火炒熟為末食後夜臥各以沸湯

點服  
二錢

相火秘結

大黃末一兩牽牛頭末半兩每服三錢有厥冷者酒服無厥冷五心煩蜜湯服

熱黃便結

用蕪菁子搗末水和絞汁服少頃當瀉一切惡物沙石草髮並出

乾糞塞腸

脹痛不通用毛桃花濕者一兩和麩三兩作餛飩煮熟空心食之日午腹鳴如雷當

下惡  
物也

老人悶塞

綿黃芪陳皮去白各半兩為末每服三錢用大麻子一合碾爛以水濾漿煎至乳起

入白蜜一匙再煎沸調藥空心服甚者不過二服此藥不冷不熱常服無秘塞之患其效如神虛

秘阿膠炒二錢葱白三根水煎化入蜜二匙溫服  
柏子仁松子仁大麻仁等分同碾溶蜜蠟丸梧  
子大以少黃丹湯食前調服二三十丸日二服  
氣閉陳皮一斤和杏仁五兩去皮尖熬少加蜜搗  
和丸如梧桐子大每日食前米飲下三十九丸虛  
秘冷秘及痲痺冷氣半夏泡炒生硫黃等分爲末  
自然薑汁煮糊丸如梧子大每空心溫酒下五十  
丸冷秘風閉或泄瀉煖元臟除積冷溫脾胃進  
飲食治心腹一切痲痺冷氣硫黃柳木槌碾細半  
夏湯泡七次焙碾等分生薑自然汁調蒸餅和杵  
百下丸梧子大每服十五丸至二十九丸空心溫酒  
或薑湯下婦人醋湯下老人大腸秘瀉防風枳  
殼麩炒一兩甘草半兩爲末每  
食前白湯服二錢消風順氣

### 大腸冷秘

附子一枚炮去皮取中心如棗  
大爲末一錢蜜水空心服之

### 大腸冷積

威靈仙末蜜丸梧子大一更  
時生薑湯下十九至二十九丸

### 夜數如廁

以生薑一兩半夏大棗各三十枚水一升  
甕瓶中慢火燒爲熟水時呷之便已脾惡

濕濕則濡困困則不能治水水勝則  
瀉半夏不言益脾蓋能分水故也

麻子仁丸

治脾約大便秘而小便數麻子仁二升芍  
藥半斤厚朴一尺大黃枳實各一斤杏仁

一升熬碾煉蜜丸梧桐子大每以  
漿水下十丸日三服不知再加

痔病秘結

見痔  
漏門

腸風臟毒

血清者為腸風虛熱生風或兼濕氣血濁者為臟毒積熱食毒兼有濕熱

血大下者為結陰屬虛寒便前為近血便後為遠血又有蟲毒蟲痔

腸風下血

茶篋內箬葉燒存性每服三匙空心糯米湯下或入麝香少許生地黃熟地黃並

酒浸五味子等分為末以煉蜜丸梧子大每酒下七十丸香白芷為末每服二錢米飲下神效

木香黃連等分為末入肥猪大腸內兩頭紮定煮極爛去藥食腸或連藥搗為丸服蒼朮不拘多

少以皂角按濃汁浸一宿煮乾焙碾為末麪糊丸如梧子大每服五十丸空心米飲下日三服血

師一兩火煨米醋淬盡醋一升搗羅如麪每服一錢白湯下荳蔻實一升暴乾搗篩生薑半斤取

汁銀鍋中更以無灰酒二升搜之上火煎如稠飴即旋投酒度用酒可及五升即止慢火煎令可丸

大如梧子每旦酒飲通下三丸增至五七丸止若丸時粘手則以兔絲粉觀隔之火候忌緊藥焦則

失力也初服微熱勿怪疾甚者服過三月當下利疾去利亦止絕有效楨藤子二個不蛀皂莢子

四十九個燒存性為末每服二錢溫酒下少頃再

飲酒一盞趁口服極效 楸藤子三枚厚重者濕

紙七重包煨熟去殼取肉為末每服一錢食前黃

芪湯下日一服 枯樓一個燒灰赤小豆半兩為

末每空心酒服一錢 敗毒菜根洗切用連皮老

薑各半盞同炒赤以無灰酒淬之盞蓋定少頃去

滓任意飲 蜜炙蘿蔔任意食之昔一婦人服此

有效 胡荽子和生菜以熱餅裹食之 百合子

酒炒微赤碾末湯服 經霜茄連蒂燒存性為末

每日空心溫酒服二錢 茄葉熏乾為末每服

二錢米飲下 霜後乾絲瓜燒存性為末空心酒

服二錢 用銀杏煨熟出火氣食之米飲下 橡

斗子殼用白梅肉填滿兩個合定鐵線繫住煨存

性碾末每服二錢米飲下一方用硫黃填滿煨碾

酒服 橄欖核燈上燒存性碾末每服二錢陳米

飲調下 柏子十四個搥碎囊貯浸好酒三盞煎

八分服立止 松木皮去粗皮取裏白者切晒焙

碾為末每服一錢許茶湯下 用長尺皂角切五挺

去皮子酥炙三次碾末精羊肉十兩細切搗爛和

丸梧子大每溫水下二十九 皂莢子槐實一兩

用占穀糠炒香去糠為末陳粟米飲下一錢獨  
子肥皂燒存性一片為末糊丸陳米飲下秋采

楮皮陰乾為末酒服三錢或入麝香少許日二  
枳實半斤麩炒黃芪半斤為末米飲非時服二錢

七糊丸亦可皮鞋底蠶蛻核桃殼紅雞冠花  
等分燒灰每酒服一錢五倍子白礬各半兩為

末順流水丸梧子大每服七丸米飲下忌酒  
藥煎二兩半生用半炒存性為末飯九梧子大每

服五十丸米飲下疆蠶炒去嘴足烏梅肉焙各  
一兩為末米糊丸梧子大每服百丸食前白湯下

一日三服枯桑樹下蟲屎燒存性酒服一錢  
乾蟄炒白礬燒各二兩為末每服半錢米飲下

用活鯽一大尾去腸畱鱗入五倍子末填滿泥固  
煨存性為末酒服一錢或飯丸日二服又用硫黃

一兩如上述法煨服亦可白刺猬皮一枚銚內燂  
焦去皮畱刺木賊半兩炒黑為末每服二錢熱酒

調下不止者茄蒂燒灰米飲服二錢久近腸  
風下血用礬炭三錢枳殼燒存性五錢為末每服  
三錢五更米飲下一服天明再服當日見效忌油

膩毒物積年不止虛弱甚者一服取效綠礬四

兩入砂鍋內新五蓋定鹽泥固濟煅赤取出入青  
鹽生硫黃各一兩碾勻再入鍋中固濟煅赤取出  
去火毒碾入熟附子末一兩粟米粥糊丸梧子大  
每空心米飲溫酒任下三十九丸不拘遠年近日  
用枳殼燒黑存性五錢羊脛炭爲末三錢五更空  
心米飲服如人行五里再一服當日見效又枳殼  
一兩黃連五錢水一鍾煎半鍾空心服便前近  
腎肝便後近心肺皂角刺灰二兩胡桃仁破故紙  
炒槐花炒各一兩爲末每服一錢米飲下大便  
更瀉木饅頭燒枳殼炒等分爲末每服二錢槐花  
酒下用寒藥熱藥及脾弱藥俱不效者獨用山  
裏果乾者爲末艾湯調下應手卽愈有疔瘡瘡  
破者不治馬蘭子一斤碾破酒浸夏三冬七日晒  
乾何首烏半斤雄黃雌黃各四兩爲末以浸藥酒  
打糊丸梧子大每服三十九丸溫酒下日三服見效  
因酒毒者大田螺五個燒至殼白內乾碾末作  
一服熱酒下漏血馬兜鈴藤殼精草荊三稜川  
烏頭炒過三味各等分煎水先熏後洗之失血  
胡孫薑燒存性五錢酒或米飲服

腸風瀉血

木鼈子以桑柴燒存性候冷為末每服一錢煨葱白酒空心服之名烏金散牽牛

五兩牙皂三兩水浸三日去皂以酒一升煮乾焙碾末蜜丸梧子大每服七丸空心酒下日三服下

出黃物不妨病減後日服五丸米飲下黃耆黃連等分為末麪糊丸綠豆大每服三十九米飲下

破絮燒灰枳殼麩炒等分麝香少許為末每服一錢米飲下皂角樹上葦五焙為末每服一錢

溫酒下椿莢半生半燒為末每服二錢米飲下諸藥不效天南星石灰炒焦黃色為末酒糊丸

梧子大每酒下二十九久者威靈仙雞冠花各二兩米醋二升煮乾炒為末以雞子白和作小餅

炙乾再碾每服二錢陳米飲下日二服積年瀉血百藥不瘥敗皮巾子燒灰白礬燒各一兩人指

甲燒焦麝香各一分乾薑炮三兩為末每服一錢米飲下胡荽子炒一合搗末每服二錢白湯下

日二炙野猪肉食之不過十頓痢及瀉血烏龜肉以沙糖水拌椒和炙煮食之多度即愈

久病腸風

石燕磨水常服勿歇痛痒不止者地榆五錢蒼朮一兩水二鍾煎一鍾空心服日

服一

腸風熱毒

蕨菜花焙為末每服二錢米飲下

脾毒腸風

因營衛虛弱風氣襲之熱氣乘之血滲腸間故大便秘下血用臭椿根刮去粗皮焙乾

四兩蒼朮米泔浸焙枳殼麩炒各一兩為末醋糊丸如梧子大每服五十丸米飲下日三服

濕痢腸風

治赤白下痢日夜無度及腸風下血見痢疾門

腸風痔瘻

下血見痔漏門

腸風下蟲

用鰻鱺二斤治淨酒二盞煮熟入鹽醋食之

腸風

治風入臟或食毒積熱大便鮮血疼痛肛出木饅頭燒存性機欄皮燒存性烏梅去核粉草炙

等分為末每服二錢水一盞煎服并治久患酒痢

臟毒下血

五倍子不拘多少為末大鯽魚一枚去腸胃鱗腮填藥令滿入瓶內煅存性為末每