

增注類證活人書卷十三

大柴胡湯

三十

太陽病過十餘日發汗吐下之後四

五日柴胡證仍在者先與小柴胡嘔不止

一云嘔心止小安

心

下急鬱鬱微煩者爲未解也與大柴胡湯下之則愈

○傷寒十餘日熱結在裏往來寒熱者與服○傷寒

發熱汗出不解心中痞鞭嘔吐而下利者此主之

上已

屬太陽

○陽明病汗多者急下之宜服○少陰病下利

清水心下痛口乾者可下之宜大柴胡大承氣湯○

病腹中滿痛此爲實當下之宜大承氣大柴胡湯○

腹滿不減減不足言當下之宜大柴胡大承氣湯○

傷寒後脉沈者內實也下之解宜服。傷寒六七日
目中不了了睛不和無表裏證大便難身微熱者實
也急下之宜大承氣大柴胡湯。太陽病未解脉陰
陽俱停必先振慄汗出而解但陰脉微者下之而解
宜服。病人無表裏證發熱七八日雖脉浮數者可
下之大柴胡湯主之。病人煩熱汗出則解又如瘧
狀日晡所發熱者屬陽明脉實者可下之大柴胡大
承氣湯主之。屬可下
病脉證

柴胡

四兩

黃芩

芍藥

各一兩半

半夏

一兩一分洗

枳實

二枚去穰炒千金云枳實去穰一分準二枚

右剉如麻豆大每服抄五錢匕生薑四片棗子

一枚水一盞半煮至八分去滓溫服以利為度未利

再服本方無大黃欲下者加大黃一兩

柴胡桂枝湯三十一傷寒六七日發熱微惡寒支節煩

頭疼微嘔心下支結外證未去者此主之屬太陽○發

汗多亡陽譫語者不可下與此藥和其榮衛以通津

液後自愈屬發汗後病脈證

柴胡一兩三錢桂枝去皮黃芩

人參各半兩芍藥各半兩半夏四錢一字洗

甘草三錢一字炙



右剉如麻豆大每服抄五錢匕生薑四片棗子一枚水一盞半煮至八分去滓溫服

柴胡桂枝乾薑湯 三十二 傷寒五六日已發汗而復下

之胃脇滿微結小便不利渴而不嘔但頭汗出往來

寒熱心煩者此爲未解也宜服之

屬太陽

柴胡 四兩

桂枝 去皮

黃芩 各一兩半

牡蠣 熬

甘草 炙

乾薑 各一兩

栝樓根 二兩

右剉如麻豆大每服抄五錢匕水一盞半煮至八分去滓溫服食頃再服

柴胡加龍骨牡礪湯

三十三

傷寒八九日下之胃滿煩

驚小便不利讖語一身盡重不可轉側者此主之太屬

陽

柴胡

黃芩

龍骨

各一兩

鉛丹

人參

桂枝

各三分

牡礪

一分半熬

茯苓

半夏

半合洗

大黃

半兩

右剉如麻豆大每服抄五錢匕生薑四片棗子三

枚水一盞半煮至八分下大黃煎一二沸去滓溫

服

又見辯誤

柴胡加芒硝湯 三十四 傷寒十三日不解胸脇滿而嘔

日晡所發潮熱已而微利此本柴胡證下之而不得

利今反利者知醫以丸藥下之非其治也潮熱者實

也先宜小柴胡湯以解外後以此主之

柴胡 一兩 三錢

黃芩

甘草 炙

人參 各半 兩

半夏 四錢 一 字洗

芒硝 一兩

右剉如麻豆大每服抄五錢匕生薑二片棗子二

枚水一盞半煮至八分去滓下硝更上火二三沸

溫服

大青龍湯 三十五

太陽中風脉浮緊發熱惡寒身疼痛



不汗出而煩躁者大青龍湯主之若脉微弱汗出惡風者不可服服之則厥逆筋惕肉瞤此爲逆也○傷寒脉浮緩身不疼但重乍有輕時無少陰證者大青龍湯發之

麻黃

三兩去節湯泡去黃汁焙乾秤

桂枝

一兩去皮

甘草

一兩炙

杏仁

二十枚去皮尖

石膏

如雞子大一塊碎綿裹

右剉如麻豆大每服抄五錢匕生薑四片棗子三枚水一盞半煮至八分去滓溫服取微似汗不須汗多恐亡陽故也若汗多不止用溫粉撲之

溫粉方

白朮

藁本

川芎

白芷

各等分

右搗羅爲細末每末一兩入米粉三兩和之粉撲
周身止汗無藁本亦得若汗已出後盡劑服汗多
亡陽遂逆惡風煩躁不得眠也

小青龍湯

三十六

傷寒心下有水氣欬而微喘發熱不

渴服湯已渴者此寒去欲解也此主之○傷寒表不
解心下有水氣乾嘔發熱而欬或渴或利或噎或小
便不利小腹滿或喘者此主之

芍藥

桂枝

去皮

乾薑

炮

甘草炙

細辛

各一兩半

五味子

一兩別本或加一分

半夏

一兩半湯洗若渴者去半夏加栝樓根一兩半

麻黃

一兩半微利者去麻黃加薤花如一彈子熬令赤色若噎者去麻黃加附子半箇泡若小便不利小腹滿者去麻黃加茯苓二兩若喘者去麻黃加杏仁一兩半去皮尖

麻黃湯泡

右剉如麻豆大每服抄五錢匕水一盞半煮至八

分去滓溫服

杏仁半夏二味或各作一兩一分

小建中湯

三十七

傷寒陽脉濇陰脉弦法當腹中急痛

先與小建中湯不差者小柴胡湯主之○傷寒二三

日心中悸而煩者宜服

芍藥

三兩

甘草

炙一兩

桂枝

去皮一兩半

膠飴

半升舊有微糖或嘔者去膠飴局方加黃耆一兩半為黃耆建中湯

右剉如麻豆大每服抄五錢匕水一盞半生薑四

片大棗子一枚煮至八分去滓下膠飴兩匙許再

煎化溫服日三服夜二服尺脉尚遲再作一劑加

黃耆末一錢

煎造膠飴法

糯米

一升揀淘淨

大麥蘖末

六兩

右米一如炊飯甑上至氣溜取下傾入一盆子入

藥末一合并湯一盞來許拌和再上甑至飯熟却



入盆子內。都以藥末拌和。入一甕罐子。可容五升。
許。冬月罐子熱。春秋夏溫。冬月用湯二升許。入罐
子內。約內面飯上湯三指許。卽得布并紙三五重。
蓋定。更以綿或絮抱定。近火。春秋夏卽溫和。至一
宿。見米浮在水面上。卽以布絞裂。取清汁。銀石器
內煎。至面上有膜。卽以木篦不住手攪。至稀糊。以
甕器收。夏月置井中。庶不酸。

大陷胃湯

三十八

太陽病。脉浮而動數。浮則爲風。數則

爲熱。動則爲痛。數則爲虛。頭痛發熱。微盜汗出。而反
惡寒。表未解也。醫反下之。動數變遲。膈內拒痛。胃中

空虛客氣動膈短氣躁煩心中懊懣陽氣內陷心下
因鞭則爲結胃大陷胃湯主之若不結胃但頭汗出
餘處無汗劑頸而還小便不利身必發黃○傷寒六
七日結胸熱實脉沈而緊心下痛按之石鞭者宜服
○傷寒十餘日熱結在裏復往來寒熱者與大柴胡
湯但結胸無大熱者此爲小結在胸脇也但頭微汗
出者此主之○太陽病重發汗而下之不大便五六
日舌上燥而渴日晡所小有潮熱從心下至小腹鞭
滿而痛不可近者此主之○傷寒五六日嘔而發熱
者柴胡湯證具而以他藥下之柴胡證仍在者復與

陽屬太

柴胡湯此雖已下之不為逆必蒸蒸而振却發熱汗出而解若心下滿而鞭痛者此為結胸也此主之

大黃

一兩半去皮
錦文者為末

甘遂

一字赤連珠
者細羅為末

芒硝

五分

右以水二盞先煮大黃至一盞去滓下消一沸下

甘遂末溫服得快利止後服

又大陷胃湯方

桂枝

一兩

甘遂

一兩或
作半兩

大棗

一兩或
作三枚

人參

一兩

栝樓實

一枚去皮只
用四分之一

右剉如麻豆大每服五錢匕水一盞或作二盞煮至八分去滓溫服胃中無堅物勿服之

大陷胸圓

三十九又見辯誤

病發於陽而反下之熱入因作結

胃病發於陰而反下之

一作汗出

因作痞也所以成結胸

者以下之太早故也結胸者項亦強如柔痙狀下之

則和宜此藥主之

屬太陽

大黃

二兩或作四兩

芒硝

三分

杏仁

三分去皮尖熬黑

苦葶藶子

三錢熬

右搗羅二味內杏仁芒硝合研如脂丸如彈子大每服一丸抄甘遂末半錢匕白蜜一合水二盞煮

取一盞頓服一宿乃下如不下再服

甘遂性猛宜斟酌量虛實服

之

小陷胃湯

四十又見辯誤

小結胃病正在心按之則痛脉浮

滑者此主之

屬太陽

半夏

湯洗秤一兩半

黃連

一兩

栝樓

一枚去皮或作半枚

右剉如麻豆大水二盞先煮栝樓至一盞半下諸

藥煎至八分去滓溫服未知再服微利黃涎便安

大承氣湯

四十一

陽明病脉遲雖汗出不惡寒者其身

必重短氣腹滿而喘有潮熱者此外欲解可攻裏也

手足濇然汗出者此大便秘也此藥主之若汗多

微發熱惡寒者外未解也

桂枝湯

一法與其熱不潮未可與

承氣湯若腹大滿不通者可與小承氣湯微和胃氣
勿令大泄下。○陽明病潮熱大便微鞭者可與此藥
不鞭者不可與之。○傷寒若吐若下後不解不大便
五六日上至十餘日日晡所發潮熱不惡寒獨語如
見鬼狀若劇者發則不識人循衣摸牀惕而不安微
喘直視脉弦者生濇者死微者但發熱譫語者此主
之若一服利則止後服。○陽明病譫語有潮熱反不
能食者胃中必有燥屎五六枚也若能食者但鞭耳
宜服。○陽明病下血譫語者此爲熱入血室但頭汗

出者刺期門。隨其實而瀉之。澌然汗出則愈。汗出讖語者以爲有燥屎在胃中。此爲風也。須下者過經乃可下之。下之若早。語言必亂。以表虛裏實故也。下之愈宜服。○二陽併病。太陽證罷。但發潮熱。手足絳絳汗出。大便秘難。而讖語者。下之則愈。宜服。○陽明病下之心下懊懣而煩。胃中有燥屎者可攻。腹微滿。初頭鞭後必澹。不可攻之。若有燥屎者宜服。○病人煩熱汗出則解。又如瘧狀。日晡所發熱者。屬陽明也。脉實者宜下之。脉浮虛者宜發汗。下之與大承氣發汗宜桂枝湯。○大下後六七日不大便。煩不解。腹滿痛者。