

正體驗要

薛氏醫酉按

正體類要序

世恒言醫有十三科科自專門各守師說少能相
通者其大較然也然諸科方論作者相繼纂緝不
遺而正體科獨無其書豈非接復之功妙在手法
而按揣之勞率鄙爲粗工而莫之講歟昔我
教皇帝因馬逸傷諸尚藥以非世業莫能治獨吾蘇
徐通政鎮侍藥奏效

聖體如初而徐亦由此遭際擢官至九列子孫世以
其術仕醫垣此其所繫豈小小者而可以弗講也
且肢體損于外則氣血傷于內繫衛有所不貫藏

府由之不和豈可純任手法而不求之脉理審其
虛實以施補瀉哉太史公有言人之所病病疾多
醫之所病病道少吾以爲患在不能貫而通之耳
秦越人過琅琊卽爲帶下醫過洛陽卽爲耳目痺
醫入咸陽卽爲小兒醫此雖隨俗爲變豈非其道
固無所不貫哉立齋薛先生以癰疽承家而諸科
無所不治嘗病正體家言獨有未備間取身所治
驗撿而集之爲正體類要若干卷極變析微可謂
詳且盡矣而處方立論決生定死固不出諸科之
外也新刻學者又豈病道之少乎先生嘗著外科

相要
余帶
先生
其勿
詳外
科樞
要序
中茲
不更
列吐
痰者
肝火
傳而
也

前進士禮部主事陸師道著有胸腹脹痛大便不

通喘咳吐血者瘀血停滯也用當歸導滯散通之因

經云肝藏血脾統血蓋肝屬木主火傷主肝火既熾

血必傷脾氣必虛宜先清肝養血則瘀血不致凝

滯肌肉不致遍潰大壯脾胃健胃則瘀肉易消

虛實以施補瀉哉太史公有言人之所病病疾多
醫之所病病道少喜以爲患在不能貫而通之耳
秦越人過琅琊卽爲帶下醫過洛陽卽爲耳目痹
而張士黠濟主事劉疇戲謂隨俗爲變益非其道
韓休亦蘇軾事中茲不更以難疽承家而諸科
其心以車轡兩難辨夫士亦以字彙東官並出
我主士亦無祖不與而未嘗不出于十一也學皆
余帶士亦以文體以數爲蘇嫂語卷首軒軒吐
蘇要士亦以文體以數爲蘇嫂語卷首軒軒吐

正體類要上卷

吳郡薛已著

新都吳玄有校

正體主治大法

一脇肋脹痛若大便通和喘咳吐痰者肝火侮肺也
用小柴胡湯加青皮山梔清之若胸腹脹痛大便不
通喘咳吐血者瘀血停滯也用當歸導滯散通之內
經云肝藏血脾統血蓋肝屬木生火侮土肝火既熾
肝血必傷脾氣必虛宜先清肝養血則瘀血不致凝
滯肌肉不致遍潰次壯脾健胃則瘀肉易潰新肉易

生若行剋伐則虛者益虛滯者益滯禍不旋踵矣

一肚腹作痛或大便不通按之痛甚瘀血在內也用
加味承氣湯下之既下而痛不止按之仍痛瘀血未
盡也用加味四物湯補而行之若腹痛按之不痛血
氣傷也用四物湯加參芪白朮補而和之若下而胸
脇反痛肝血傷也用四君芎歸補之既下而發熱陰
血傷也用四物參朮補之既下而惡寒陽氣傷也用
十全大補湯補之既下而惡寒發熱氣血俱傷也用
八珍湯補之既下而欲嘔胃氣傷也用六君當歸補
之既下而泄瀉脾腎傷也用六君白朮故紙補之

湯吐瀉手足俱冷指甲青者脾腎虛寒之甚也急用
大劑參附湯口噤手撒遺尿痰盛唇青體冷者虛極
之壞症也急投大劑參附湯多有得生者

一肌肉間作痛營衛之氣滯也用復元通氣散筋骨
作痛肝腎之氣傷也用六味地黃丸內傷下血作痛
脾胃之氣虛也用補中益氣湯外傷出血作痛脾肺
之氣虛也用八珍湯大凡下血不止脾胃之氣脫也
吐瀉不食脾胃之氣敗也苟預爲調補脾胃則無此
患矣

一、作痛若痛至四五日不減或至一二日方痛欲作
膿也用托裏散若以指按下復起膿已成也刺去其
膿痛自止若頭痛時作時止氣血虛也痛而兼眩屬
痰也當生肝血補脾氣

一、青腫不消用補中益氣湯以補氣腫黯不消用加
參逍遙散以散血若癰腫脹痛瘀血作膿也以八珍
湯加白芷托之若膿潰而反痛氣血虛也以十全大
補湯補之若骨節接而復脫肝腎虛也用地黃丸腫
不消青不退氣血虛也內用八珍湯外用葱熨法則
瘀血自散腫痛自消若行血破血則脾胃愈虛運氣

一發熱若出血過多或潰膿之後脉洪大而虛重按
全無此陰虛發熱也用當歸補血湯脉沉微按之軟
弱此陰盛發躁也用四君薑附若發熱煩躁肉瞤筋
惕亡血也用聖愈湯如汗不止血脫也用獨參湯其
血脫脉實汗後脉躁者難治細小者易治外臺秘要
云陰盛發躁欲坐井中用附子四逆湯加葱白王太
僕先生云凡熱來復去晝見夜伏夜見晝伏不時而
動者名曰無火此無根之虛火也

一作嘔若因痛甚或因剋伐而傷胃者用四君當歸

半身生薑或因忿怒而肝傷者用小柴胡湯加山梔
茯苓若因痰火盛用二陳薑炒黃連山梔若因胃氣
虛用補中益氣湯生薑半夏若出血過多或因潰後
用六君子湯加當歸

一喘咳若出血過多面黑胸脹或胸膈痛而發喘者
乃氣虛血乘於肺也急用二味參蘇飲若咳血衄血
者乃氣逆血蘊於肺也急用十味參蘇飲加山梔
連蘇木

一作通若因出血過多用四物參朮如不應用人參

黃芪以補氣當歸熟地以養血若因潰後用八珍湯

若胃
新傷津液用竹葉黃芪湯胃虛津液不足
中益
氣湯胃火熾盛竹葉石膏湯若煩熱作渴小便
淋瀝
乃腎經虛熱非地黃凡不能救

一出
血若患處或諸竅出者肝火熾盛血熱錯經而
妄行
也用加味逍遙散清熱養血若中氣虛弱血無
所附
而妄行用加味四君子湯補益中氣或元氣內
脫不
能攝血用獨參湯加炮薑以回陽如不應急加
附子
或血蘊於內而嘔血用四物加柴胡黃芩凡傷
損勞
碌怒氣肚腹脹悶誤服大黃等藥傷陽絡則爲
吐血
衄血便血尿血傷陰絡則爲血積血塊肌肉青

此臟腑虧損經隧失職急補脾肺亦有生者但患者不悟此理不用此法惜哉

一手足傷損若元氣虛弱或不戒房勞或妄行攻伐致死肉上延或腐而不痛黑而不脫者當大補元氣庶可保生若手足節髀斷去者無妨骨斷筋連不急剪去若侵及好肉則不治若預爲調補脾氣則無此患大凡膿瘍內燉者即針之而投托裏散或口噤遺尿而似破傷風者急用十全大補湯加附子多有生者

一腐肉不潰或惡寒而不潰用補中益氣湯發熱而

當歸其外皮黑堅硬不潰者內火蒸炙也內服八珍
湯外塗當歸膏其死肉不能潰或新肉不能生而致
死者皆失於不預補脾胃也

一新肉不生若患處天白脾氣虛也用六君芎歸患
處緋赤陰血虛也用四物參朮若惡寒發熱氣血虛
也用十全大補湯膿稀白而不生者脾肺氣虛也用
補中益氣湯膿稀赤而不生者心脾血虛也用東垣
聖愈湯寒熱而不生肝火動也用加味逍遙散晡熱
而不生肝血虛也用八珍牡丹皮食少體倦而不生

脾胃氣虛也用六君子湯膿穢而不生者陰虛邪火
也用六味地黃丸四肢困倦精神短少而不生者元
氣內傷也用補中益氣湯如夏月用調中益氣湯作
瀉用清暑益氣湯秋令作瀉用清燥湯

一傷重昏憤者急灌以獨參湯雖內瘀血切不可下

急用化毒石散內化之恐因瀉而亡陰也若元氣虛
甚者尤不可下亦用以前散化之凡瘀血在內大小
便不通用大黃朴硝血凝而不下者急用木香肉桂
末三二錢以熱酒調灌服血下乃生如怯弱之人用
硝黃須加肉桂木香同煎假其熱以行其寒也一

一、大便秘結者，大膽汁導之。若腎虛火燥者，用六味地黃丸。
腸胃氣虛，用補中益氣湯。

一、傷損症，用黑羊皮者，蓋羊性熱能補氣也。若杖瘡傷甚，內肉已壞，欲其潰者，貼之成膿，固速。苟內非補劑，壯其根本，毒氣不無內侵。外非砭刺，泄其瘀穢。良肉不無傷壞。若受刑輕，外皮破傷者，但宜當歸膏敷貼，更服四物、芩連、柴胡、山梔、白朮、茯苓，又一疔入結傷肉，不潰死血自散，腫痛自消。若槩行罨貼，則醞釀瘀毒矣。

一跳躍挺胸閃挫舉重勞役恚怒而胸腹痛悶喜手
摸者肝火傷脾也用四君柴胡山梔畏手摸者肝經
血滯也用四物柴胡山梔桃仁紅花若胸脇作痛發
熱哺熱肝經血傷也用加味道遙散若胸脇作痛飲
食少思肝脾氣傷也用四君芍歸柴梔丹皮若胸腹
脹滿飲食少思肝脾氣滯也用六君加柴胡芍歸若
胸腹不利食少無寐脾氣鬱結也用加味歸脾湯若
痰氣不利脾肺氣滯也用二陳白朮芍歸梔天
青皮
若咬牙發搐肝旺脾虛也用小柴胡湯用芍
麻鈎藤鈎或用風藥則肝血益傷肝火益甚
飲糖