

校正醫學入門

上海掃葉山房印行



編註醫學入門外集卷之六

婦人門

經候

經病百端血滯枯婦人以血為主天真氣降王癸水合腎氣全盛血脈流行常以三旬一見及氣月盈則或內傷生冷七情鬱結為痰凝滯於中曰血滯或經止後用力太過入房太甚及服食燥熱以致火動邪氣盛而津血衰曰血枯良方云經後被驚則血氣錯亂妄行逆於上則從口鼻而出逆於身則水血相搏變為水腫甚則氣血逆於腰腿心腹背脇手足之間重痛經行則發過期則止怒極傷肝則有血暈嘔血瘰癧血風瘡瘍等病加之經血滲漏於其間遂成竅穴生瘡淋瀝不絕濕熱相搏遂為崩帶血結於內變為癥瘕凡此變症百出不過血滯與枯而已但血滯亦有虛熱血枯亦有虛寒宜破血枯補虛亦有虛熱故重則經閉不通以滯枯分言輕則經水不調止言虛與熱而已滯宜破血枯補虛宜破者原因飲食熱毒或暴怒凝滯積痰直須大黃乾漆之類推陳致新俾舊血消而新血生也若氣旺血枯起於勞役憂思却宜溫和滋補或兼有痰火濕熱尤宜清之涼之每以肉桂為佐者熱則血行也但不可純服峻藥以虧陰道至於耗氣益血之說雖女科要法但血為氣配氣熱則熱氣寒則寒氣升則升氣降則降氣行則行氣滯則滯如果氣虛火氣盛於血者方可單香附丸散仰氣散當加木香枳殼以開鬱行氣若氣亂則調氣冷則溫氣虛則補男女一般陽生則陰自長氣衰則血亦涸豈可常耗其氣耶論者多泥叔和血旺氣衰不知叔和論肝肺二脉則宜肝旺於肺其寔氣血平和有孕故經曰兩臟通和但婦人見偏性鄙婢妾志不得伸鬱怒無時不起故香附為女帶因外感傷冷鬱經行登則風寒入內以致凝滯者人仙藥經曰邪氣盛則寔正氣奪則虛可不悟諸帶因外感傷冷鬱經行登則風寒入內以致凝滯者閉不通或寒或暑俱謂之熱入血室下柴胡湯加生地或黃芩芍藥湯加生地經行過食生冷或外被冷濕以致瘀血凝結者五積散去麻黃加牡丹皮紅花〇七情心氣鬱結不行者分心氣飲去菴活半夏桑皮青皮加川芎當歸香附義木玄胡索有也

有盛寔次宣疏或馬鞭草取汁熬煎為丸或燒存性紅花當歸煎枯傷勞食或作泄益氣湯加川芎生地天花粉有腸鳴月水不來者病在胃胃虛不生血氣宜單厚湯下枯傷勞食或作泄益氣湯加川芎生地天花粉有腸鳴月水不來者病在胃胃虛不生血氣宜單厚朴五錢空心水煎或單蒼朮膏水泄少食者升陽益胃湯無泄少食者仁陳湯加白濕疫胃熱分肥瀝木黃芪便製香附當歸芍藥牡丹皮麥門冬山查麥芽因飲食積者更加義木枳殼濕疫胃熱分肥瀝

粘住血海地位經閉者導痰湯加川芎黃連不可服地黃泥膈故也如用須薑汁炒過○胃熱消渴善食

漸瘦津液為熱燥渴者宜瀉胃熱四物湯合調胃承氣湯名玉燭散再合涼膈散名三和散輕者小柴胡

湯合四物湯去人參半夏加天花粉○素虛形瘦口燥善食厚味鬱為痰火有潮者道遙散加脫血入房

黃芩無薄荷四物湯加桃仁紅花或加味養榮丸大柴肥人多氣弱有濕痰瘦人多血怯有火脫血入房

胞氣竭少年大脫血或醉後入房氣或產育過勞動墮胎及多產育傷血或誤服汗下起或不通

概只如此紅花當歸散紫葳散通經丸導經丸之類虛者只用當歸散以通之通後又須養血益陰使津

液流通苟不務氣血充和而惟以毒藥攻通是求千金不調前後色何如易狀或只差一二日者亦不

乞巧必死而後已○以上言經水不通以下言經水不調不調前後色何如易狀或只差一二日者亦不

為害必色言之心主血陰從陽故以通經丸後期來少血不足後期三五日者為血虛四物湯加參朮陳皮

色紅為正雖不對期而色正者易調後期來少血不足後期三五日者為血虛四物湯加參朮陳皮

花肥人多痰二陳湯加南星蒼朮滑石芎歸香附○來少色和者四物湯點滴欲開朝頃脈數者四物湯

去芎地加澤蘭葉三倍甘草少許十味香附丸內寒血溢來少或曰少五六日以上者四物湯加桃仁紅

皮牡丹先期來多血有餘四物湯加黃芩柴胡香附肥人清海蒼朮沙凡加痰連白朮○來多或曰多五六

日以上者內熱血散也四物湯加黃芩瘦人或有前或後氣血漏一月再至當歸散調經散散丹參散淋瀝

有火者固經丸肥人多痰者清海蒼朮沙丸或前或後氣血漏一月再至當歸散調經散散丹參散淋瀝

不斷邪未疎時行時止淋瀝不斷腹中作疼乃寒熱邪氣客於胞中留滯血海外疼也如有積下利不定

腹痛者半膝散或行或止心痛者失笑散經水適來適斷往來寒熱者先服小柴胡湯加地黃後以四物

湯和之有月事頻數者四物湯倍芍藥加黃芪有經行不止者四物湯加地榆阿膠荊芥熱者倍黃芩或

吞固風熱色紫甚則黑淡因痰滯濕模糊色紫者風也黑者熱甚也淡白者虛也或痰瘀停水以混之也

經片色不變者氣滯也或風冷乘之也色變紫黑者血熱也○大概紫者四物湯加防風白芷荊芥黑者

四物湯加芩連香附淡白者古芎歸湯加參芪白芍香附有痰者二陳湯加芎歸如煙塵者二陳湯加秦

先防風蒼朮如豆汁者四物湯加芩連成塊者四物湯加香附玄胡外症潮熱內腹痛作而有子若兼朝

索積殼陳皮隨症選用○通用琥珀調經丸百子附歸丸黑附丸

以必先去病而後可以滋血調經就中潮熱疼痛尤為婦女常病益血滯積入骨髓便為胃蒸血滯積於中是

於中與日生新血相搏則為疼痛血枯不能滋養百骸則骨熱於外血枯胞絡火盛或挾痰氣食積寒冷
外邪則為疼痛○潮熱有時為內傷為虛無時為外感為寔症者大溫經湯熱者四物湯加柴胡經閉者
滋經湯骨蒸者天胡連天烏雞丸五心潮者四物湯加黃連胡黃連無汗者茯苓補心湯有汗者逍遙
散經前潮者血虛有滯道遠散加牡丹皮桃仁玄胡索經後潮者血虛有熱逍遙散去柴胡換地骨皮
生地便炒黃芩此乃能加減退熱聖藥有咳如桑白皮貝母桔梗知母麥門冬咳血加生地山梔牡丹皮
嘔血加陳皮半夏旋覆花噎膈加薑炒黃連或岑連二陳湯尋常潮熱者腎氣丸大造丸或四物湯加
便炒黃芩各一兩四痛滯經前虛後呼此言腹痛也經事欲行臍腹絞痛者為血滯四物湯行時痛者為
製香附一斤蜜丸服

氣滯烏藥丸氣滯血瘀者大玄胡索散或四物湯加桃仁紅花莪朮玄胡索香附木香發熱加柴胡經水
將來陣痛陣止者為血寔四物湯加玄胡索木香黃連香附腿腹痛者內補當歸丸經水將行被風冷痛
搏繞臍疝痛者乃寒氣客於血室大溫經湯桂枝桃仁湯經水日來時痛者四物湯加陳皮玄胡索牡丹
皮甘草○經後痛者為血虛○物湯小烏雞丸歷年血寒積結胞門嘔吐涎唾臍脇痛加陳皮玄胡索牡丹
而痛者酒煮當歸丸大溫經湯○通用水腫經前血腫後經水斷而後腫名曰血分乃瘀血化水閉塞
交加地黃丸滋陰百補丸七製香附丸

經散等歸丸先浮腫而後經水不通名曰水分乃脾不能制血與水并浮肌肉為之虛腫紅紫九血風身
通用腎氣丸水分若澤瀉加防己葶藶木通血分若牡丹皮加牛膝紅花有經閉肝腫者桑皮散
痛痺皮膚血風乃氣血虛而襲風冷身體屈節痛者大芩藟散麒麟竭九越痛散加蒼耳白芍經先期者
蒼耳九加蒼耳白芍龜板金毛狗脊經後期者逍遙散皮膚瘙癢者四物湯加荊芥或古烏荆丸肌肉頑
痂者烏頭丸上攻頭目暈倒者單蒼耳散頭項脊痛者柴胡調經湯頭身痛寒熱咳嗽怔忡一切雜症人
參荆芥散素虛者安金丹史

國公浸酒方胎前產後皆同養胃通心真要法胞內為經絡之海與手太陽小腸手少陰心為表裡主上
為乳汁下為月水月水乃經絡之餘衝任氣枯則血依時而下憂思耗傷心血以致火炎血不歸肝而出
納之用已竭母令子虛脾亦不磨而食少食少則肺金失養水絕生化之源而經閉不調治者須知心為
氣血之主心氣鬱結者宜調心血通心經而血自行脾胃為氣血之運飲食勞倦損其中氣以血少不
行或行之間斷者只宜平胃散四君子湯之類補養脾胃而氣血自生自運乃標本兼治法之良者也
女扶陰抑寡居女子十四衝任盛而月事下必近二十方可匹配可見陰氣之難成也或恣食鹹酸煎炒
熱燥以致氣血上壅不通者紅花當歸散紫葳散單大黃當如逾年未嫁或年未及而思

男思傷心血大炎脾虧肺燥腎枯而血閉成癆者十分難治宜四物湯加黃芩柴胡或逍遙散加山梔
連以養血涼血降火或腎氣丸加子芩紅花養陰栢子丸亦好因志逆者四製香附丸加黃芩生地因驚
醫學
經候
上海常樂山房及印

者胞胆丸經絕不通者夏松散○寡婦鬱悶百端或暴夫不能頃忘或門戶不能支持或望子孫昌盛心
火無時不起加之飲食厚味遂成痰火其症惡風體倦乍寒乍熱面赤心煩或時自汗肝脉弦長當抑肝
之陰氣藥用胡肝湯柳陰地黃丸越婢丸如貧苦次食者四製香附丸主之有每日上午神思昏憤
明處惡聞人語至午後方可及頭昏腹痛驚惕稍涉勞動與月經來時其症尤劇此不得遂志之故也宜
清神養榮四物湯加人參扶神陳皮柴胡羌活甘草香附有與鬼交通者由神不守舍或時獨笑或夢寐
遲伏或如雀啄不知度數顏色不變者宜扶神羌活蔓荊子防風薏苡仁黃芪五味子麥門冬石菖蒲黃
芩甘草
水煎服

崩漏

崩漏有虛亦有熱熱則流通虛溜泄血熱則流虛則溜凡非時血行淋瀝不已謂之漏下虛之房勞挾火

邪經行犯房及勞役過度損傷衝任氣血俱虛不能制約經血忽然暴下宜大補氣血大溫經湯氣虛者

四物湯加參芪血虛者四物湯加膠艾炒乾薑久不止者百子附歸丸墨附丸虛寒臍腹冷痛者飲龍

肝散一切虛症內受散虛火涼血地黃湯生地熱則飲食不調即有因膏梁厚味以致脾濕下流於腎與

黃芩湯補陰丸久者當歸部骨丸大小烏雞丸熱則飲食不調即有因膏梁厚味以致脾濕下流於腎與

真宜解毒四物湯涼血地黃湯膠艾四物湯加黃芩或單芩心丸四物坎離丸固經丸○有因飲食失節

火乘脾胃下臨顏容似無病者外見脾困倦煩熱不卧等症經水不時暴至或適來適斷只宜舉養脾胃

加以鎮墜心火之藥補陰瀉陽或因四氣苦相侵子宮為四氣相搏則血亦難停大極風冷搏動者五積

加止升陽調經湯并陽舉經湯或四氣苦相侵子宮為四氣相搏則血亦難停大極風冷搏動者五積

四物湯加荊芥○寒冷所乘及年老久崩者伏龍肝散如附子鹿茸阿膠補或為悲憂心痛切悲哀甚則

黃糖米糊丸服○暑月單芩心丸或益元散加百草霜○濕者升陽除濕湯或為悲憂心痛切悲哀甚則

先絕則陽氣內動發則心下崩數洩血也宜備金散四製香附丸烏藥湯或橘歸丸○憂鬱因先富後貧

分順後逆心不足鬱大旺於血脉之中宜四物湯加香附白朮各一錢地榆黃芪人參各五分升麻二

後血過多心痛者亦同用烏賊魚墨炒為末醋湯調服○勢急須宜止且行經曰陰搏陽謂之崩言屬熱

故道渾多心行遠止便有積瘀凝成窠臼不止又恐昏暈必先服五靈脂末一錢其性能行能止然後分
虛熱用調和氣血之約一二貼後再服單五靈脂散去故生新如更不止為紗帽散干反散古黑神散單
黃粘草膏有火者固養胃安心還舊血血崩已後宜四物湯加炒乾薑調之氣弱加參芪有鬱加香附挾
經丸虛者女金丹

發如脾胃氣弱者補中益氣湯心神不安者寧神膏滋陰寧神湯此疾有心血不足者有心火亢甚者若不早治變為白濁白淫血枯發熱不可治矣

帶下

帶下赤白皆濕熱 膈腹痛甚 濕熱結 經曰小腹寬熱洩出白液寬者濕熱屈曲凝滯結於小腹自胞之而

頭昏目眩口苦舌乾咽嗌大便或閉或澀小便澀皆熱症也如赤白痢濁一服但不痛耳痛有痛金濕熱

佛醫甚則肚腹引痛婦人服食燥熱性行乖戾以致肝旺脾虧而生濕熱熱則流通古人有丹草水丸下

之繼以淡劑導之或苦練九大玄胡索散調之如膈腹痛者熱多瘦婦必潮煩 瘦人多熱肝火盛也

暫以辛溫開導如大溫經湯補經固真湯龜相羗丸是也 熱多瘦婦必潮煩 乃陰虛火盛也

九帶不止者用地骨皮一兩生地五兩酒十盞煎至三盞分三次服或白芷散單益母丸○白帶 藥痛風者二陳湯加蒼柏南星牛膝川芎兼頭風鼻涕者蒼柏辛芍散兼七情者側柏樗皮丸

黃痰作孽 肥人多濕身黃脾緩陰戶如水或痛白帶升陽燥濕湯四炒固真丹○濕痰流下滲入膀胱

液下數九候鬱積開服苓朮芍藥丸○通經五苓散○四物湯或單樗白皮炒為末酒糊丸血 虛如四物湯氣虛加參朮陳皮火動加黃柏滑久加龍骨赤石脂性燥如黃連腹痛加乾薑 間有虛寒

帶臭腥陰中冷痛何曾歇 經因月水淋瀝不已或崩中暴下或經後去血過多以致陰虧陽竭禁氣不升

建中湯去桂加當歸水煎吞若練丸久不止臍腹引陰冷痛者東垣固真丸虛中有火者補經固真湯大

烏雞丸常用氣虛四君子湯血虛四物湯有火加黃柏有寒加桂附○寒始因亡血復亡其陽七氣虛極

帶下腥臭多悲不樂附桂湯腹痛陰冷者四物湯加桂 外感風邪傳各經風邪入於胞門或中經脈流傳

附常用酒者當歸丸小烏雞丸金斯丸琥珀調經丸 一種白淫思慮切 思慮無窮所願不得意淫於外

赤如紅津肺經白形如涕脾經黃如爛爪腎經黑如蚬 入房太甚發為筋痿久為白淫

血宜胃風湯或五積散去麻黃主之通用單地榆散 謂白物淫如白精之狀不可誤作白帶過服熱藥又有日夜流津如清米泔或如藕膠者謂之白崩與白

淫大同多憂思過度所致誠難治療宜平補銷心丹因思傷脾胃者四七湯下白丸于或歸脾湯痞悶少

食者沉香降氣湯因勞傷腎氣心腎不交者 室女胎產法相同 室女經水初下一時驚悸或浴以冷水或

金鎖正元丹小兒絲子丸咸喜丸疏苓丸 當風取涼故經水止而即患帶下宜琥珀

硃砂丸○孕婦帶下全是濕熱宜芩朮樗皮丸○平時陰陽過多產後亡血及下虛風補衛調脾循故轍

邪乘虛入於胞絡宜煖宮丸加薑附吳茱或黃芪建中湯去桂加當歸水煎吞苦練丸

醫學入門 卷六 崩漏 帶下 上海婦葉山房校印

治蟲者三虫聚而食血之象即癰瘕之甚者肚腹急硬如石腫滿如水乃癰結胞門或產後為水與血搏
通用四香散千金桃仁煎內消散蝦蟇煮肚法抱麝丸黃米丸單腹盡脹者大腹皮飲救之詳男科腫
類調氣破血漸消除虛者還宜補脾胃善治癰瘕者調其氣而破其血消其食而豁其痰衰其大半而止
之由名也愈後宜大小烏雞丸八珍湯交加散交加地黃丸調之凡攻擊之藥病
重病受病輕胃氣受之而傷矣或云待塊消盡而後補養則胃氣之存也幾希

胎前

胎前清熱與養血

婦人無病月事時下乃能受孕氣血充實則可保十月分娩子母無虞若血不足榮養其胎宜預服八珍湯補養氣血以防之免其墮墮或原有熱而後受孕或孕後挾熱及七情勞役動火輕則胎動不安重則過三五七月陽月必墮火能消物故也月分依

經善調變

依經調之免墮胎患大忌男女交合一足厥陰二少陽精潮適至陰幕既翕如布袋絞而精血乘冲氣自然旋轉不息如蠅螂之滾糞吞啖含受成一團圓璇璣九日一息不停然後陰陽大定立

精血乘冲氣自然旋轉不息如蠅螂之滾糞吞啖含受成一團圓璇璣九日一息不停然後陰陽大定立
黃相包外似纏絲瑪瑙其中自然虛成一竅空洞虛圖與雞子黃中一火相似而團圓之外氣自凝結為
胞衣初薄漸厚如彼未飲豆漿面上自結一皮中竅日生從無入有精血日化從有入無九日之後次九
又九凡二十七日期成一月之數竅自然凝成一粒如露珠然乃太極動而生陽天一生水謂之胚足厥
陰脉所主也此月經閉無潮無痛飲食稍異平日不可觸犯及輕率服藥○又三九二十七日期二月數
此露珠變成赤色如桃花瓣子乃太極靜而生陰地二生火謂之暉足少陽脉所主也此月腹中或動或
不動猶可狐疑若逆吐思酸名曰惡阻有孕明矣或偏嗜一物乃一臟之虛如愛酸物乃肝臟三四胞絡
止能養胎而虛也二三箇月間忽心腹痛不安者用當歸三錢阿膠甘草各二錢葱四莖煎服三四胞絡
三焦訣又三九二十七日期三月數百日間變成男女孩影如清鼻涕中有白絨相似以成人形鼻與雌
所主胎最易動古苓朮湯或為丸頻服最妙如無惡阻等症胎有可疑者用驗胎法以川芎為末一錢五
更艾湯調服後腹中不覺動者則為經病如覺微動者則為有孕或因驚恐墮胎氣不和轉動不能
臍腹疼痛者溫酒調下二錢如當歸尤妙如胎不安及腰背痛不可忍者古桂續丸○四月男女已分始
受水精以成血脉形像具六腑順成手少陽脉所主多心腹膨脹飲食難消甚者用平胃散換白朮加香
附烏藥大腹皮如因驚怒動胎下墜小腹引腰脇小便疼痛下血者當歸湯四五
個月忽心腹癢痛者用大棗十四枚炒黑鹽一錢燒赤為末取一撮酒調服之立愈五脾六胃七肺金月

始受火精以成陰陽之氣筋骨四肢已成毛髮始生足太陰脉所主○六月始受金精以成筋口目皆成足陽明脉所主五六月胎不安者安胎飲固胎飲選用○七月始受木精以成骨皮毛已成遊其龜能動左手手太陰脉所主如胎氣不安

八手陽明成竅穴

魄能動右手手陽明脉所主如胎不安者單砂仁磨

炒為末米飲下止痛行氣甚捷但非八九

九腎十膀神氣完

九月胎受石精以成皮毛百節畢備三轉其

齊通納天地氣於丹田使關節人神皆備足太陽脉所主惟手少陰太陽經無所專主者以君手之

須防三七月

服養氣血固胎元之藥以補其虛損下次有胎先於兩箇月半後即服清熱安胎藥數貼以

防三月之墮至四箇半月後再服八九貼防過五月又至六

間有傷感并雜症

症婦傷寒詳見三卷○每

蘇飲去半夏熱服令肌體微潤而已風熱甚者雙解散去硝黃麻黃石膏○感寒胸滿欲嘔苦難痛大

便清者大正氣散去半夏如吳萸阿膠○感暑眩冒煩渴尿赤驚惕嘔吐臍下苦急者香茹散各五錢

湯或十味香茹散○感濕腹脹身重者平胃散泄者三白湯加砂仁厚朴蒼朮內熱加黃芩○內傷

氣滯不行者紫蘇飲○內傷勞役以後小腹常墮甚則子宮墮出者氣陷也補中益氣湯如因房勞者八

物湯加酒炒黃芪為君防風升麻為使○內傷飲食胸脅滿痛者平胃散換白朮如山渣麥芽黃連○內

傷薑椒熱酒腥羶災疇以致胎熱令母兩目失明頭痛腮腫項強者消風散或四物湯加芩連荆防○內

傷生冷水血或外又感寒以致胎冷不轉瞬腹絞痛腸鳴泄瀉者宜從權以理中湯之劑治之泄甚加木

香訶子陳皮白芍栗米中病即止○因感傷以致胎虛寒者八物湯加吳萸阿膠病原謂風冷傷於子臟

而墮者此類間亦有之非常法也○雜病與男子一同但孕婦服藥禁忌不犯則不動胎如子瘧熱多清

脾飲去半夏寒多人參養胃湯去半夏久不愈者勝金丹截之胎前熱者古芩末湯黃芩湯虛者胃風湯
香連丸傷冷瘧痢交作者醒脾飲子胎驚心中怔忡調治須知三禁法
睡卧不溫熱者硃砂安神丸虛者定志丸餘可類推
調治須知三禁法
病治厥陰經者是祖化之源也治無犯胃氣及上二焦為三禁不可汗下利小便是也汗則痞滿下則傷
脾利小便則亡津液舊以四物湯為主如傷寒各經加減法例莫若外感時氣從四物湯合小柴胡湯陰
症四物湯合理中湯古芩末湯傷寒最妙雜病四物湯四君子湯二陳湯加減間有服毒藥而不致胎動
者乃病邪重胎元實也豈可視為常法且陰陽和而後有胎凡胎家有病亦不必太攻也經曰婦人重身
散滑利禁用七八月間倘有秘結乃散滑利又當審其素慣墮胎及難產斟酌用之
胎動心腹腰作疼

甚則下血如經行或因七情氣不順或因外感風寒凝受胎不堅或因驚恐或因喜怒不常或因衝任二

致胎動而母心腹作痛甚則腰痛下血當安胎而母自定○胎動因七情氣逆心腹脹滿疼痛者紫蘇飲

因外感發熱頭痛嘔逆胸膈脹滿者安胎飲如柴胡大腹皮氣血虛者安胎飲倍參朮服熱者固胎散

腹痛服安胎藥不止者須辨寒熱虛實寒者理中湯如砂仁香附熱者黃芩湯血虛胎痛者四物湯或手

胃散加蘇鹽煎湯吞二宜丸氣虛痛者四君子湯加芍藥當歸氣寔心腹脹痛者用香附枳殼等分各不

空○心白湯下○心痛寒者艾葉小茴川練等分空心水煎或單豆蔻丸熱者二陳湯去半夏如山枝黃

○心腹脹痛素有冷氣腹痛衝心如刀刺者四物湯去地黃加茯苓厚朴人參吳茱萸枳殼梗枳實甘草煎服

心腹大痛氣欲絕者古芍歸湯加茯苓厚朴等分水煎服單方用鯉魚如食治入大棗十四枚炒鹽一錢

酒少許煮汁飲之不飲酒者用鯉魚和梗米薑葱煮粥十日一食善能護胎長胎○腰痛最痛者急煎酸

者必欲產也因七情者紫蘇飲如杜仲續斷因閃對者用破故紙二錢為末胡桃肉一個研勻空心酒調

服素虛痛者青娥丸腰痛如折不能轉側者用鹿角五錢火煨酒淬再煨再淬以碎為度研末酒調服○

胎動下血者膠艾芍歸湯或加砂仁秦光卷柏桑螵蛸桑寄生杜仲下血腹痛難忍或下黃沫如漆或

如豆汁者用野苧根金銀花根各五錢水酒各半盞煎服下血產門痛者用單黃連末一錢酒調服○

母病或壓墜有因母病以致胎動者但治母病而胎自安矣如母有宿疾而胎不旺者長胎白朮丸有

下之免害其分晚又用紅酒麴五兩漬酒十盞煎二沸去渣分五服隔宿再服次早再服其子如糜令母

肥盛無疾或麥芽神麴煎服尋常古芍歸湯最妙○孕婦或從高墜下重物所壓致動胎元心腹痛甚下

血者用砂仁畧炒勿焦為末熟酒鹽湯艾湯皆可調服覺腹中熱其健脾養血總安○通用古芍未湯加

胎即安胎家無所不治功同芍末如去血過多者古芍歸湯加膠艾健脾養血總安○通用古芍未湯加

豆或寒加葱白或乾生薑少許熱如天花粉寒熱如柴胡項強加葱白濕熱腹痛加白芍腹脹加厚朴下

血加艾葉地榆腰痛加杜仲驚悸加黃連煩渴加麥門冬烏梅思慮過加茯苓神疾嘔加旋覆花半夏地

役加黃芪氣喘去白朮加香附便燥加麻子仁素慣難產加枳殼蘇葉素慣墮胎加杜仲素血虛加芍歸

此安胎之聖藥也凡卒有所下急則一日三五服緩則五日十日一服常服安胎易產所生男女又無胎

毒蓋妊婦脾土運化遲滯則生濕濕則生熱故用黃芩清熱以養血白

朮健脾以燥濕安胎丸金匱當歸散加味養榮丸皆此方而推之也

胎漏下血腹不痛胎動不痛者為胎漏血多為熱少為虛熱者下血必多內熱作渴者四物湯加白朮芩

片者三補丸加香附白芍○血虛來少者古膠艾湯或合四物湯長胎白朮丸○氣虛者四君子湯加黃

芩阿膠因勞役感寒以致氣虛下血欲墜者芎歸補子湯或下血如月信以致胞乾子母俱損者用熟地

醫學 卷六 胎前 五 上海婦葉山房校印

炒乾薑各二錢。惟有犯房難救。亡。或胎漏亦有肥盛婦人月水當來者或因登廁風攻陰戶者雖不服藥亦為末米飲調服。

物湯加膠。偶然尿血莫糊模。尿血自尿門下血胎漏自人門下血妊娠尿血屬胞熱者多四物湯加白朮艾救之。

久者用龍骨一錢。黃五錢為末酒調服。

惡心阻食名惡阻。或大吐或時吐瀉水惡聞食臭由于宮經絡結於胃口故逢食氣引動精氣。

肥人痰。二陳湯加竹茹生薑煎加苓連。亦有無陰并氣弱。無陰則嘔者陰脉必弱頭痛全不入食者八物湯加丁香惡聞食氣多卧少起者旋覆花散。

麥門冬厚朴竹茹日久水漿不入口吐清水者。或因胎動別症兼。三四月病惡阻者多因胎動不安或

味及會傷風冷者醒脾飲子兼傷食者二陳湯加砂仁香附。或單白朮為丸或單砂仁為末米飲下甚者紅九子極効。

子煩燥悶亂心神火盛尅肺好生噴。妊孕心煩燥悶謂之子煩多受胎四五個月間相火用事或應火令

單知母為末蜜丸淡寔大每三九酒下。日月未足欲產及難產者亦効。君火盛者

單黃連丸。心神不安者砂砂安神丸煩甚惡傷胎者單胎散切不可以虛煩藥治。或有停痰胸膈滯亦令

煩燥不宜。或有積痰積飲滯於胸膈之間亦令煩燥胎動不安者用

子懸心腹脹滿痛胎氣湊心相火開。妊婦四五個月以來相火養胎以致胎熱氣逆湊心胸膈脹滿疼痛

者古苓末湯倍。甚則悶絕欲傷人。火盛極一時心氣悶絕。誤藥子死不能動。此症兩尺脉絕者有誤服動

白朮加芍藥。唇俱青全以舌為胎水遍身虛腫浮。胎孕經血閉以養胎胎中挾水濕與血相搏濕氣流溢揆冷面目

症驗古芍歸湯救之。引飲太過或泄瀉損傷脾胃脾虛不能制水血化為水所制宜五皮散倍加白朮。腹大異常亦堪憂。妊孕

為君氣喘小便不利者防已散濕熱感者單山梔炒為末米飲調服或單山梔丸。腹大異常亦堪憂。又有脚腫或出水

肝令子多厄食贅肉令子項短縮頭鴨子同桑椹食令子倒生心寒鮮魚同田雞食令子瘰癧雀肉同豆
醬食令子生雀子斑食螭蟹橫生食薑芽令子多指食水漿令絕產食雀肉飲酒令子多淫無社食炊茹
消胎氣食驢馬肉過月難產豆醬合雀菜食墮胎食山羊肉令子多病食鯀鱉無鱗魚難產食諸般生
子驚風而天食雀腦令子患雀目勿安服湯藥勿妄用針灸勿過飲酒漿勿舉重登高陟險心有驚悸
必顛瀾勿多睡卧須時時少步動和血脉勿勞力過傷使腎氣不足子必解顛
腦破不合衣母太溫食母太飽若脾胃不和榮衛虛損子必羸瘦多病戒之
造化玄妙古法於胎成兩月之內以斧置孕婦床席下懸弓矢於壁蓋弓矢斧斤男子事也勿令入知此
意恐不信者令待雞抱卵之時以斧置窠下盡是雄雞故胎教常令見王公大人亦此意也更佩黃一
二兩於孕婦身左或萱花亦可三法皆驗用其一可也○又後有月日
時遊胎殺雖不可泥然門戶床窻寔不可輕易移動求嗣者尤宜慎之

臨產

臨產切不可慌忙

十月氣足胎元壯健者忽然腹痛或只腰痛須臾產下何俟於催此易生天熱之易產
服單益母膏免產後之患中間有體弱性急者腹痛或作或止名弄霜漿水淋瀝來少

名試水雖臍腹俱痛發動露頂而腰不痛者切莫惶惶切禁洗母動手於腹上揣摩直待日子已到臍痛
陣密破水已後并腰痛眼中如火方可坐草須待兒頭直順且正逼近產門方可用力一送如坐草太早

用力太過產母困倦及至遲滯乃用催生之藥凡難產皆孕後縱慾及驕恣全不運動又食生冷硬物凝
滯或矮石女子交骨不開或腹大甚胎水未盡或臨產開離之人驚恐產婦惡則精怯精怯則上焦關閉

則氣還下焦脹而不行紫蘇飲最妙
氣寔者瘦胎枳甘散氣弱者達生散
活血安胎未破漿如腹痛漿水未破止宜用古芎歸湯以活其血或
漿水已破而少痛雖痛而不密宜安胎飲或達生

散以固胎元切不可輕用峻藥徒滲水道反傷胎氣而
產愈難產母亦聽其眠食自如但不可過眠過飽耳
破漿已久猶難下破水多則血乾澀必用古黑神

黑神散氣弱者四君子湯下名四君黑神散橫逆側產每加麝一厘此時如舟在砂上須湧水下後滑利
可通服此藥後外用葱二斤搗爛鋪於小腹上用急水難頭砂一斗炒熱將布袱於葱上輕壓罌探

迅速要相當催生有露頂順正而生猶遲滯者恐外感風冷寒暑所阻夏月熱產則氣散血沸宜五苓散
加葵子或三退六一散冬月東產則血凝滯常令房中大火煖宜催生五積散有水道乾澀不

能下及服黑神滋藥又多者用清油白蜜等分猪肝煮汁調服或六一散七錢加葵子五錢為末每二錢
熱服有產難日久水乾及觸犯惡氣心煩燥悶者兎腦丸腰痛心煩者用人參乳香各二錢辰砂五分為

末雞子清調薑汁化開冷服○已上**橫生露手逐露足徐徐推上任洗娘**橫者兎先露手原因腹痛兎身
正產艱難之法已下橫逆側碍之法**橫生露手逐露足徐徐推上任洗娘**橫者兎先露手原因腹痛兎身



當令產母安然仰卧洗母輕手徐徐推兒稍上漸漸以中指摩其肩推上又攀其耳而正之服芎歸黑神散固血生血須待兒身正直且順臨門服何膠滑石葵子為末溫酒入蜜攪勻服之然後方可用手送下
○逆者先露其足因母氣乏關健不牢用力太早致見逆來當令產母安然仰卧洗母徐徐推足入去分毫不得驚恐服芎歸黑神散固血活血候兒自順若經久不生却令洗母輕緩用手推足令就一過直上令兒頭一過漸漸順下多服芎歸等藥直待兒身轉門路正當然後用三退散調服方可用力送

坐產露腎高攀手

坐者先露其腎當高處攀手使一徐令產母以手攀之服固血藥輕

屈足良久順生

嬰兒面貼頂救盤腸

盤腸者小腸先出急用熱水浸軟舊布蓋住小腸不可包托外用醋半盞新

聖膏貼住母頭頂中心腸上即拭去內兼服芎歸參芪大補之藥加升麻防風以提之末有收者又有久而為風吹乾不能收者用磨刀水少許火上溫過以潤其腸後用好磁石煎湯一盞服之其腸自收

碍產兒肩臍帶絆

碍者因兒身番轉臍帶絆住其肩雖露正頂而不能生當令產母仰卧洗母輕推兒近上徐徐引手以中指托起兒頭下其臍帶服固血藥仍須候兒身正順方可用力送

下露額側求墜腿尻

側者因兒方轉身被產母用力一逼以致兒頭偏墜左腿忽偏墜右腿或露左額角或露右額角兒頭偏墜一畔多服芎歸黑神散令產母仰卧洗母徐徐推兒近上

手正其頭直向人門然後用力送下若是兒頂後骨偏墜穀道即令兒已露額當令洗母以綿衣炙令溫煖用手於穀道外畔輕按推兒頭上而正之服催生藥後即令產母用力送下此非洗母輕手巧妙不能

傷產暮然口翻

當產誤用催生峻藥傷母氣血急用安胎過日而產有種種血裏住宜鹽豉一兩以青布包了燒存性入麝香一錢為末用秤錘燒紅洋酒調服一盞倉卒只以新汲水磨京墨服之墨水裏兒身出或芎歸益母草葵心皆能逐瘀以開產路○有坐草之時驚時口翻口噤吐沫者露應丹○有壓石女

子交骨不開難產者龜壳散或古芎胎死母舌黑非常外症指甲青黑脈悶不食口中極臭用平胃散加

歸湯○通用無憂散來麝散免腦丸胎死母舌黑非常外症指甲青黑脈悶不食口中極臭用平胃散加

寔者大黃備急丸或單鹿角為末葱豉煎湯調服昏沉脈微者養正丹濃煎乳香湯下一百廿丸血乾或有寒者四物湯下古桂香丸氣弱者催生五積散如麝一厘○雙胎一死一活者用蟹爪一盞甘草二兩

東流水十盞煎至三盞去渣入阿膠三兩分二三次頓服能令生者安死者出胞衣不下因血脹消瘀和

氣信古方

皆因用力太早產下不能更用力送出胞衣停久被外冷所乘則血溢脹胞而不出腹滿衝胸喘急疼痛者危急將臍帶以小物繫緊然後截斷不然則胞上抱心而死只要產母安心不可

輕信洗母用手宜內服半膝湯催生五積散或用真血竭為末酒調服甚者奪命丹外用如聖膏貼脚心昏暈危甚八味黑神散黑龍丹

上海

臨產

上海

產後

產後必須先逐瘀

正產體寔無病不藥可也。但難產氣衰瘀血停留。非藥不行。古法一產後古芎歸湯。如

後上床仰臥。不得側臥。宜立膝不可伸足。高枕厚褥。四壁無風。時以人高從心。括至臍下。如此三日。更不

可太睡。熱宜頻喚醒。時置醋炭。或燒乾漆與舊漆器。以防血迷。血暈。夏月房中不可太熱。亦不可入多氣

咸以致熱。過則氣耗。散而不能送。血又不可太飽。時與白粥飲之。日漸加與。一月之內。針線藥役。當時不

覺大害。月後必成。勞勞。手脚及腰腿酸痛。亦不可脫衣洗浴。強起離床。太早以致外感。身強。百子反張。名

曰。毒風。如交合。陰陽令下。部終身虛疾。將息百日。以過乃可。須知產後百病。皆血

虛火。盛瘀血妄行而已。矣。間有內傷飲食。外感風寒。然亦必先逐瘀。補虛為主。瘀消然後

可行。補如左。脉弱加補血藥。右脉弱加補氣藥。如不逐瘀。逐瘀。去血過多。眼視頭眩。皆因

服參。試甘炙。停滯之劑。有瘀血攻心。即死者。食肉太早。亦然。瘀衝眩暈。腹心疼。煩燥。或見頭汗。者。古芎歸

湯。入童便。甚者加炒乾薑。人參。汗多加黃芪。或八味。黑神散。單五靈脂。散。返魂丹。胃弱血虛。發熱。公

散。白薇湯。臨產用力。勞心氣虛。而暈者。用人參。一兩。蘇木。五錢。水煎。入童便。調服。氣血俱虛。疾火之

上作暈者。不物湯。合二陳湯。去白芍。火載血上。昏暈。或挾風邪者。清魂散。破驚者。抱胆丸。殊砂。神

丸。腹心疼痛。全是瘀血。八味。黑神散。四味。散。失笑散。有寒熱者。當歸。鬚散。虛寒心痛者。桂心湯。感寒

者。理中湯。七情心痛者。木樨湯。食滯寒熱。心腹痛者。熟料五積散。加莪朮。小腹痛者。名兜。枕痛單

五靈脂散。或加桃仁。醋糊為丸。氣虛四君子湯。下血虛四物湯。下。座門。下虛痛者。大溫經湯。羊肉湯

○通用女金丹。血虛火動。寒熱。產後血虛發熱。氣虛惡寒。氣血俱虛。發熱惡寒。切不可發表。○陰虛血

加味益母丸。血虛火動。寒熱。產後血虛發熱。氣虛惡寒。氣血俱虛。發熱惡寒。切不可發表。○陰虛血

頰短氣。悶亂者。人參當歸散。蒸乳發熱者。四物湯。加參。芪。白朮。天花粉。發熱。晝靜。內傷。發熱。漸虛。產後

夜劇者。四物湯。去芍。藥量加柴胡。氣血俱虛。寒熱者。補虛湯。產後真不宜涼也。內傷。發熱。晝靜。內傷。發熱。漸虛。產後

三白湯加乾薑陳皮黃芪滑石甘草飲食成積痞者內炙散晚晚丸○霍亂吐瀉煩外感寒熱無時停補

中帶表無過度產後外感離床大早或換衣襲風冷入於下部令人寒熱似瘧頭痛不歇血虛者古家醫

龍湯主之如體盛發熱惡寒及瘧痢者小柴胡湯合四君子湯加黃芪各三分服切不可以傷更治

法曾誤服熱藥過多熱症大見久而便閉者柴胡破瘀湯或四物湯加大黃芒硝暫服即調補之產後傷

寒詳二卷身痛助學虛渴煩因產走動氣血升降失常留滯關節筋脈急引或手足拘攣遍身肢節走痛者起

桃仁木香等分姜煎服○產後諸風痿弱筋攣無力者血風丸或煎服○煩渴氣虛者生肌散血虛者四

物湯加天花粉麥門冬氣血俱虛作渴頭眩脚弱飲食無味者用人參二錢麥門冬一錢半煎服○錢天

花粉三錢甘草五分糯米姜煮煎服○虛煩者用人參麥門冬小麥淡汗多大便偏閉固○產後發熱自汗

甚如白木防風牡蠣麥門冬熟地茯苓甘草或黃芪建中湯自汗兼腫滿者大調經散自汗肢體疼痛者

當歸羊肉湯○發熱盜汗者用猪腰子一枚糯米半合葱白二莖同煮熟取清汁一盞入人參當歸各一

錢煎服○大便閉者古芎歸湯加防風枳殼甘草開溫者麻子仁丸或蘇麻粥蓋產後去血多則鬱胃鬱

胃則多汗多汗則大便閉皆血虛也鬱胃多血暈○小便不通腹脹滿者用鹽填臍中葱白一束切作一

指厚放鹽上以艾炷灸之熱氣入腹即通熱者不語敗血濕痰迷產後敗血停蓄上干于心心氣閉滯舌

六一散加枳殼枳殼木通麻子仁葵子水煎服○痰熱迷心不產後敗血停蓄上干于心心氣閉滯舌

產服湯藥過多胃濕使然者熟料五積散六君子湯○痰熱迷心不產後敗血停蓄上干于心心氣閉滯舌

語者導痰湯或痰氣鬱滯閉目不語者用生白礬末一錢熟水調服○見鬼神非邪忤產後乍見鬼神者

敗血攻冲邪淫於心胡言亂語非寒風非見熱也宜小調經散加龍腦少許或妙香散加當歸地黃黃連

○瘀血迷心妄言妄見及心虛譫妄昏暈者八物湯去芍藥加琥珀于仁遠志珠砂金銀煎服甚者黑

龍丹○產後血少怔忡睡卧不寧又有惡露常淋或因浮損无難住產後五淋白茅湯敗血淋瀝不斷

者十味溫胆湯或益神膏定志丸

困者壯陽散○有生產時被洗母誤損尿尿以致日夜淋瀝者四君任是春風并腫浮產後中風名曰毒

子湯加黃芪陳皮桃仁用猪尿尿者青汁煎溫服血虛者加芎歸

手足痠痲及眩暈強直○心眼倒吐瀉欲死者單劑芥散苦劑歸湯血虛勞碌太早風邪乘虛而入者小

續命湯羌活愈風湯如口噤反張延遲潮多者交加散或大黑豆半升炒令煙起以酒二碗次之入磁器用

每用酒半碗入獨活五錢同煎溫服○產後汗多風搏成症者難治○產後敗血停蓄化水循經流入四

肢浮腫者小調經散而氣虛者四君子加蒼朮或安金丹血虛者補虛湯少加蒼朮使水自利忌峻

上海掃葉山房校印

利攻一切雜症補榮衛產後雜病與男子一同但常兼補兼逐痰則病無不愈丹溪云天補榮衛為主雖

作痢一同四物湯加桃仁黃連木香主之是也假如月裡痢疾惡露未盡者多痰凝滯腸胃與經後血滯

是痰血入肺古二母散加桃仁杏仁參桂苓水煎其餘以意會之可也惟有鼻衄如煤產後血

諸經不得還元故口鼻黑起乃變鼻衄皆因發喘聲高難救護產後氣喘由榮血暴竭氣無所容獨聚於

產後虛熱所致胃絕肺敗犀角地黃湯救之陰門腫突腸不收產後陰肉兩旁腫痛手足不能分伸者

加蘇木少許救之若敗血停滯脹肺喘者用血陰門腫突腸不收產後陰肉兩旁腫痛手足不能分伸者

竭沒藥等分為末酒入水調服兼用奪命丹陰門腫突腸不收產後陰肉兩旁腫痛手足不能分伸者

戶兩旁良久即愈因產用力過多陰門突出者四物湯加龍骨未少許連進二服外用草麻子搗爛貼

頂少收即去草麻產後生腸不收八物湯加防風升麻須用酒炒黃芪為君外以荆芥霍香槐皮煎湯

洗子宮脂膜休羞惡產後下一物如合鉢狀有二枝者子宮也補中益氣湯去柴胡連進二貼即收

瘰癧所致有粘席不得上者乃脂膜無妨補中益氣湯去柴胡連進二貼即收臨產驚動用力太過以致

脂膜有傷垂出肉線一條約三四尺長牽引心腹痛不可忍以手微動之則痛若欲絕先服失笑散數貼

仍用生薑三斤洗淨搗爛以清油二斤拌勻炒令油乾焦為度却用熟絹五尺摺作數層方令穩重婦人

輕輕盛起肉線使之屈曲作一團納在水道口却用絹袋兜前油薑稍溫傳在肉線上薰之覺薑冷又用

熨斗火熨熱常使有薑氣如薑氣已過又用新薑如此溫熨一日一夜其肉線已縮入一半再乳汁不通

用前法越兩日肉線盡入却再服失笑散古芍歸湯調理不可使肉線斷作兩截則不可治矣乳汁不通

氣血虛氣滯塞者戒鬱怒產後氣血虛弱乳汁少者用鍾乳粉二錢漏蘆煎濃湯調理或用豬懸蹄一隻

者湧泉散無子食乳要消者用麥芽二兩炒為末四物湯調服即止凡乳母但覺小水短少即是病

生便須服藥調理脾胃肝腎如不愈者必氣滯且逆也益婦人凡事不得專行多憂思忿怒憂思過則氣

結而血亦結忿怒過則氣逆而血亦逆甚則乳硬脅痛煩熱要之怪疾乳長尺有餘先賢治法仍

因氣血鬱結所以古方多用香附砂仁木香枳實青皮枳殼者行氣故也

詳具產後瘀血上攻忽兩乳伸長細小如腸直過小腹痛不可忍名曰乳懸危症用川芎當歸各一斤水

煎濃湯不時溫服再用二斤逐旋燒煙安在病人面前桌子下令病人曲身低頭將口鼻及病乳常

吸煙氣未甚縮再用一料則瘀血消而乳頭自復矣

若更不復舊用草麻子搗爛貼頂上片時收即洗去

附胎殺禁忌

凡胎殺所在不宜修整雖鄰家興動孕婦當避縱不墮胎令兒破形色青腫學窠塞天殞