

湯醫大全



傷醫大全目錄

卷二十五

腿膝部

骨痿瘡門主論

腿遊風門主論

肚門癰門主論

上水魚門主論

黃鯁癰門主論

大腿癰門主論



南京中醫藥大學圖書館版權所有

附骨疽門主論 附方

多骨疽門主論 附方

咬骨疽門主論

箕門癰門主論

肉蜈蚣門主論

玄疽門主論

陰疽門主論

膝蓋癰門主論

膝眼毒門主論



膝眼風門主論

鶴膝風門主論

附方

小兒鶴膝門主論

人面瘡門主論

附方

骨槽疽門主論

伏兔疽門主論

下石疽門主論

緩疽門主論

下瘰癧門主論



委中毒門主論

四灣風門主論

流火門主論 附方

腓脰部

三里發門主論

合陽疽門主論

腳氣瘡門主論

臙瘡門主論 附方

血瘋瘡門主論 附方



血槽風門主論

濕腫門主論 附方

腎臟風瘡門主論 附方

濕毒流注門主論 附方

附陰疽門主論

瓜藤纏門主論

接骨發門主論

黃鯁癰門主論

鱗漏門主論

目錄
卷二十五
顧氏秘書



外科醫方全

青蛇便門主論

魚肚癰門主論

腔疽門主論

腓肭疽門主論



南京中醫藥大學圖書館藏

瘍醫大全卷二十五

廣東省城雙門底嶺山樓藏

蕪湖顧世澄練江氏纂輯

腿膝部

自膀至腿膝諸止一切癰疽疔毒皆彙於此部中以
便檢閱參治

堦錢之栢東陽
男 櫟燮用和 全栢



南京中医药大学图书馆版

骨痠瘡門主論

申斗垣曰骨痠瘡乃足少陽膽經多氣少血其瘡在
於兩膀骨上漸大筋骨俱痛瘡開流水水盡則死
如膀間相對生瘡者十無一生用夫馬尾筋煎
莫令磨着內服補中益氣湯

啟玄



腿遊風



腿遊風門主論

王肯堂曰腿遊風腿股忽然赤腫風熱相搏屬足太

陽經宜砭去惡血

準繩

心法曰腿遊風在兩腿忽裡忽外忽上忽下不定經
色形如堆雲癰痛由榮衛風熱相搏結滯而成凡
遇此證先施砭石砭去惡血外貼牛肉片以抵風
甚效

壯門癰門主論

心法曰壯門癰生於大腿壯屬足太陽膀胱經所屬



上水魚門三論

心法曰上水魚生委中摺紋兩稍腫如高埂長若魚
形色紫作痛由血熱遇外寒稽留則血瘀凝結而
成外宜向腫埂上砭出惡血用二黃散即無倒散
香油調敷甚效下毒雖凶不傷命名為順症凡

必尋其頭用三稜針先針在鰓肚次針鰓尾再用

小針針至鰓頭兩邊高用艾炷灸之在二台專針

陽氣宜夜

法曰腿遊風在兩腿忽裡忽外忽上忽下

色香尚隨身效

由榮衛風熱相搏而得

濕邪伏宜向動則土氣出惡血風二黃清

噴腫困結

其法宜發針由血熱點於寒熱點血熱熱而

心法曰土水魚主委中點於兩膝輒收高點夏甚魚

心法曰土水魚門三瀉大肥肚屬足太陽膀胱經所主



北京中醫藥大學圖書館藏

黃鰓癰門五論

申斗垣曰黃鰓癰生於大腿外側連醫處有

鰓形深陷窄長或不見紅腫堅硬如石約長七八

寸大者爲頭小者爲尾鰓頭向上者防毒內攻小

腹難治鰓頭向下毒雖凶不傷命名爲順症凡醫

必尋其頭用三稜針先針住鰓肚次針鰓尾再用

小針針住鰓頭兩邊當用艾炙三十壯左右轉針

先起尾針視鰓形不動是鰓已死如動再依前法

灸之內服內托流氣飲或真人活命飲外以薑汁

猪膽汁好醋全調欽箍散敷之

啟玄

心法曰黃鰍癰生小腿肚裏側硬腫長有數寸形如泥鰍其色微紅由肝脾二經濕熱凝結而成如潰潰出稠膿者吉如潰流污水敗漿者凶治同癰疽

全鑑

王肯堂曰脛陰疽又名黃鰍癰生足小肚內側微紅微腫堅硬如石三四寸許痛楚難禁足太陰與足厥陰二經濕熱又積憤所致若過時潰出清水虛火上升嘔吐不食者不治

準繩

湯大 腿癰門主論

陳遠公曰有腿上忽腫一塊其色如常不疼
癰疽也誰知氣虛之故乎夫癰成于腫未有腫而
不變爲癰者予謂氣虛非癰人誰識之嗟乎氣
以行血者也氣行則血行總有邪氣斷難成腫彼
邪氣之盛每成于氣血之衰其腫爲癰每每作痛
色必變紅赤也今既不疼色又不變是有腫之名
無腫之實全是氣虛血無以養非邪盛而氣不能
鼓也治法補氣以扶正不必化毒以祛邪用補中

益氣湯 人參 五錢 白木 一兩 生黃芪 一兩 當歸 五錢

柴胡 一錢 升麻 五分 陳皮 一錢 生甘草 一錢

夏 二錢 茯苓 三錢 水煎服十劑腫消此方益氣聖藥

藥非消毒之劑何以用之消腫耶蓋真氣虧則虛

邪氣盛則實真氣既虛邪氣益盛不用補氣氣何

以行腫何以化耶此方補氣即所以消腫也況益

氣能助陽之品故更易收功耳 冰鑑

癰疽之發者發於內側屬肝脾二經發於外側

大關經平陷堅硬者為氣虛當用內補黃芪

