

劉
守真
宣明
論方

卷十至卷十五
吳勉學校刊

黃帝素問宣明論方卷之十

河間

劉守真

撰集

新安

吳勉學

校

燥門

消渴論

燥乾者今肺之本燥金受熱化以成燥澁也兼火熱致金衰耗液而損血鬱而成燥者由風能勝濕熱能耗液故經云風熱火同陽也寒濕燥同陰也又燥濕小異也金燥雖屬秋陰而其性異於寒濕而反同於

風熱火也又加大便乾澀乃大腸受熱化成燥澀經

云諸澀枯渴又如癰瘰中風皆因火熱耗損血液玄

腑閉塞不能浸潤金受火鬱不能發聲經云肺主聲肢痛

綆疾者風熱濕相致而遂以偏枯語音澀手足不隨

也然中寒吐瀉亡液而成燥亦以鮮矣亦有寒濕相

鬱榮衛不能開發貫注多成偏枯經曰諸澀枯涸乾

勁皴揭屬於燥也○又如胃膈痺熱煩滿饑不欲食

或痺成消中善食而瘦或燥熱鬱甚而成消渴多飲

而數小便或因熱病或恣酒欲誤服熱藥以致脾胃真陰陽損虛肝心衰弱也狂陽心

火燥其三焦腸胃燥澀怫鬱而水液不能宣行也則

周身不得潤澤故瘦悴黃黑也而燥熱消渴然雖多
飲亦其水液不能浸潤於腸胃之外湯不能止而便
注爲小便多出俗未明妄爲下焦虛冷誤人多矣○
又如周身熱燥鬱故變爲雀目或內障癰疽瘡瘍止
爲咳嗽喘下爲痔痢或停積而濕熱內甚不能傳化
者變爲水腫濕脹也世傳消渴病及消瘦弱或小便
有脂液者爲消腎也此爲三消病也消渴消中消腎
經意但皆熱之所致也

人參白朮湯

治胃膈癰熱煩滿饑不欲食痺成爲

消中善食而瘦燥熱鬱甚而成消渴多飲而數小

便兼療一切陽實陰虛風熱燥鬱頭目昏眩風中
偏枯酒過積毒一切腸胃燥澁倦悶壅塞瘡疥癢
痺并傷寒雜病產後煩渴氣液不得宣通

人參

白朮

當歸

芍藥

大黃

山梔子

荆芥穗

薄荷

桔梗

知母

澤瀉

各半兩

茯苓

去皮

連翹

瓜蒌根

乾葛

各二兩

甘草

二兩

藿香葉

青木香

官桂

各一分

石膏

四兩

寒水石

二兩

滑石

半斤

右爲細末每服抄五錢水一茶盞入盆硝半兩
生薑三片煎至半盞絞汁入蜜少許溫服漸加

至十餘錢得臟腑流利取効如常服以意加減

兼服

消痞丸散以散腸胃結滯濕熱內甚自利者去了大黃芒硝

絳雪散

治消渴飲水無度小便數者大有神効

黃芩

黃丹

漢防已

括藹實

各等分

右爲細末每服二錢湯漿水調下臨卧時併進

三二服即止

人參散

治消腎善飲而食後數小便溺者

人參

三錢

白朮

澤瀉

瓜蒌

桔梗

梔子

連翹

各半兩

葛根

黃芩

大黃

薄荷

白茯苓

各一兩

甘草

半兩

石膏

二兩

滑石

寒水石

各三兩

右爲末入宿砂仁三錢每服五錢水一盞煎至七分入蜜少許再煎三二沸去滓食前食後服消痞丸

大黃甘草飲子

治男子婦人一切消渴不能止者

大豆五升

先煮三沸出淘苦水再煮

大黃

一兩半

甘草

六釐者四兩長四指打碎

右三味用井水一桶將前藥同煮三五時如稠

糖水少更下豆軟盛於盆中故冷令病人食豆渴食不論無時時食食後消渴如若不止再煮

前藥不二

痢門

總論

夫痢者五臟窘毒■而不散或感冷物或胃寒暑失
饑不能開發久傷冷熱等食更或服暖藥過極鬱化
成利自古入三口白利爲寒赤利乃熱其三口悞也
今人瘡節初發刺開乃血多曰成膿何爲先熱而後
寒也

叔和云濕多成五泄腸走若雷奔愚醫不悟三口黃
者乃熱青利是寒太素曰五泄有溏泄驚泄飧泄濡

泄滑泄也此乃五泄五泄者青是感肝木之象其色
青赤者受心火之氣其色赤白者得西方金肺之氣
色白黃者脾土之色蒼者土氣之下與水隨之其色
蒼也三口蒼曰寒黃赤熱其三口非也若下利熱極
頻并窘痛或久不愈諸藥不能止者須下之以開除
濕熱痞閉積滯而使氣液宣行者宜以逐之兼宣利
積熱也

益元散

治身熱吐痢泄瀉腸癖下痢赤白瘰閉淋

痛利小便偏主石淋

乃服金石熱藥多待爲砂石從小便淋出者也

腸胃

中積聚寒熱宣積氣通九竅六腑生津液去留結

消畜水止渴寬中除煩熱心躁腹脹痛悶補益五

藏大養脾腎之氣

比腎木之藏非為主之府也

理內傷陰痿安

魂定鬼補五勞七傷一切虛損主痢瘕驚悸

其季初驚

動健忘止煩滿短氣藏傷咳嗽飲食不下肌肉疼

痛并口瘡牙齒疳蝕明耳目壯筋骨通經脉和血

氣消水穀保元真解百藥酒食邪毒耐勞役饑渴

宜熱辟中外諸邪所傷久服強志輕身注顏延壽

及解中暑傷寒疫癘饑飽勞損憂愁思慮恚怒驚

恐傳染并汗後遺熱勞復諸疾并解兩感傷寒能

令遍身結滯宜通氣和而愈及婦人下乳催生產

後損益血衰陰虛熱甚一切熱證兼吹妳乳癰此

神驗之仙藥也惟孕婦不宜服滑胎也

桂府臙白滑石

六兩 甘草 一兩

右爲末每服三錢

許蜜少

溫水調下

無蜜亦得

日三服

欲冷飲者新汲水調下解利傷寒發汗煎葱白

湯調下四錢

每服水一盞葱白五寸豆豉五十粒煮取汁一盞調下

併三

服効爲度此藥是寒涼解散鬱熱若病甚不解

多服此藥無害但有益而無損俗惡性寒兼易

得之賤物而不明素問造化之理故不取

神驗之言而多不用焉若以隨證驗之此

之仙藥也不可闕之

傷寒當汗而不可下當下

藥則汗出自愈裏熱便得宜通而愈或半右裏

半在表可和解而不可發汗吐下者若服上藥

多愈亦獲小効是解散涼膈散和解為佳或人

排鬱邪熱甚者小加減不當汗者更可

加蒼木末三分同葱鼓煎湯調服滑石麻黃桂

枝要發汗當即用甘草一兩蒼木二兩同為末每服四

白豆豉五十枚同煎至大分去滓逼毒散非

婦可太白散加麻黃二兩去節如神白散或逼

與麻黃蒼木各等分濟眾云青龍散或青龍散

滑石與蒼木倍最為發汗之妙藥也唯正可干

服之則轉加大通毒散或解利兩感涼膈散調

熱也名為

下

益元散

四錢或下孔用猪肉麪羹或酒之類調下四錢不計時候日三服宜食肉麪羹

粥催產

以用溫油漿調下三錢併二三服三一承

氣湯

前一服調下五錢須更頻用溫相漿調服

不下皆由風熱燥溢緊歛結滯不能舒緩是攻產矣慎不可溫補而反生燥熱也俗未知產後日夜損血疼痛怖懼以致神狂氣亂則陰氣損虛邪熱太甚而為諸證由不明素問造化故不識證候陰陽反以妄為產後諸虛百損便為虛冷而無熱也誤以熱藥溫補或見渴甚者不令飲水本為善心為害多矣豈知治病之道俱以臨時審其藏府大氣虛實明其標本如法治之而已矣此藥之常多用雖為効至大俗以病異藥同將為妄今以黃丹是桃仁色紅玉散若行反招侮慢

青黛

令輕粉碧玉散若薄荷葉未一分雞蘇散碧色名

主療並同但以回避
愚俗之妄侮慢耳

玄青丸 治下痢勢惡頻并窘痛或久不愈諸藥不
能止須可下之以開除濕熱痞悶積滯而使氣液
宣行者宜以逐之兼宜利積熱酒食積黃瘦中滿
水腫腹脹兼療小兒驚疳積熱乳癖諸證唯泄瀉
者勿服

黃連

黃蘗

大黃

其遂

芫花

醋拌炒

大戟

各半兩

牽牛

四兩取未二兩

已上同細末

輕粉

二錢

青黛

一兩

右為末勻水丸小豆大初服十丸每服加十丸

空腹日午臨卧三服以快利爲度後常服十五
二十丸數日後得食久病未痊除者再加取利
利後却常服以意消息病去爲度後隨證止之
小兒丸如黍米或麻子大退驚疳熱積不下者
須常服十丸

阿膠梅連丸 治下痢無問久新赤白青黑疼痛諸
證

金井阿膠

淨草灰炒透明白別研不細者再炒研細

烏梅肉

去核炒

黃蘗

剉炒

黃連

當歸

焙

赤芍藥

乾薑

炮

赤茯苓

半兩各等分

右爲末入阿膠研勻水在桐子大溫水飲下
丸食前兼夜五六服小兒丸如菉豆忌油膩脂
肥諸物也

牛黃神金丸 治大人小兒嘔吐瀉痢無問久新赤

白諸色或渴或不渴小便澀或不澀并小兒驚疳
積熱瘰癧堅積腹滿硬痛作發往來亦能寬膈消
食

輕粉

粉霜

硃砂

以上別研

雄黃

研

朱砂

信砒

芭豆

去皮各一錢

黃丹

蠟

三錢

右先研粉霜次旋入硃砂研細下雄黃朱砂信

砒再研下丹粉研勻別研芭豆爛爲油與前藥
研勻近火上炙控熱別研蠟軟入藥勻搓作劑
旋丸小豆大新水下一丸小兒黍米麻子大或
止吐瀉痢疾調甘露散是桂苓
甘露飲或益元散亦得
芍藥藥皮丸 治一切濕熱惡痢頻年窘痛無問膿
血並宜服之

芍藥

黃蘗各一兩當歸

黃連各半兩

右爲末水丸如小豆大溫水下三四十九無時
兼夜五六服忌油膩脂肥發熱等物

二勝丸

治泄痢虛損不問久新者