



圖經衍義本草

十二



圖經衍義本草卷之二十六



圖經衍義本草卷之二十七



圖經衍義本草卷之二十八



圖經本草卷之三十六

上海涵芬樓影印正統道藏本

圖經本草卷之三十六



圖經衍義本草卷之二十六

日一

宋通直郎辨驗藥材冠宗奭編撰

宋太醫助教辨驗藥材許洪校正

人部

髮髮

音被



味苦溫小寒無毒主五癆關格不通利

小便水道療小兒癰大人瘞仍自還神化合

雞子黃煎之消爲水療小兒驚熱

陶隱居云李云是童男髮神化之事未見

別方今俗中嫗母爲小兒作雞子煎用髮



雜熬良久得汁與小兒服去痰熱治百病
而用髮皆取其父梳頭亂者爾不知此髮
髮審是何物且髮字書記所無或作蒜音
人今呼斑髮爲蒜髮書家亦呼亂髮爲鬢
恐髮即舜音也童男之理未或全明

日一

唐本註云此髮髮根也年久者用之神效
即髮字誤矣既有亂髮及頭垢則闕髮明
矣又頭垢功劣於髮髮猶去病用陳久者
梳及船茹敗天翁蒲蓆皆此例甄立言作
鬢亦髮也字書無髮字但有髮鬢鬢髮美



貌作丘權音有聲無質則髮爲真者也

禹錫云按蜀本云本經云仍自還神化李
云神化之事未見別方按異苑云人髮變
爲鯢魚神化之異應此者也

日華子云髮溫止血悶血運金瘡傷風血

痢入藥燒灰勿令絕過煎膏長肉消瘀血
也

陳藏器云生人髮掛菓樹上烏鳥不敢來
食其實又人逃走取此髮於緯車上却轉
之則迷亂不知所適矣



衍義曰髮髮與亂髮自是兩等髮髮味苦
即陳舊經年歲者如橘皮皆橘也而取其
陳者狼毒麻黃吳茱萸半夏枳實之類皆
須陳者謂之六陳入藥更良敗蒲亦然此
用髮之義耳今人又謂之頭髮其亂髮條
中自無用髮之義此二義甚明亦不必如
此過謂搜索

亂髮微溫主欬嗽五淋大小便不通小兒驚
癇止血鼻衄燒之吹內立已

陶隱居云此常人頭髮爾與髮髮療體相



似

唐本註云亂髮灰療轉胞小便不通赤白痢哽噎鼻衄癰腫狐尿刺尸疰丁腫骨疽雜瘡

禹錫云按藥性論云亂髮使味苦能消瘀

血關格不通利水道

外臺祕要治霍亂煩燥燒亂髮如雞子大鹽湯三升和服之不吐再服

經驗方孩子熱瘡亂髮一團梨許大雞子

黃煮熟二物相和於銚子內炭火上熬初



甚乾少須髮焦遂有液出旋取置一瓷盞
中以液盡爲度取此液傳熱瘡上即以苦
參粉粉之

梅師方治鼻衄出血眩冒欲死燒亂髮細
研水服方寸匕須更吹鼻中差

四一

三

簡要濟衆方治小兒重舌欲死以亂髮灰
細研以半錢傳舌下日不住用之

蘇學士云亂髮露蜂房蛇蛻皮各燒灰存
性每味取一錢匕酒調服治瘡口久不合

神驗



老唐云收自己亂髮洗淨乾每一兩入椒
五十粒泥封固入爐大火一煅如黑糟細
斫酒服一錢七鬚髮長黑

衍義文具髮髮條下

人乳汁主補五臟令人肥白悅澤

陶隱居云張蒼常服人乳故年百歲餘肥
白如瓠

唐本注云別錄云首生男乳療目赤痛多
淚解馬肝牛肉毒合豉濃汁服之神效又
取和雀屎去目赤努肉



日華子云人乳冷益氣治瘦悴悅皮膚潤
毛髮點眼止淚并療赤目使之明潤也

衍義曰人乳汁治目之功多何也人心生
血肝藏血肝受血則能視蓋水入於經則
其血乃成又曰上則爲乳汁下則爲月水

故知乳汁則血也用以點目豈有不相宜
者血爲陰故其性冷藏寒人乳如餅酪之
類不可多食雖曰牛羊乳然亦不出乎陰
陽造化爾西戎更以駝馬汁爲酥酪老人
患口瘡不能食飲人熱乳甚良



聖惠方治卒中風不語舌根強硬陳醬五
合三年者妙人乳汁五合二件相和研以
生布絞取汁不計時候少少與服良久當
語

金匱方噉此牛肉殺人何以知之噉蛇毛

目一

髮向後順者是也食之欲死飲人乳汁一

四

升立可

頭垢主淋閉不通

陶隱居云術云頭垢浮針以肥膩故爾今
當用悅澤大者其垢可丸又主噎亦治勞



復

禹錫云按藥性論云頭垢治噎酸漿水煎膏用之立愈

日華子云溫治中蠱毒及蕈毒米飲或酒化下並得以吐爲度

外臺祕要傷寒病欲令不勞復頭垢燒水丸如梧相子大飲服一丸

千金方治百邪鬼魅水服頭垢一小豆大故膩頭巾無毒天行勞復渴浸取汁煖服一升○又方主食自死鳥獸肝中毒取故



頭巾垢一錢匕熱湯中烱服之三年頭須
主卒心痛沸湯取汁飲以頭帶於閑處枕
覆之同時開愈頭帶即縛髻帛也

人牙齒

平除勞治瘡蠱毒氣入藥燒用齒塗

溫和黑虱研塗出箭頭并惡刺破癰腫

目一

五

葛推川治乳癰取人牙齒燒灰細研酥調

貼癰上

李世勣治箭頭不出及惡刺以齒塗和鶴

虱研傳之

人屎

寒主療時行大熱狂走解諸毒宜用絕

乾者搗末沸湯沃服之○東向圜廁溺坑中
青泥療喉痺消癰腫若已有膿即潰

陶隱居云交廣俚人用焦銅爲箭鏃射人
傷皮便死惟飲屎汁即差而射猪狗不死
以其食糞故也時行大熱飲屎汁亦差今

近城寺別塞空龕口內糞倉中久年得汁
甚黑而苦名爲黃龍湯治溫病垂死皆差
唐本註云人屎主諸毒卒惡熱黃悶欲死
者新者最效須與水和服之其乾者燒之
煙絕水漬飲汁名破棺湯主傷寒熱毒水



潰飲彌善破丁腫開以新者封之一日根爛

禹錫云按日華子云冀清冷臘月截淡竹去青皮浸滲取汁治天行熱狂熱疾中毒并惡瘡輩毒取汁服浸皂角甘蔗治天行熱疾

外臺祕要治骨蒸熱非其人莫浪傳取屎乾者燒令外黑內水中澄清每旦服一小升薄色小便服一小升以差爲度既常服新作大坑燒二升夜以水三升漬之稍稍



減服小使用童子者

斗門方治熱病及時疾心躁狂亂奔走狀
似癲癇言語不定久不得汗及時疾不知
人事者以人中黃不以多少入大罐內以
泥固濟大火煅半日去火候冷取出於地

二

六

上以盆蓋之又半日許細研如麪新汲水
調下三錢或未退再作差

姚氏方毒箭有三種交廣夷俚用焦銅作
箭鏃嶺北諸處以蛇毒螫物汁著筒中漬
箭鏃此二種纔傷皮便開膿沸爛而死若

