

傷寒論類方

吳江徐大椿靈胎編輯

桂枝湯類

桂枝湯

桂枝去皮芍藥甘草炙

生薑兩大棗十二枚擘

右五味㕮咀以水七升微火煮

魚去三年，大率適寒浪。

服升服已須臾。歡熱稀粥。

一升餘以助藥力

傳於肺。肺主皮毛。汗所從出。散粥充胃。氣火以連於肺。肺火

觀此可知傷寒不禁食矣。溫覆令一時許，遍動榮氣衛。若一服汗出病瘥停。

身熱微似有汗者益佳不可令如水流漓病不必除此解服之法也若如水流漓則後服不必盡劑若不汗後服小促其間半劑許令

三服盡。若病重者。一日一夜服。

周時觀之服一劑盡。病證猶在者更作服。若汗不出乃服至二三劑。

湯全科謂之——劑三分之——謂之——過五錢零矣。治傷寒大症分兩

兩今二錢零則一劑之藥除薑藥僅一兩六錢零一服不
過如古一服即汗不再服無汗服至二三劑總以中病為主後世易

服藥得效者反令多服無效者
疑藥誤又復易方無往不誤矣

即禁生冷粘滑肉麵五辛酒酪及臭惡等物

陽中風陽浮而陰弱，則不能篤之甘草。

陽氣浮衛氣有陽浮者熱自發風為陽邪故發散桂枝之辛以散之陰弱者汗自出之酸楚護正散故形寒者皆已矣

甘以緩之。嗚嗚惡寒，淅淅惡風，陽明乾膈，以屬少陽，蓋三焦

相近故暑有兼病但不甚耳桂枝

桂枝湯主之 太陽病頭痛發熱汗出惡風者桂枝湯主之。此誤下之症誤下而仍上衝，太陽病可去桂枝加葛根、二芍藥、二甘草、二大黃。

下之後其氣上衝者可與言
發表若不上衝則其邪已下陷

當隨宜施治論中誤治諸法詳
述此非誤治因風邪凝結於

觀日明
太陽系利用本水法反火不角者失刺風水所去其在本
太陽之要路則藥力不能流通故刺以解其結蓋邪風太甚不僅在衛

足厥而在經刺之以洩經氣風
田三呼風池二穴在顳後髮際
一陽陽丘之

太陽病。外症未解。脉浮弱者。當以汗解。宜桂枝湯。病雖過期。而陽氣未除。故刺之。刺一穴在頂上。入髮際一寸。大筋內宛。中督脈陽維之會也。刺入四分。留七日。隔日一刺。十日愈。



傷寒論類方

吳江徐大椿靈胎編輯

桂枝湯類

桂枝湯

桂枝三兩芍藥三兩甘草二兩去皮芍藥兩甘草炙

生薑兩大棗一枚

右五味㕮咀以水七升微火

煮去二芽去滓適寒

服一升服已須臾歎熱稀粥可加湯

一升餘以助藥力

傳於肺。肺主皮毛。汗所從出。歡粥充胃。氣火達於肺。上入於胃。

可知得寒不禁食矣。溫覆令一時許，動禁氣衛。若一服汗出病瘥。

遍身熱熱微似有汗者益佳不可令如水流漓病不必除此解服之法若如水流漓

三服盡若病重者一日一夜

服周時觀之服一劑盡病證猶在者更作服若汗不出乃服至二三劑

湯全科謂之一劑三分之二調過五錢零矣治傷寒大症分

謂之一服古雨今二錢零則一劑之藥除薑棗僅一兩六錢零一服即汗不再服無汗服至二三劑總以中病為主後世因不遇如此

服藥得效者反令多服無效者
疑藥誤又復易方無往不誤矣

禁生冷粘滑肉麵五辛酒酪及臭惡等物

陽中風，陽浮而陰弱，邪則不能

陽脉浮，微氣有陽浮者，熱自發。風為陽邪，故發散之。陰弱者，汗自出。芍藥能護榮，故陰弱者，汗自出。

甘以緩之，嗚嗚惡寒，淅淅惡

惡風未有不惡寒者但惡寒甚
風輕非若中寒及陰經之甚也

陽明轉似屬少陽蓋三陰

桂枝湯主之。太陽病頭痛發熱汗出惡風者。桂枝湯主之。此桂枝湯總症。

病下之後其氣上衝者可與甘

桂枝湯方用前法治。若不上衝者不可與之。此謂下之症誤下而仍上衝者也。

表者不衡則其牙巴下頭

太陽病初服桂枝湯反煩不解者先刺風池風府却與桂枝湯

則愈此非詒治困厥邪考經之以洩經氣同三呼風地二穴在頸顎後髮

風府一穴在頂上入髮際一寸大筋內宛中督脈陽維之會也刺入四分半

足少陽陽維之會針入三分留

太陽病外症未解脉浮弱者當以汗解宜桂枝湯

桂枝法
陽仍不離

而後下也

太陽病外症未解者不可下也。此禁下。下之為逆。欲解外者宜服。言雖有當下之症而外症未除亦不可下。仍宜解外。

太陽病先發汗不解而復下之。脉浮者不愈。浮為在外而反下之故令不愈。令脉浮故知在表。當須解外則愈。宜服桂枝湯。浮而下此為誤。下後仍浮則邪不因誤下而

病嘗自汗出者。此謂榮氣和營氣

以榮行脈中。衛行脈外。復發其汗。等

衛和則愈。宜桂枝湯。自汗與發汗迥別。自汗乃榮衛相離。發汗使榮衛相合。自汗傷正。病反止矣。

無他病。太陽諸症不必

時發熱。自汗出而不愈者。此衛氣不和也。先其時之時發汗則愈。宜桂枝湯主之。備而惟熟。自汗故亦

宜桂枝湯。傷寒不大便六七日。宜下。頭痛有熱者未可與承氣湯。按未可二字從金匱增入。傷寒論失此。不得以日久不便而下也。

不止。身疼痛者急當救裡。此誤下之症。邪在外而引之人陰。故便清穀。陽氣下脫可危。雖表症未除

而救裡為急。傷寒論不可下。篇云誤下寒多者便清穀。熱多者便膿血。凡病皆當先表後裡。惟下利清穀則

其小便清者知不在裡。仍在表也。裡有熱。當須發汗。若頭痛者必衄。蘊在經而血動矣。宜桂枝湯。

傷寒醫下之續得下利。清穀

桂枝湯。桂枝為驅風聖藥。提出邪風二字見

桂枝湯。桂枝本無汗法。因其脉獨浮則邪仍病。

多汗而猶惡寒則仍在太陽矣。雖陽明病而治從太陽。此節屬厥陰症。未必由誤治。此誤下寒多者便清穀。熱多者便膿血。表裏分治而序不亂。後人欲以一方治數症。必致兩誤。

救裏宜四逆湯。救表宜桂枝湯。陽明病。脉遲。汗出多微。惡寒者表未解也可發汗。宜此方。陽明本自多汗。但

人煩熱。汗出則解。又如瘡狀。復熱。日晡所發熱者。屬陽明也。之潮熱而非瘧矣。

虛浮者宜發汗。一症而治法迥別。全以脉為下之與大承氣湯。發汗宜桂枝湯。

下利腹脹滿。裏症。身疼痛。

桂枝湯。桂枝為驅風聖藥。提出邪風二字見

桂枝湯。桂枝本無汗法。因其脉獨浮則邪仍病。

先溫其裏。乃攻其表。溫裡宜四逆湯。攻表宜桂枝湯。此節屬厥陰症。未必由誤治。

吐痢止而身痛。

桂枝湯。桂枝為驅風聖藥。提出邪風二字見

桂枝湯。桂枝本無汗法。因其脉獨浮則邪仍病。

不休者。當消息和解其外。宜桂枝湯。小和之。

裏症除而表症猶在。仍宜用桂枝湯。輕其劑而加減之可也。

傷寒大下後復發汗。再心

下痞。邪入中焦。惡寒者。表未解也。不可攻痞。當先解表。表解。乃可攻痞。解表宜桂枝湯。攻痞宜大黃黃連瀉心湯。苦寒開降之法詳見後

桂枝加附子湯

二

桂枝湯原方加附子

皮破八片一枚泡去

右六味以水七升煮取三升去渣溫服一升。

太陽病發汗遂漏不止。此發汗太過如水流漓或藥不對症之故。其人惡風。中風本惡風。汗後當愈今難以屈伸。四肢為諸陽之本急難屈伸乃津脫陽虛之象但不至亡陽耳。若更甚而厥冷惡寒則有陽脫之慮當用四逆湯矣。

桂枝加桂湯

三

桂枝原方加桂二兩即另立湯名治症迥別古聖立方之嚴如此

桂枝加附子湯主之。

桂枝同附子服則能止汗回陽

桂枝原方加桂

二兩

右五味以水七升煮取三升去渣溫服一升。

燒針令其汗。針處被寒。復感新寒。核起而赤者必發奔豚氣從小腹上衝心者。灸其核上各一壯。不正則針。故與桂枝加桂湯。

重加桂不特禦寒且制腎氣又藥味重則能達下凡奔豚症此方可增減用之

桂枝去芍藥湯

四

桂枝湯原方去芍藥

五枚泡去皮破八片

右四味以水七升煮取三升溫服一升。

桂枝去芍藥加附子湯

六枚泡去皮破八片

即前方加附子

右四味以水七升煮取三升溫服一升。

桂枝去芍藥湯

五枚泡去皮破八片

即前方加附子

右四味以水七升煮取三升溫服一升。

太陽病下之後脉促胸滿者

邪仍在表中虛而表

藥方中加附子湯主之。

微惡寒者則陽亦虛矣故加附子

桂枝加厚朴杏仁湯

六枚泡去皮破八片

桂枝湯原方加厚朴

二兩

杏仁

五十

桂枝去芍藥湯

五枚泡去皮破八片

右七味以水七升微火煮取三升溫服一升覆取微似汗。

桂枝湯原方加厚朴

二兩去皮

杏仁

五十

桂枝去芍藥湯

五枚泡去皮破八片

右七味以水七升微火煮取三升溫服一升覆取微似汗。



中医图书馆版权所有

喘家作桂枝湯加厚朴杏仁佳

別錄厚朴主消痰下氣
本經杏仁主咳逆上氣

太陽病下之危喘者表未解故也此湯主之

條前

乃本然之喘此乃誤下之喘因殊而法一

小建中湯

桂枝湯原方加膠飴

一升

右六味以水七升煮去三升去滓納飴更上微火消解溫服

一升日二服

嘔家不可用建中湯以甜故也

傷寒

陽脉滯

陰脉弦

中宮之陽氣虛則木來乘土故陽滿而陰弦也

法當腹中急痛

先與小建中湯

膠飴大甘助中宮不差者據小柴胡

治太陰不愈變而治少陽所以陳

傷寒二三日

心中悸而煩者

小建中湯主之

悸而煩其為虛

中湯以補心脾之氣蓋梔子湯治

有熱之虛煩此治無熱之虛煩也

桂枝加芍藥生薑人參新加湯

八

桂枝湯原方芍藥生薑各增一兩加人參三兩

右六味

以水一斗二升煮取三升去滓溫服一升

以此發汗過多其人叉手自冒心下悸欲得按者此湯主之

發汗過多其人叉手自冒心下悸欲得按者此湯主之

發汗不誤誤在過多汗為心之液多則心氣虛

扶陽補中此乃陽虛之輕者甚而振振欲

桂枝甘草湯九

桂枝四兩甘草二兩

味厚入陰地

多煎為妙取其

發汗後身疼

表未盡

脉沉遲

氣虛已甚

此湯主之

邪未盡宜表而氣虛不能勝散藥故

用人參凡素體虛而過汗者方可用

桂枝甘草湯九

桂枝四兩甘草二兩

右二味以水三升煮取一升頓服

此以一劑

為一服者

擗地則用真武湯矣一症而輕重不同用方迥異其義精矣

茯苓桂枝甘草大棗湯十

茯苓半斤桂枝四兩

甘草二兩

大棗十二枚

右四味

以甘爛水一斗

以水二斗搗之萬通取用

按甘先

右四味以甘爛水一斗

爛水大約取其動極思靜之意

先

按甘

先

先

試读结束：需要全本请在线购买：

www.ertongbo.com

煮茯苓

凡方中專重之藥法必先煮

減二升納諸藥煮取三升去渣溫服一升日三服

太陽病得之八九日遇如瘧狀發熱惡寒熱多寒少

邪已新輕其人不嘔非少陽裏一日二三夜

發汗後其人脣下悸者欲作奔豚此湯主之心下悸是擾胸中之陽脾下悸則因發汗太過上焦乾涸腎水上救故重用茯苓以制腎水桂枝以制奔豚桂枝麻黃各半湯十一

桂枝

一兩十六錢去皮

芍藥

生薑

甘草

炙去節各一兩

大棗

四枚

杏仁

二十四枚去皮及雙仁者

右七味

水

五升先煮麻黃一二沸去上沫

欲去沫故先煮

納諸藥煮取一升八合

減去三分之一

去滓溫服六合

二云桂枝湯

三方分兩甚輕計共約六兩合今之秤僅一兩三四錢分

三服

祇服四廄零乃治邪退後至輕之劑猶勿藥也

太陽病得之八九日遇如瘧狀發熱惡寒熱多寒少
邪已新輕其人不嘔非少陽裏一日二三夜
脈微緩者不浮不沉為欲愈也

餘邪欲除而正氣亦良當靜以養之使胃氣漸充則面色反有熱色者未欲解也

以其不得小汗出身必痒宜服

微邪已在皮膚中欲自出不得故身痒以此湯取其小汗足

汗雖出而與桂枝湯如前法此所謂邪不盡行復如法者也

若形如瘧日再發者汗出必解

但此因桂枝湯意畧同

桂枝二麻黃一湯主之

此與麻黃桂枝各半湯意畧同

但此因汗出之後故桂枝畧重而麻黃畧輕

桂枝二越婢一湯

十三桂枝湯加麻桂枝湯二味

桂枝湯大汗出脉洪大者汗雖出而與桂枝湯如前法此所謂邪不盡行復如法者也

若形如瘧日再發者汗出必解

但此因桂枝湯意畧同

但此因汗出之後故桂枝畧重而麻黃畧輕

桂枝二越婢一湯

十三桂枝湯加麻桂枝湯二味

桂枝去皮

芍藥

甘草

煮麻黃一二沸去上沫納諸藥煮取二升去渣溫服一升

附越婢方

麻黃去節各十八株

大棗

生薑

大棗

生薑

石

石

右七味以水五升

桂枝去皮

芍藥

甘草

生薑

石

石

右七味以水五升

太陽病發熱惡寒熱多寒少脉微弱者此無陽也不可更汗

此無陽與亡陽不同並與他處之陽虛亦蓋其人本非壯盛而邪氣亦輕故身有寒熱而脉微弱若發其汗必至有火手冒心臍下悸等症故以此湯清陳榮衛令得似汗而解况熱多寒少無在氣分尤與石羔為宜古聖用藥之審如此按以上三方所謂一二各半之說照方詳實並不對準此亦一法但方中又各藥注明分兩則何也考存

桂枝去桂加茯苓白朮湯

十四

芍藥

三兩

甘草

二兩

生薑

二兩

桂枝

二兩

茯苓

四兩

白朮

各三

大棗

十二

右六味以水八升煮取三升去滓溫

服桂枝湯或下之仍頭頂強痛翕翕發熱無汗心下滿微痛小便不利者此湯主之

此方專於利小便也

服一升小便利則愈

宜更用桂枝心下滿則用白朮小便不利則用茯苓此症乃亡津液而有停飲者也

凡方中有加減法皆依使之藥若去其君藥則另立方名今去桂枝而仍以桂枝為名所不可解殆以此方雖去桂枝而意

仍不離乎桂枝也

桂枝去芍藥加蜀漆龍骨牡蠣救逆湯

十五

桂枝湯原方去芍藥加蜀漆

三兩洗去腥

牡蠣

五兩

龍骨

四兩

右七味以水一斗二升先煮蜀漆減二升

桂枝去芍藥煮取三升去滓溫服一升

桂枝

去腥

龍骨

四兩

右七味以水一斗二升先煮蜀漆減二升

傷寒脉浮醫以火迫切之亡陽必驚狂以火切其胸中之陽

此與少陰汗出之亡陽迥別蓋

用四逆輩回其陽於腎中今乃以火逼汙亡其陽中之陽故用安神之品鎮其陽於心中各

有至理不可易也去芍藥因陽虛不復助陰也蜀漆去心服邪積龍骨牡蠣治驚癇熱氣

桂枝甘草龍骨牡蠣湯

十六

桂枝去皮甘草二兩牡蠣熬二兩龍骨二兩

右四味以水五升煮取二升半去渣溫服八合日三服

脈浮宜以汗解此治脉浮則陰氣獨治於下故重而脾主之

火逆下之又誤因燒針煩躁者更誤治下之虛其陰燒針又益火反病從腰以下必重而癆名火逆也

桂枝甘草龍骨牡蠣湯

用蜀漆此無驚狂象故蜀漆不用其症藥大段相同此湯成無已本有麻黃非有麻黃則為葛根湯矣

桂枝加葛根湯十七

桂枝湯原方加葛根四兩桂枝芍藥各減一兩餘同

右六味以水一斗先煮葛根減一升去滓納

諸藥煮取三升去渣溫服一升覆取微似汗不須啜粥

桂枝加葛根湯主之

太陽病項背強八八反汗出惡風者

氣漸深故加葛根

桂枝加葛根湯主之

桂枝加芍藥湯十八

桂枝湯原方芍藥加一倍

右五味以水七升煮取三升溫服一升日三服

桂枝加大黃湯十九

此二方俱治太陰症而法不離乎桂枝

桂枝湯原方加大黃一兩芍藥一倍

右六味以水七升煮取三升去滓溫服一升日三服

本大陽病醫反下之

誤

因而腹滿時痛屬太陰也引邪入於太陰故桂枝加芍藥湯主之

雖見太陰症尚未

罷故仍用桂枝湯只加芍藥一倍以斂太陰之症

大實痛者此句承上文腹滿時痛言腹滿時痛不過桂枝加芍藥湯主之

太陽之症尚未

而見太陰之症大實痛則反成太陰之實邪仍用大黃引之即從太陰矣

桂枝加大黃湯主之此因誤下而禁下見症施治無

前桂枝症可加黃芩一分謂之陽旦湯夏至後可加知母半

兩石羔一兩或加升麻一分若病人素虛寒者不必加減

麻黃湯類二

麻黃湯一

易安論頤方

桂枝湯

麻黃湯



南京中醫藥大學圖書館

湯既下不可復汗。若汗出而喘，無大熱者，可與此湯。

大青龍湯

方為一方而無芍藥

三

麻黃六兩去節桂枝二兩去皮甘草炙

杏仁四十枚去皮尖生薑二兩

大棗十二枚石膏碎如雞子

大一塊

溫粉方明理論載白朮蕷本川芎白芷各等分入米粉和

勻撲之無蕷本亦得後人用牡蠣麻黃根鉛粉龍骨亦可

一服汗者停後服汗多亡陽遂虛惡風相

不得眠也

中治外治

此外治

此外治

此外治

此外治

此外治

此外治

此外治

此外治

太陽中風脉浮緊，緊為陰脉，故發熱惡寒。

汗不易出。

非惡身疼痛汗不出而煩躁者。

邪深大青龍湯主之。

右七味以水九

升

中治外治

此外治

此外治

此外治

此外治

此外治

此外治

此外治

汗出惡風者不可服，服之則厥逆筋惕肉瞤，此為逆也。

惡風乃桂枝症誤服此則汗不止而有亡陽之象

矣，立此方即垂此戒聖人之意深矣。

按此方合

桂枝症誤服此則汗不止而有亡陽之象

矣，立此方即垂此戒聖人之意深矣。

按此方合

桂枝症誤服此則汗不止而有亡陽之象

矣，立此方即垂此戒聖人之意深矣。

按此方合

桂枝症誤服此則汗不止而有亡陽之象

矣，立此方即垂此戒聖人之意深矣。

按此方合

汗出惡風者不可服，服之則厥逆筋惕肉瞤，此為逆也。

惡風乃桂枝症誤服此則汗不止而有亡陽之象

矣，立此方即垂此戒聖人之意深矣。

按此方合

桂枝症誤服此則汗不止而有亡陽之象

矣，立此方即垂此戒聖人之意深矣。

按此方合

桂枝症誤服此則汗不止而有亡陽之象

矣，立此方即垂此戒聖人之意深矣。

按此方合

桂枝症誤服此則汗不止而有亡陽之象

矣，立此方即垂此戒聖人之意深矣。

按此方合

小青龍湯

四

麻黃去節芍藥

細辛

乾薑

甘草

桂枝去皮各

五味子半斛

半夏半升

右八味以

水一斗

先煮麻黃減二升，去上沫納諸藥煮取三升去滓溫服一升。

若微利者去麻黃加芫花如雞

子大熬令赤色。

利屬下焦陰分不可更發其陽。

芫花明理論作芫花恐誤本草。

芫花以其皆有去水之功也。

若渴者去

半夏加桔梗根三兩。

本草桔梗主消渴若噎者。

噎古作餉論云寒氣相搏則為腸鳴醫乃不知而反飲冷水令

主方而誤以大青龍當之者也。

必有誤脉浮緩邪輕易散身不疼外邪已退乍有輕時病未入陰又別無少陰等症此病之最輕者何必相搏其人即鈎按內經無噎字疑即輕者逆之去麻黃加附子一枚炮本草附溫中若小便不利少腹滿去麻黃加茯苓四兩則水不在上而在下矣。

右八味以

水一斗

先煮麻黃減二升，去上沫納諸藥煮取三升去滓溫服一升。

若微利者去麻黃加芫花如雞

子大熬令赤色。

利屬下焦陰分不可更發其陽。

芫花明理論作芫花恐誤本草。

芫花以其皆有去水之功也。

若渴者去

半夏加桔梗根三兩。

本草桔梗主消渴若噎者。

噎古作餉論云寒氣相搏則為腸鳴醫乃不知而反飲冷水令

主方而誤以大青龍當之者也。

必有誤脉浮緩邪輕易散身不疼外邪已退乍有輕時病未入陰又別無少陰等症此病之最輕者何必相搏其人即鈎按內經無噎字疑即輕者逆之去麻黃加附子一枚炮本草附溫中若小便不利少腹滿去麻黃加茯苓四兩則水不在上而在下矣。

故用

茯苓無微不到

真神劑也

若喘者去麻黃加杏仁半升去皮尖

杏仁見前按此方專治水氣蓋汗為水類肺為水源邪汗未盡必停於肺胃之間病屬有形非一味發散所能除此方

傷寒表不解。發汗心下有水氣。即未出之汗。乾嘔發熱而咳或渴或利或噎或小便不利。少腹滿或喘。或渴。龍湯主之。以上皆水停心下現症其傷寒心下有水氣。欬而微喘。發熱不渴。凡水停心下則小湯治法皆在加減中也渴者此寒氣欲解也。寒飲加減中也渴者此寒氣欲解也。欲去小青龍湯主之。此倒筆法即指服湯已三字非謂欲解之後更服小青龍湯也。

麻黃附子細辛湯

五

麻黃去節細辛二兩附子泡一枚

右三味先煮麻黃減二升去上沫納諸藥煮取三升去滓溫服

細辛為少陰陽明之發熱。附子細辛為少陰溫經之藥。桂枝表裏通。一服知其效。後反覆少

少陰病始得之。反發熱脉沉者。此湯主之。少陰病三字所談者廣必從少陰諸現症細細詳審。然知為病少陰發熱否則何以知其非太陽陽明之發熱耶。猶連太陽未盡入陰猶可引之外達。不用桂枝而用麻黃者蓋桂枝表裏通之用亦能溫裏故陰經諸藥皆用之。麻黃則專於發表今欲散少陰始入之邪非麻黃不可况已有附子足以溫少陰之經矣。

麻黃附子甘草湯

六

麻黃去節細辛二兩甘草二兩附子泡一枚

右三味以水七升先煮麻黃一兩沸少煮去上沫納諸藥煮取三升

此當去滓溫服。三陰經惟少陰與太陽為裏而位最近故猶有汗

少陰病得之二三日。麻黃附子甘草湯微發汗。以二三日無裏症故微發汗也。此方較麻黃附子細辛少輕以其無裏症也。

葛根湯類

三

葛根湯一

此即桂枝湯加麻

葛根四兩

黃三兩葛根四兩

生薑切

甘草

三兩桂枝二兩

大棗十二

右七味以水一斗先煮麻

黃葛根
主藥先煮減二升去上沫納諸藥煮取三升去渣溫服一升覆取微似汗不須啜粥。已能發

餘如桂枝法將息及禁忌。

太陽病項背強几無汗惡風葛根湯主之。前桂枝加葛根湯一條其現症亦同但彼云反汗出故加麻黃也。陽明症汗出而惡熱今無汗而惡寒大熱乃陽明之証也以太陽將入陽明之經故加此藥。按葛根本草治身大合病全在下利一症上審出益風邪入胃則二下利矣。

葛根黃芩黃連湯

葛根半劑

甘草二兩

黃芩三兩

黃連三兩

渣分溫再服。

葛根半劑

甘草二兩

黃芩三兩黃連三兩

右四味以水八升先煮葛根減二升納諸藥者取二升

葛根湯原方加半夏半斤先前服法同

太陽病桂枝症桂枝症即太陽傷風之正病也醫反下之誤利遂不止邪下陷則利無止時脉促者表未解也促有數意邪猶在外但嘔者葛根加半夏湯主之因表未解故用葛根因嘔汗而利故用芩連之當未陷入三陰而見立方法各

葛根加半夏湯

三

葛根湯原方加半夏半斤先前服法同

太陽與陽明合病不下利前條因下利而知太陽陽明合病令既不下利則合病何從而利知必須從兩經本症一一對勘即不下利而亦可定為合病矣但嘔者葛根加半夏湯主之明初入之非此條乃太陽陽明合病故用葛根湯全方因其但嘔加半夏一味以止嘔隨病經故藥不宜輕去渣再煎者此方乃和解之劑再煎則藥性和合能使經氣相融不復往來出入古聖不但用藥之妙其煎法俱有精義若胸中煩而不嘔者去半夏人參

有法度

柴胡湯類四

小柴胡湯一

柴胡半劑

黃芩

人參

甘草炙

生薑

各三

半夏兩

大棗十二

半劑

右七味以水一斗二升煮

取六升去渣再煎

此又一法

取三升

溫服一升

日三服

此湯除大棗共二十八兩

分三服已為重劑

蓋少陽介於兩陽之間須兼顧三

經故藥不宜輕去渣再煎者此方乃和解之劑再煎則藥性和合能使其煎法俱有精義

若胸中煩而不嘔者去半夏人參

考矣

葛根湯

柴胡湯

不喝不必用半夏。加括薑實一枚。括薑實除胸痹此若渴者去半夏。

即能耗津液。生津合前人參則利之。

成四兩半。括薑根四兩。湯治消若腹中痛者去黃芩。若腹中痞硬去大棗。

以與能加補脾者。

牡蠣四兩。

別錄云治脇下痞熱。則留太陽微熱則

足。加桂枝三兩。

微熱則邪溫覆取微似汗愈。若欲者去人參大棗。

非宜生薑。去生薑加乾姜。

加五味子。

半升乾薑二兩。

古方治嗽。五味甘薑必同用。一以散寒邪。一以散正氣。從無單用五味治嗽之法。後

風火痰涎深入肺臟。本難致療矣。又按小柴胡與桂枝二方用處極多能深求其義則變化心生矣。

論中凡可通用之方必有加減法。

喉非宜生薑。去生薑加乾姜。

加五味子。

傷寒五六日。正當傳少陽之期。

中風往來寒熱。太陽之寒熱寒時亦然。熱時亦

飲食小便不利。或不渴。有蓄。

身有微熱。少陽未盡。或欲者。肺有

少陽所現之症。甚多柴胡湯所治。

此湯主之。

少陽所現之症。亦不一加減法。具載方末。

傷寒四五日。身熱惡風頸項強。

中

欲飲食。木邪干土。

心煩喜嘔。木氣上逆。或胸中煩而不嘔。或渴。或腹中痛。

木氣虛。或脇下痞硬。填攢或心下痞。有

氣。盡腠理開邪氣。因入與正氣相搏。結於脇下。正邪分爭。往來寒熱。休作有時。默不欲飲食。藏府相連。

其痛必下邪高痛下。故使嘔也。此條申明所以往來寒熱及不欲食下痛上嘔之故。寄

小柴胡湯主之。

中

服柴胡湯已渴者屬陽明也。以法治之。

此必先見少陽之症。故用柴胡。湯服後而渴則轉屬陽明矣。

此是太陽與太陽陽明相為出入。一陽所同。陽所獨。

手足溫而渴者。滿則雖似陽明不作陽明治矣。

詳見桂枝類中。

小柴胡湯主之。

中

脉弦法當腹中急痛。先與小建中湯不差者。與小柴胡湯主之。

此是少陽與太陽陽明相為出入。一陽所同。陽所獨。柴胡証也。

必蒸蒸而振却。發熱汗出而解。

脉法篇云。戰而汗出者。其人本虛。是以柴胡証也。

此少陽發戰發熱汗出邪。

傷寒十三日不解。過經。胸脹滿而嘔。此少陽。

中

便是不必悉具。

少陽與太陽陽明相為出入。一陽所同。陽所獨。柴胡証可據。雖有他証可兼治矣。

湯之方。他經盡同。不獨柴胡証也。

傷寒十三日不解。過經。胸脹滿而嘔。此少陽。

此是太陽與太陽陽明相為出入。一陽所同。陽所獨。柴胡症下之。而不得利。今反利者。知醫以丸藥下之。非其治也。

以湯劑利之。不應復以潮熱者。

則症仍從少陽而出。此本柴胡症下之。

則利之。是為重傷。

中

實也。先宜小柴胡湯以解外。

雖潮熱本屬少陽之後，加邪故仍以柴胡解外。

後以芒硝湯下。

傷寒五六日頭

出微惡寒。手足冷。心下滿口不欲食。

大便硬。脉細者。

此為陽微結。陽氣不能隨經而散。故鬱結不舒。

非必藥誤即違延所致。亦壞症之輕者。

有表復有理也。

以上諸症有表有裡。

脉沈亦在裡也。

脈細者。

外證無汗此為半在裡半在表也。

脉沈為裡。脉雖沈緊。

緊聚。

不得為少陰病。所以然者陰不得有汗。

要今頭汗出。故知非少陰也可與小柴胡湯。

設不了了者。得尿而解。

得湯而不了了者。以其有裏症故。

大便通。小便自可。則裏症本具。又胸脇嘗

訣今頭汗出。故知非少陰也可與小柴胡湯。

設不了了者。得尿而解。

便硬必通其大便。而除其病可愈。其

使之法即加芒硝及大柴胡等方是也。

陽明病發潮熱。大便溏。小便自可。

胸脇滿而不去者。

小柴胡湯主之。

此症因大便

滿則邪留。少陽無疑用此方和解之。

陽明病。脇下硬滿。少陽症。

不大便。可下而嘔。亦少陽症。

舌上白胎者。於陽明。

故舌胎白雖不大便。可與小柴胡湯。

上焦得通。津液得下。胃氣因和。身濶然汗出而解也。

此四句申明太陽明中風之症。有裏邪。用小柴胡。無邪則用

陽者。有兼陽明者。內中見少陽一症。即可用小柴胡。

湯必能兩顧。得效仲景所以獨重此方也。

陽明潮熱乃當

風脉弦浮大。弦屬少陽。浮

而短氣腹都滿。脹下及心痛。

此少陽症久按之氣不通。鼻乾不得汗。嗜卧。

此症又以少陰一

身面目悉黃。小便難。此二症。

又似太陰。有潮熱。耳前後腫刺之小差。外不解。病過十日。脉續浮者。

與小柴胡湯。

論中陽明篇云。陽明病不能食攻其熱。必嘔。所以然者。

胡湯。脉浮雖有裏症。

胡湯邪仍欲外出。

此為傳經。腸下硬滿。乾嘔不能食。住來寒熱。

以上皆少陽本症。

麻黃總以脉症為若。不屬一定法也。

陽明。膀胱。肺。脾。大下。汗出。佛鬱。復與之水。以發其汗。因得嘔。虛樞云真邪。

相攻氣并相逆。故不治。

即呃逆也。素問云。病深者。其聲噦。乃肺胃之氣隔絕所致。兼以腹滿。故不治。

少陽者。此為傳經。腸下硬滿。乾嘔不能食。住來寒熱。

陽本症。

以上皆少陽本症。

尚未吐下。脉沉緊者。

未

少陽已漸入裏故。不浮而沈緊則弦之邪也。

與小柴胡湯。

嘔而發熱者。小柴胡湯主之。

但發熱而非住來寒熱。則與太陽陽。

陽病十日以去。脉浮細而嗜卧者。外已解也。

設胸滿脹痛者。與小柴胡湯。

脉浮者。與麻黃湯。

黃湯解見麻

傷寒差以後。更發熱者。小柴胡主之。

之間故亦用小柴胡。復病治法明。著於此後世議論。不一皆非正治。

理。

脉浮者以汗解之。脉沉實者以下解之。復症之中更當者此二脈如果脉見浮象則邪留太陽當用汗法。之法不一醫者於麻黃桂枝及承氣大柴胡等方對症之輕重擇而用之則無不中病矣。水等方對症之輕重擇而用之則無不中病矣。

婦人中風七八日續得寒熱發作有時。謂如瘡也。水因熱結血瘀故使如瘡狀發作有時。小柴胡主之。此即下文所說水。

云婦人中風發熱惡寒經水適來此云來得之七八日熱除而脉遲身涼外邪胸脇下溼如綿物狀。瘡形之症湯劑一時難效刺期門以渴厥陰有餘之熱則尤親切而易散。

晝日明了暮則讖語如見鬼狀者此為熱入血室。血室為中焦榮氣之所聚肝藏心血榮血結滯則肝氣與心經之氣亦凝故脹滿而神昏讖語當刺期門隨其實而渴之乳下第二肋端去乳頭約四寸肝募也厥陰陰維之會刺入四分血結則為有形之症。此二條為最詳婦人傷寒此症最多前條症稍輕後二條尤重男子亦有之。

大柴胡湯

二
大黃乃少陽陽明合治之方也

柴胡半斤

半夏半斤

黃芩三兩

芍藥三兩

生薑五兩

枳實四枚

大棗十二枚

右七味以水一斗二升

煮取六升再煎取三升溫服一升日三服

此方本有大黃二兩

王叔和云若不加大黃恐不為大柴

胡也

太陽病過經十餘日反二三下之

一誤再誤

後二三日柴胡症仍在者

如寒熱嘔

先與小柴胡湯嘔

不止心下急鬱微煩者

猶有裏証為未解也

與大柴胡湯下之則愈

前雖已下非下法也

傷寒十餘日

熱結在裡

此大黃

復往來寒熱

此柴胡

與大柴胡湯

傷寒發熱汗出不解

當用柴胡湯兩解之

心中痞硬嘔吐而下痢

後者過經之後諸症

脈沈沈者內實也

沈為下解之宜大柴胡湯

漸輕而未全愈也

此湯主之

傷寒後

後者過經之後諸症

脈沈沈者內實也

沈為下解之宜大柴胡湯

在裏下解之宜大柴胡湯

水七升煮取三升去渣溫服一升

柴胡四兩黃芩一錢桂枝湯三錢此小柴胡與桂枝湯併為一

實半夏大黃方乃太陽少陽合病之方

水七升煮取三升去渣溫服一升

傷寒六七日。發熱微惡寒。支節疼煩。以上太微嘔心下支結。陽症少外症未去者。太陽症為外症。柴胡桂枝湯主之。發汗多亡陽譴語者。此亡陽之不可下。勿誤以為有燥屎輕者也。愈。(桂枝湯和榮衛。柴胡湯通津液深著。二湯合用之功效而陽亡可復矣)

柴胡加龍骨牡蠣湯

四

柴胡 龍骨 生薑

人參

茯苓 鉛丹

黃芩

牡礪

桂枝

大黃

右十二味。以水八升。煮取四升。納大黃更煮一二沸。大黃只煮一沸。取其生

柴胡 去滓溫服一升。

傷寒八九日。下之即陷胸滿。

柴胡煩驚。龍骨牡蠣小便不利。

(按譴語。大黃入裏而復出。擾三陽故現症錯雜。藥亦隨症施治)

此乃正氣虛耗已無方者也。

按此方能下肝膽之驚痰。以之治癲癇必效。

柴胡桂枝乾薑湯

五

柴胡 桂枝 乾薑 牡礪

甘草各二兩

黃芩三兩 拯萎根四兩

右七味。以水一斗二升。煮

取六升。去渣。再煎取三升。溫服一升。日三服。初服微煩。復服汗出便愈。

傷寒五六日。已發汗而復下之。

(一誤胸脇滿。再誤心下煩者。黃芩大黃同用。牡蠣微結。小便不利。渴。以上皆少陽症。蒸而振發熱汗出而解之類。

汗出。陽氣上逆。往來寒熱。

用柴

心下煩者。

牡蠣此為未解也。

柴胡桂枝乾薑湯主之。

柴胡加芒硝湯

六

柴胡半斤 芒硝分兩各不同

大黃六兩十

甘草一兩

人參

生薑各一兩

半夏銖二十

大棗四枚

芒硝二兩

右八味。以

柴胡 二兩十 黃芩

甘草一兩

人參

生薑各一兩

半夏銖二十

大棗四枚

芒硝二兩

右八味。以

水四升。煮取二升。去渣。納芒硝。更煮微沸。分溫再服。不解更作。

(不解不大便也。此藥劑之最輕者。以

今辨計之約二兩分二服。則一服止一

加芒硝。乃合用調胃承氣也。皆少陽陽明同治之方。此

加芒硝。乃合用調胃承氣也。皆少陽陽明同治之方。此

傷寒十三日不解。胸脇滿而嘔。日晡所發潮熱已而微利。此本柴胡證下之而不得利。今反利者。知醫以丸藥下之。非其治也。潮熱者實也。先宜小柴胡湯以解外。後以柴胡加芒硝湯主之。本草芒硝治後府積聚因其利而復下之。所謂通因通用之法也。潮熱而利則邪。不停結故較之大柴胡症用藥稍輕。

梔子湯類五

梔子豉湯一

梔子十四
根綿裏
四合

右二味水四升。先煮梔子得二升半。納豉煮取升半。去滓分為二服。溫進一。

服得吐止後服。

比前焦分兩最小凡治之藥皆然。

發汗吐下後諸法俱用未必皆

盡則不在經而在肺胃之間為有形之物故必吐而出之反覆顛倒心中懊憹

按

氣無不出矣。按汗吐下之後而邪未

者必反覆顛倒心中懊憹。

反覆顛倒身不得靈也。梔子豉湯吐之此非汗下之所能除者。吐之而痰涎結

心病狀何等詳切。凡醫者之於病人必事事體貼如若身受之而後用藥無誤。

梔子豉湯主之。傷寒五六日大下之後身熱不去。心中結痛者。欲未解也。

中室者。煩等象為稍寃。

古人治病非但

內外不失毫釐即上下亦不踰分寸也。

熱身重。以上皆陽明本症。

即前以火逼

結痛更甚於室矣。梔子豉湯主之。按胸中室結痛何以不用小陷胸蓋小陷胸症乃心下痛胸中在心之

為有象故不得用。渴心古人治病非但

結法否則邪尚未

可吐也。梔子豉湯主之。陽明病下之其外有熱未盡恐無物

即前以火逼

之意若下之則胃中空虛客氣動膈心中懊憹。

以前因用三法未必合度故病不解各有現症如此時則胸中有物而可用表邪

食停結但頭汗出。欲洩不洩梔子豉湯主之。下利後更煩。按之心下濡者。

濡者濕滯之象非室非痛也。為虛煩也。宜

梔子豉湯。