



卯集

外科正宗



外科正宗卷四

海甯許 楣辛木訂

明崇川陳實功著 吳江徐大椿靈胎評

海甯蔣光燾寅昉校

發背論第二十三

發背有五。一曰陽毒。先因風熱。或患熱毒消渴。或先患傷寒。餘毒蓄積於背脊膂之間。不拘椎數。但從兩夾脊起。滿背掀熱赤紫。或紅色如燄。膿毒難成。成後痛不除。數日之間。忽然平塌。味者誤謂腫消。殊不知此



是內攻肉陷不可復藥矣。此二句徐國批曰此乃始時高腫以後忽平故為險

惡若本不起發雖屬虛症反可施治二曰陰毒乃氣冷而作初如黍米

隱隱而痛直應前心頭目昏重寒熱如瘧五七日後

始覺攻腫膿毒深沈遲緩未透急宜以補氣湯藥內

托。此句徐國外以抽膿藥貼之三日服金石燒煉藥毒初

起如丹痧之狀。皦皦漸開。如湯火所傷。面色如硃心

膈煩躁多渴嗜冷。此句徐國其瘡難起起則驚人尤甚於

陰陽二毒。但根柢分明須以解金石毒湯散急治其

內方保無虞。曰曰酒食毒乃平時或飢或困飽食即

睡或多食酒食冷熱黏滑肥鮮油膩之類積於臟腑兼之不慎幃幕恣意當風脾臟氣虛不能承受乃毒發於背

徐曰此所謂膏粱之變足生大疔者也

不問椎數初起頭如小

彈子後大如拳其堅如石痛連四肢加之拘急口苦

舌乾腹急便澀十數日後頭面手足浮腫臟腑滑泄

急痛如利是其候也初腫時急用收腫發穴潰膿湯

藥內實臟腑外泄膿水治之遲緩潰腐愈甚傷骨爛

筋復感外邪而致內敗死矣五日冒山嵐瘴氣毒其

入素歷瘴鄉觸冒嵐瘴蓄諸臟腑久而不發至氣血

衰弱及斲喪虧損之時。而後發露。初起腫色青黑。形如靴皮。附筋徹骨。頑如木石。引手加深。方覺痛處。至五七日。毒氣浮淺。腫高色變青白。有如拳打之狀。寒戰似瘧。頭痛口歪。又若有風。手足厥逆。眼黑睛小。白多。此因內有邪氣相搏。急宜破清血。三五升。方有黃白膿出。然其皮猶腫痛不止。直至青白之色退盡。方愈。此宜急急追趕膿毒出外。方爲無害。否則未有不瀕於危者也。

楣案發背乃大症。而原本無總論。但有治驗各條。

列於卷二腫瘍治法之後而統名之曰癰疽治
殊爲闕略失次今取徐批瘍科選粹中發背論補
于治驗之前并載徐批而移在腦疽之後府幾以
類相從其方藥原本不別出散見於腫潰瘍諸方
及腦疽門並非專治背疽之方故仍其舊

發背治驗

一男子年五十餘背心生疽十三日矣湯水不入煩悶
不語背堅硬如負石皮色亦紫瘡勢雖重喜其根腳
交會明白毒尚結局於此未經入內須行拔法使毒

氣外發不致內攻。隨煮藥筒提拔二次去惡血碗許。
徐曰最忌出血。又脈實便閉。用內疎黃連湯及豬膽導法。
何大便通利二次。使內外毒氣皆得通泄。夜卧即安。
背重失其大半。次用托裏排膿之藥。外以桑木灸法。
腫硬漸腐。膿毒漸出。換服十全大補湯加麥冬五味。
數服腐肉自脫。飲食漸進。瘡口漸合。調理兩月餘而
愈。

一老婦年近七旬。背瘡已過半月。形勢可畏。其家已置
不治。整備後事。適余往看童稚瘡症。見而問之。咸言

待斃旦夕。余強請觀。半背皆腫瘡。雖不高。亦不內陷。以手按之。外實而內腐。老年內虛。膿毒中隔。不得外發。故也。雖飲食不進。且喜根腳兩無混雜。臟腑各無敗色。治之可生。其家堅執不信。且言籤龜命卜。俱斷必死。余歎曰。再三四日不治。內膜穿潰。此命死於無辜矣。次日。余自往。謂曰。余非相強。實見其可生。不忍聽其死耳。藥金分毫不取。愈後。任從酬謝。何如其家首肯。乃先用葱艾湯淋洗。外面俱是不腐頑肉。隨用披針利剪。取去正中二寸頑肉。放通膿管。以手輕重

之間捺淨內蓄膿血約有三碗旁觀無不失色膿血

稍盡仍換前湯洗淨用膏封貼內用回元大成湯

服徐曰膿已出可用以接補真氣後用人參養榮湯倍參木

加香附早以八味丸徐勤八仙饒相兼調理使其

脾健食進腐脫肌生此婦亦謹慎調理並未更變不

出百日瘡愈身健始信余言不謬也

監生年過五旬素有渴症體又極肥生背疽約有尺

許至十二朝後請治視其形勢微腫色淡微紅根腳

半收半散此陰陽相等之症也肥人內虛瘡勢又大

非補托瘡必難起毒必易陷誠恐緩不及事便以托裏散固其內候至十五日外用披針小小從頂放通三孔緣勢大不可過放走泄元氣致膿難成但令有路可出而已內用參耆內托散倍加人參黃耆各三錢服至二十日大膿將發日至升許早以參朮膏午用十全湯加參耆各四錢麥冬五味子各一錢徐曰用五味子不通所以毒氣收住而難愈也服至月餘肉腐通潰膿似湧泉間用聖愈湯兼之八仙醪調理保助脾胃增進飲食尚恐前藥不能勝病加熟附一錢脾健膿稠色黃而正

四十日外。瘡勢方得微退。時值仲夏。酷熱。病者生煩。

誤飲冷水二碗。瘡隨下陷。不痛無膿。身涼脈細。腹痛。

足冷。變為陰症。非辛熱不能回陽。急用十二味異功。

散。倍人參熟附各三錢。不應。徐曰用人參則寒氣不出矣。換用生。

附人參各五錢。人參五錢徐又。早晚二服。方得身溫脈起。瘡。

高復痛。又二服。膿似前流。徐曰此藥力做成之膿也。出至一月約。

有百餘碗。竟不減少。外皮紅退。亦不腐爛。徐曰此乃補毒之故。

大凡非反對之藥。原不能殺。人只是病勢更大不能愈耳。此肥人外實內虛。故皮。

不腐而內潰也。又用玉紅膏。搽於棉花片上。推入瘡。



內膏蓋之內腐漸脫漸出。又十日後出大腐一塊約

有六兩。自後腫消身便。膿少肌生。百日外方得不復

人參服過五斤外。人參五斤外徐入附子亦用十兩餘。此每

方得全安。此症設用解毒傷脾宣利等藥。徐曰原不可用何勞

說得不用辛熱峻補。豈有生理。

一鄉官年踰七旬。背瘡已經入日。形雖微腫。色淡不紅。

勢若龜形。根漫不聳。乃老年氣血衰弱之故。診其服

帶微數而有力。此根本未撥。雖老可治。隨用排膿內

托散加阜刺以潰膿。托裏服至十三日後。瘡漸高腫。



色亦漸赤但不能潰膿。此食少脾弱未能培養之故

也。又用十全大補湯數服。余曰總不膿始漸出不能

快利。乃內膜中隔不通故也。不可畏其老而致誤。

隨用拔針。徐曰當頭取開寸許。捺通膿管。膿果隨出。

以豬蹄湯洗淨膏蓋。復用照藥。每日一次。外肉亦腐

爲膿。病者形色枯槁。更用人參養榮湯倍加參耆。徐

亦托裏。腐肉將脫者。取之新肉欲生者。培之。但老年

氣血衰不能速效。又加服參朮膏。早晚二次。新肉方

生。飲食頓倍。調理七十餘日而安。



一庠生年六十餘患背疽已十日外其形堅硬色亦深

紫頭髮甚多含若螺子登長尺餘根橫半背喜其高

腫光亮發熱掀痛脈洪數有力此膏粱醇酒溼熱交

蒸之故雖重不妨隨用照藥三條相繼照畢其內今

螺子盡欲吐出即用抵腳刮去流出惡血鍾許徐曰總不

宜刮葱湯洗淨搽上腐藥用紙蓋貼周圍板腳以吸

毒散敷之收其毒氣使不開大次日仍照仍敷三日

後外肉漸腐內服托藥培助脾胃解毒為膿早服八

味丸曰以滋腎水徐曰換洗蹄湯仍將膏貼候至

不切
亂道

腐盡其深寸餘。隨用紅膏。日漸生長。但此公好飲。雖病不戒。兩月後新肉雖平。嬌嫩不能結皮。完口復將浮嫩之肉盡行翦去。以上十字徐又批曰此等法膏出於河典其人不死幸也貼數日。肉平復。糝珍珠散數次。方結皮。蓋八十日而安。

一老年人患疽半月。其瘡貫脊。徧背皆腫。上至肩膊。下至腰脅。腫若瓜形。頭計數百。其家以爲不治。余診其脈微洪而不鼓。瘡形腫掀外發。飲食知味。年雖老而根本尚有餘也。先用托裏消毒散二服。其勢稍定。外

用桑木灸法助其腐潰。根以鐵桶膏。補之更服排膿
內托散。正膿漸出。但老年氣血不充。外肉不易就腐。
視其肉色變而不腐者。用針鉤利剪。徐徐剪去。約四
寸餘長。見紅肉。便用膏塗。新肉已生。將半時。值隆冬。
其家自行開看。房中不著炭火。兼蓋護未暖。致被寒
侵。瘡色淡白。膿亦清稀。飲食減少。氣體不舒。幸其瘡
本屬陽症。隨用濃葱湯。乘暖淋洗。將紅膏烘化。搽上。
外用膏貼。以熟綿軟絹。覆疊數層。綳蓋甚密。內用神
功托裏散。早晚連進二服。次早復看。其瘡自回陽矣。

徐曰不蠻用參朮故易愈以後遵法調理百日而安。

一老人年過六旬患背疽十二日矣其形半腫半紅微

疼微熱發於背心之下腎俞之上高低平等廣闊八

寸根腳泛腫色若水噴徐曰色若水噴最爲壞症頂軟無神似腐

非腐脈浮而大重按則虛余曰此瘡易於腫潰而難

於收斂不可治也其家笑而不信復請里中老醫視

之見病者起居平和言語清利舉動如常飲食有味

以爲五善俱具安若泰山其家亦喜隨用其藥日漸

有功膿潰腫退徐曰此卽陷也腐盡肌生余謂其親族曰此