

溫熱經緯卷五

潛齋醫書五種

上海廣益書局
印行

溫熱經緯卷五

定州楊照藜素園評 海甯王士雄益壽纂

錢塘任 源殿華參 烏程汪曰楨謝誠評

方論

(二)甘草湯

甘草_{二兩}

水三升。煮取一升半。去滓溫服。七合。日二服。

王晉三曰。一藥治病。是曰奇

方。徐洄溪曰。大甘為土之正味。能制腎水。越上之火。

王樸莊曰。自靈素至漢晉宋齊諸古方。凡

云一兩者。以今之七分六釐準之。凡云一升者。以今之六勺七秒準之。

汪按唐人之方。則一兩當古方輒改定其分量而輕重甚未當也。學者審之。

雄按傷寒類要。治傷寒心悸。脈結代。聖濟總錄。治舌腫塞口。外科精

要。治一切癰疽諸發。及丹石煙火藥發。兵部手集。治懸癰。直指方。治痘瘡煩渴。及蟲毒藥毒。金匱

玉函。治小兒撮口。及小兒羸瘦。得效方。治小兒遺溺。皆以一味甘草為方。妙用良多。總不外乎養

陰。緩急。清熱。化毒也。汪按亦兼取和中利水。

(三)桔梗湯

桔梗_{二兩}

水三升。煮取一升。去滓分溫再服。柳潤安曰。腎家邪熱。循經而上。

肺不任受。遂相爭競。二三日邪熱未盛。故可以甘草瀉火而愈。若不愈。是肺竅不利。氣不宣泄也。

以桔梗開之。肺竅既通。氣遂宣泄。熱自透達矣。雄按雖以桔梗名湯。而倍用甘草。以為駕馭。後

人改稱甘桔湯是矣。但須審證而投。不可泥為通治咽痛之方也。黃錦芳醫案求真。嘗論及之。醫

者不可不知。

(三)豬膚湯

豬膚_{一斤}

雄按以豬皮去其肉。肥刮如紙。薄杭人能造。名曰肉鮮。可以充饌。

水一斗。煮取五升。去滓。加白蜜一升。白粉

五合和粉和熬香。和令相得。溫分六服。王晉三曰。腎應疏而肺主膚。腎液下泄。不能上蒸於肺。致絡燥而為咽痛者。又非甘草所能治矣。當以豬膚潤肺。腎之燥解。虛煩之熱。白粉白蜜。緩中。俾豬膚比類。而致津液從腎上入肺中。循喉嚨復從肺出。絡心注胸中。而上中下燥邪解矣。

四黃連阿膠湯

黃連

四兩

黃芩

二兩

芍藥

二兩

阿膠

三兩

雞子黃

二枚

水五升

先煮三物

取二升

去滓

內膠

烱

盡小

冷

內雞子黃

攪令相得

溫服七合

日三服

氣陰經之寒變為熱。則歸於血。陽經或有歸於血者。惟陰經之熱。則必不歸於氣。故三陰有熱。結證不用調胃。承氣小承氣。而獨用大承氣。諸下利證不已。則便膿血。是其驗也。心中煩不得卧。熱證也。至二三日以上。乃心中煩不得卧。則非始即屬熱矣。始即屬熱。心中煩不得卧者。為陰虛。陰虛則不得瀉火。今至二三日以上始見。則為陽盛。陽盛則宜瀉火。然致此陽盛。亦必其陰本虛。故阿膠為藥。雞子黃無非救陰之品。瀉火則惟恃苓連而苓止一兩。連乃四兩。此黃連之任獨冠一方。而為補劑中瀉藥矣。

五豬苓湯 豬苓去茯苓 澤瀉 滑石 阿膠各一兩 水四升。先煮四味。取二升。去滓。內阿膠。烱消。溫服七合。日二。周禹載曰。熱盛膀胱。非水能解。何者。水有止渴之功。而無祛熱之力也。故用豬苓之淡滲。與澤瀉之鹹寒。與五苓不異。而此易木以膠者。彼屬氣。此屬血也。易桂以滑石者。彼有表。而此為消熱也。然則所蓄之水。去則熱消矣。潤液之味。投則渴除矣。鄒潤安曰。松之概。挺拔勁正。楓之概。柔弱易搖。松之理粗。疏。楓之理堅。細。松之葉至冬益蒼翠。而不凋。楓之葉至冬遂鮮赤而即落。是其一柔一剛。顯然殊致。茯苓屬陽。治停蓄之水。不從陽化者。豬苓屬陰。治鼓盪之

水不從陰化者。是故仲景以豬苓名方者。其所治之證。曰少陰病。下利。數而嘔。渴。心煩不得眠者。豬苓湯主之。若五苓散。則其治有渴者。有不渴者。至茯苓入他方。所治之病。則不渴者居多。蓋渴者。水氣被陽逼迫。欲得陰和而不能也。與之豬苓。使起陰氣。以和陽化水。譬之楓葉已丹。遂能即落也。

六六承氣湯

厚朴去皮炙
八兩

枳實
枚。五

大黃酒洗芒硝合三

水

一斗。先煎二物。取五升。去滓。内大黄。

煮取二升。

去滓內硝。更上微火一二沸。溫再服。得下。餘勿服。

雄按此余夙論如此鄉氏先得我心汪按
大黃本血分之藥故知此說確不可易

⑦白虎湯。

石膏
斤一知

母六甘草兩炙二

粳米

中行曰白虎者西方之金神司秋之陰獸虎嘯谷風冷涼風酷暑消神於解熱莫如白虎石膏知

母。辛甘而寒。辛者金之味。寒者金之性。辛甘體寒。得白虎之體焉。甘草粳米。甘平而溫。甘取其緩。溫取其和。緩而且和。得白虎之用焉。飲四物之成湯。來白虎之嗥嘯。陽氣者。以天地之疾風名也。風行而虎嘯者。同氣相求也。虎嘯而風生者。同聲相應也。風生而熱解者。物理必至也。抑嘗以此合大小青龍真武而論之。四物者。四方之通神也。而以命名。蓋謂化裁此時。神妙萬世。名義兩符。實自然而然者也。方而若此。可謂至矣。然不明言其神。而神卒莫之掩者。君子慎德。此其道之所以大也。汪按。飲四物之成湯。以下數行。語多支離。牽強必宜。刪去。夫白虎湯。清熱乃甘雨。非涼風。乃附會經義。以自文其淺陋。且衍先天論。太極以欺人。實則無。關于辨診處方也。自明以來。庸醫陋習。大率如此。學者戒之。

（八）白虎加人參湯

汪按。河漢云。無汗云。二。原方加人參三兩。煮服同前法。

鄒潤安曰。傷寒脈浮。發熱無汗。其表不解者。

不可與白虎湯。

汪按。河漢云。無汗云。二。字最為白虎湯所忌。

渴欲飲水。無表證者。白虎加人參湯主之。可見白虎加人

參湯之治。重在渴也。其時時惡風。則非常惡風矣。背微惡寒。則非偏身惡寒矣。常常惡風。偏身惡寒者。謂之表證。時時惡風。背微惡寒者。表邪已經化熱。特尚未盡耳。謂之無表證可也。然熱邪充斥。津液消亡。用括蕒根生津止渴可也。何以必用人參。靈樞決氣篇。腰理發泄。出汗溱溱。是謂津。津為水。陰屬也。能外達上通。則陽矣。夫是之謂陰中之陽。人參亦陰中之陽。惟其入陰。故能補陰。惟其陰中之陽。故能入陰。使入陰中之氣。化為津。不化為火。是非括蕒根可為力矣。雄按。朱奉議云。再三汗下。熱不退者。以此湯加蒼朮一錢。如神。

（九）黃芩湯

黃芩。兩。甘草。二。芍藥。二。大棗。十二。水一斗。煮取三升。去滓。溫服。日一升。再夜一服。

黃芩。兩。甘草。二。芍藥。二。大棗。十二。水一斗。煮取三升。去滓。溫服。日一升。再夜一服。

鄒潤安曰。或問黃芩湯。治何等診。其診腹痛與否。若腹痛何以用黃芩。若腹不痛。何以用芍藥乎。

王按腹痛因乎熱者甚多謂腹曰其證身熱不惡風亦不惡熱或下利或嘔腹則不痛蓋以芍藥
痛必因寒者前人拘滯之見也
甘草大棗桂枝湯裏藥也。以不惡風故不用薑桂。黃芩甘草黃芩大棗小柴胡裏藥也。以不往來
寒熱故不用柴胡。以其常熱故不用人參。若不嘔則併不用半夏生薑。至芍藥則併不因腹痛而
用以桂枝湯證。原無腹痛也。亦不心下痞軟故不去大棗也。又厥陰篇云傷寒脈遲與黃芩湯除
其熱腹中則冷不能食。可知黃芩湯證之脈必數。黃芩所治之熱必自裏達外不治但在表分
之熱矣。然仲景用黃芩有三耦焉。氣分熱結者與柴胡為耦。血分熱結者與芍藥為耦。濕熱阻中
者與黃連為耦。以柴胡能開氣分之結不能泄氣分之熱。芍藥能開血分之結不能清迫血之熱。
黃連能治濕生之熱不能治熱生之濕。譬之解關但去其關者未平其致關之怒。關終未已也。故
黃芩協柴胡能清氣分之熱。協芍藥能泄迫血之熱。協黃連能解熱生之濕也。
按汪前入方解不遇望文生義必如

鄒氏諸條始覺有未可咀矣

黃芩加半夏生薑湯

原方加半夏半升生薑三兩煮服法同前

鄒潤安曰嘔而脈數口渴者

為火氣犯胃不宜加此

雄按章虛谷云生薑性熱儘能治寒不可泛施於諸感也。
注按傷寒一

薑者五十七則此味原非禁劑然溫暑證最宜慎用用之不當或致殺人洵漢謂雖與百十三方用亦尚有害是也古時未有炮製之法凡方用半夏無不兼用薑者矣我取製半夏之毒其所以治病者功在半夏不在薑也今所用半夏必先煎薑製可不必兼用薑矣後人不察但見古方用薑者不少遂不論何證隨手妄施其中必有誤而不自覺者戒之

半夏

梔子豉湯

梔子十四香豉四合

水四升先煮梔子得二升半內豉煮取升半去滓分為二

服溫進一服得吐止後服

徐洄溪曰此劑分兩最小凡治上焦之藥皆然按此湯加減七方既

不注定何經亦不專治何證緣由汗吐下之後正氣已虛尚有痰涎滯氣凝結上焦非汗下之所

能除雄按溫暑濕熱之証每有痰涎滯氣凝結上焦不經所云在上者因而越之則不動經氣而必在汗生下後也既非汗下可除尤忌妄投補劑正不重傷此為最便乃不易之法也古方梔子皆生用故入口即吐後人作湯以梔子炒黑不復作吐全失用梔子之意然服之於虛煩證亦有驗想其清肺除煩之性仍在也汪按欲取吐者必宜生用

十一物瓜蒂湯 瓜蒂二个

水一升煮取五合去滓屯服尤在涇曰暑之中人也陰虛而又

多火者暑即寓於火之中為汗出而煩渴宜白虎加入參以清熱生陰陽虛而多濕者暑即伏於濕之內為身熱而疼痛故暑病恆以濕為病而治濕即所以治暑瓜蒂苦寒能吐能下去身面四肢水氣水去而暑無所依將不治而自解矣此治中暑兼濕者之法也

十二災甘草湯一名復脈湯

甘草四兩生地黃一斤麥冬麻仁各半桂枝生薑各三人參阿膠各

兩大棗三十枚方中行曰地黃上不當有生字

清酒七升水八升先煮八味取三升去滓內膠烊消盡溫服一升

日三服沈亮震曰此湯為千古養陰之祖方也

鄒潤安曰地黃分數獨甲於災甘草湯者蓋地

黃之用在其脂液能榮養筋骸經脈乾者枯者皆能使之潤澤也功能復脈故又名復脈湯脈者原於腎而主於心心血枯枯則脈道立澀此傷寒論所以脈結代與心動悸並稱金匱要略又以脈結悸與汗出而渴並述至肺痿之心中溫溫液液涎唾多則陰皆將盡之脈注陽僅膏覆之殘燭惟此湯可增其殼內絡外之脂液也

十四瓜蒂散

瓜蒂熬赤小豆各一分按赤小豆乃小粒赤豆各別搗篩為散已合治之取一錢

七以香豉一合用熱湯七合煮作稀糜去滓取汁和散溫屯服之不吐者少少加得快吐為止諸亡血虛家不可與之盧子繇曰瓜象實在鬚蔓間也蒂瓜之綴蔓處也性蔓偏延未繁於本故

少延輒腐。爾雅云。其紹脰。疏云。繼本曰紹。形小曰脰。故近本之尿管常小。近末之尿管轉大也。凡實之吮抽津液。惟尿管稱最。而吮抽津液之樞。惟蒂。是以尿管具微下尖上之用。乃蒂味苦而尿管味甘。以見中樞之所以別於上下內外。誠涌泄之宣劑通劑也。

至五麻黃連軹赤小豆湯

麻黃

連軹

甘草

炙生薑

赤小豆

生梓白皮

杏仁

各二升

各一升

大棗

十二

潦水

一斗

先煮麻黃

再沸去上沫

內諸藥

煮取三升

分溫三服

半日服盡

鄒潤安曰

本經臚列連翹之功。以寒熱起。以熱結終。此條廢熱在裏句。適與連翹功用不異。郭景純爾雅注

一名連莖。莖軹聲同。字異耳。而今本傷寒論注曰。連軹即連翹根。遂以本經有名未用翹根當之

陶隱居云。方藥不用。人無識者。故唐本草去之。豈仲景書有此。六朝人皆不及見。至王海藏忽見

之耶。意亦必無之事矣。

下六梔子柏皮湯

梔子

十五

黃柏

二

甘草

一

水四升

煮取升半

去滓

分溫再服

鄒潤安曰。梔

子大黃湯。茵陳蒿湯。大黃硝石湯。梔子柏皮湯證。其標皆見於陽明。陽明者。有在經在腑之分。發

熱出汗懊懷。皆經證也。腹滿小便不利。皆腑證也。梔子大黃湯證。經多而腑少。茵陳蒿湯證。有腑

而無經。梔子柏皮湯證。有經而無腑。大黃硝石湯證。經少而腑多。雄按金鑑云。此方之甘草。當

是茵陳蒿。必傳寫之謬也。

下七茵陳蒿湯

茵陳蒿

六

梔子

十四

大黃

二

水一斗

先煮茵陳

減六升

內二味

煮取三升

去滓

分溫三服。小便當利。溺如皂角汁。狀色正赤。一宿腹減。病從小便去也。徐洄溪曰。先煮茵陳。則大

鄒潤安曰。新感之邪。為素有之熱。結成黃疸。此證已所謂茵陳矣。故傷寒金匱二書。幾若無疸

不茵陳者。然梔子柏皮湯證。有外熱而無裏熱。麻黃連軛去赤豆湯證。有裏熱而無外熱。小建中湯證。小便自利。小柴胡湯證。腹痛而嘔。小半夏湯證。小便色不變而微。桂子加黃耆湯證。脉浮。梔子大黃湯證。心中懊懣。硝石礬石散證。額上黑。日晡發熱。則內外有熱。但頭汗出。齊頸而還。腹滿。小便不利。口渴。為茵陳湯證矣。第腹滿之治在大黃。內熱之治在梔子。惟外復有熱。但頭汗出。小便不利。始為茵陳的治。其所以能治此者。以其新葉因陳幹而生。清芬可以解鬱熱。苦寒可以泄傳濕也。蓋陳幹本能降熱利水。復加以葉之如絲如縷。挺然於暑蒸濕逼之時。先草本木而生。後草木而彫。不必能發散。而清芳揚溢。氣暢不斂。則新感者。遂不得不解。自是汗出不止於頭。故曰發熱汗出。此為越熱不能發黃也。

〔干〕抵當湯

水蛭

煮去翅足

桃仁

去皮尖各三十個

大黃

酒浸

右為末

以水五升

煮取三升

去滓

溫

服一升。不下再服。

徐洄溪曰。

凡人身瘀血方阻。

尚有生氣者。

易治。

阻之久。

則無生氣。

而難治。

蓋

血既離經。

與正氣全不相屬。

投以輕藥。

則拒而不納。

藥過峻。

又能傷未敗之血。

故治之極難。

水蛭

最喜食人之血。

而性又遲緩。

善入遲則生血不傷。

善入則堅積易破。

借其力以攻積久之滯。

自有利而無害也。

雄按王肯堂云人溺蜂蜜皆制蛭毒

章虛谷曰。

經言陽絡傷。

則血外溢。

陰絡傷。

則血內溢。

外溢則

吐血。

內溢則便血。

蓋陰陽手足十二經交接。

皆由絡貫通。

接連。

細絡分布周身。

而血隨氣行。

必由

經絡流注。

表裏循環。

是故絡傷則血不能循行。

隨陰陽之部而溢出。

其傷處即瘀阻。

阻久而蓄積。

無陽氣以化之。

乃成死血矣。

故仲景用飛走蟲藥。

引桃仁專攻絡結之血。

大黃本入血分。

再用酒

浸。

使其氣浮。

隨蟲藥循行表裡。

以導死血歸腸腑而出。

豈非為至妙至當之法哉。

由是類推。

失血

浸。

使其氣浮。

隨蟲藥循行表裡。

以導死血歸腸腑而出。

豈非為至妙至當之法哉。

由是類推。

失血

浸。

使其氣浮。

隨蟲藥循行表裡。

以導死血歸腸腑而出。

豈非為至妙至當之法哉。

由是類推。

失血

浸。

使其氣浮。

隨蟲藥循行表裡。

以導死血歸腸腑而出。

豈非為至妙至當之法哉。

由是類推。

失血

浸。

使其氣浮。

隨蟲藥循行表裡。

以導死血歸腸腑而出。

豈非為至妙至當之法哉。

由是類推。

失血

浸。

使其氣浮。

隨蟲藥循行表裡。

諸證要必以化痰調經絡為主矣。余每見有初治即用呆補之法。使痰結絡閉。不能開通。終至於死。良可慨也。雄按王清任論虛勞亦主痰阻。蓋本大黃廣濟丸之義而言也。

平心文蛤散 文蛤五兩 為散以沸湯和一錢七服。湯用五合。

三十一 文蛤湯 文蛤 石膏 各五兩 麻黃 甘草 生薑 各三兩 杏仁 五十粒 大棗 十二枚 水六升。煮取二升。溫服一升。汗出即愈。鄒潤安曰。文蛤即海蛤之有文理者。吳人謂之花蛤。雄按王晉三云。若走起水。夏小正。季秋之月。雀入於海為蛤。安氏云。雀羽蟲也。羽蟲屬火。火炎上。故鳥上飛。為入海而為蛤。蓋九月火伏於戌。十月純陰。金水之令。故羽蟲感之而化也。蛤屬水。水性下。故下潛。秋冬水勝火。雀為蛤。象火之伏於水也。又離為火。為雉為蚌。雀雉之類。蛤蚌之類。外剛內柔。皆離之變化者也。因而思傷寒論。反以冷水灌之。證非火厄於水而何。金匱要略。吐後渴。欲得水之條。非火之溺於水而何。惟其火在水中而病。故以火入水中而生者治之。然厄於水者惡水。惡水則火與水未相浹也。故直以是使水中之火。仍暢茂得生而可已。溺於水者喜水。喜水則火與水漸相浹矣。故必合麻杏甘膏。加薑棗以清發之。乃能已也。

三十二 五苓散 澤瀉 六兩 豬苓 茯苓 白朮 各十八銖 方中行曰。朮上不當有白字。雄按二十四分十八銖。即桂枝半兩。為末。以白飲和服。方寸匕。日三服。服後水汗出愈。沈果之曰。中風發熱。六七日不解。而煩有表裏證。渴欲飲水。水入即吐者。名曰水逆。五苓散主之。蓋表證為太陽不足。故用桂以宣陽氣。通津液於周身。即內經水精四布。五經並行之旨。非用之以通水道下出也。裏證為三焦之氣化不宣。故用瀉朮二苓。以通三焦之閉塞。非開膀胱之溺竅也。夫下焦之氣化不

證為三焦之氣化不宣。故用瀉朮二苓。以通三焦之閉塞。非開膀胱之溺竅也。夫下焦之氣化不

宣則腹膨而小便不利。水蓄膀胱是為胞痺。此乃水蓄於膀胱之外。不能化入膀胱。故用五苓以化之。至小便不利。汗出而渴者。亦主以是方。而不渴者。茯苓甘草湯主之。蓋渴為陽氣不足。水不上升也。不升則不降。故用桂以升之。二苓澤瀉以降之。而用朮以為中樞。乃注者。莫不以渴為熱入膀胱。津液被劫所致。如果熱入而復用桂朮以溫液耗津。又加苓澤以滲之。是熱之又熱。耗之又耗。速之斃矣。且不渴者。反不用五苓。而用茯苓甘草湯。可知不渴則無須桂朮之蒸騰津液。而桂朮之非治太陽。而治三焦。更不待言矣。

三三小陷胸湯

括萸實

大者黃連兩半夏升

水六升。先煮括萸。取三升。去滓。內諸藥。煮取二升。

去滓。分溫三服。

鄒潤安曰。觀仲景之用括萸實在此湯曰。小結胸正在心下。按之則痛。在括萸

薤白白酒湯曰。喘息欬唾。胸背痛短氣。而其脈一則曰浮滑。一則曰寸口沈遲。關上下緊。數是皆陰中有陽。且踞於陽位者也。夫胸背痛。較按之方痛則甚。痺則較結為輕。欬唾喘息。是其勢為上衝。而居於心下。按之繼痛。似反靜而不動。此其機總原氣與飲相阻。寒與熱相糾。熱甚於寒者。其束縛反急。而為結寒。甚於熱者。其蔽塞自盛。而為痺。是故結胸之病。伏胸痺之病。散伏者宜開。散者宜行。故一則佐以連夏之逐飲泄熱。一則佐以薤酒之滑利通陽。括萸實之裏無形。摺聚有形。使之滑潤而下。則同。能使之下。似是治實之方。僅能使之下。不能使其必通。又非純乎治實之道矣。何以知不能使之必通。蓋有停飲痛甚。至不得卧。即當加半夏。若兼胸滿脅下逆搶心。則仍加枳朴桂枝。倘竟能通。又何必如是。是知括萸實之治。大旨在大火與痰結於陽位。不純乎虛。亦不純乎實者。皆能裏之而下。此其擅長矣。

二十三白散

桔梗

貝母各三分

巴豆一分

去皮心膜熬黑研如脂

按古人以

為末內巴豆更於

白中杵之以白飲和服強人半錢

贏者減之病在膈上必吐在膈下必利不利進熱粥一杯利過

不止進冷粥一杯

注按半錢者以銅錢取藥末僅沒錢文之半即

半錢七而有七字非若今人以五分為半錢也

鄒潤安曰寒實結胸無熱證

者治以白散散中用桔梗為疏通氣分之主

夫開導胸中之氣仲景於大承氣湯梔子厚朴等湯

莫不用枳朴此偏不用何哉蓋病有上下治有操縱結在上者宿痰停飲也故凡結胸無論熱實

寒實常用甘遂葶藶巴豆不用枳朴如大陷胸湯丸白散是也結在中下始熱與實痰氣隨熱化

則於蕩滌邪穢中流利其與邪為伍之氣大小承氣諸湯是也

況桔梗之用使氣上越而不使氣

下泄令病在至高固宜操上而縱下不使中下無過之地橫被浸陵故曰病在膈上必吐在膈下

必利也熱邪與停飲結治以括蕪而佐之者反用半夏黃連寒邪與停飲結治以巴豆而佐之者

反用桔梗貝母於寒因熱用熱因寒用之中反佐以取之可謂精義入神以致用者矣

三十四調胃承氣湯

大黃四兩清酒浸甘草二兩芒硝半升水三升先煮大黃甘草取一升去滓內芒

硝更上火微煮令沸少少溫服之徐洄溪曰芒硝善解結熱之邪大承氣用之以解已結之熱

邪此方用之以解將結之熱邪其能調胃則全賴甘草也

二十五升麻豎甲湯

升麻

當歸

甘草各二兩蜀椒炒去汗豎甲手搗大雄黃研

水四升煮取

一升頓服之老小再服取汗金匱要略陽毒用此方陰毒去雄黃蜀椒肘後千金方陽毒用升麻

湯無豎甲有桂陰毒用甘草湯即本方無雄黃活人書陽毒升麻湯用犀角射干黃芩人參無當

歸蜀椒豎甲雄黃徐洄溪曰蜀椒辛熱之品陽毒用而陰毒反去之疑誤活人書加犀角等四

歸蜀椒豎甲雄黃

徐洄溪曰

蜀椒辛熱之品

陽毒用而陰毒反去之疑誤

活人書

加犀角等四

味頗切當。

〔三〕百合知母湯

百合七枚知母三兩

先以水洗百合漬一宿。當白沫出去其水。別以泉水二升。煎

取一升去滓。別以泉水二升。煎知母取一升。後合煎一升五合。分溫再服。

王樸莊曰。百合入藥。以

野生極小者為勝。

〔四〕百合雞子黃湯

百合七枚雞子黃一枚

先煎百合。如前法。了。內雞子黃。攪勻。煎五分溫服。

〔五〕百合滑石代赭湯

百合七枚滑石三兩代赭石如彈丸大一枚

先煎百合。如前法。別泉以

水二升。前滑石代赭取一升。去滓。後合和重煎取一升五合。分溫再服。

〔六〕百合地黃湯

百合七枚生地黃汁一升

先煎百合。如前法。了。內地黃汁。煎取一升五合。分溫

再服。中病。勿更服。大便當如漆。

〔七〕百合滑石散

百合一兩滑石三兩

為散。飲方寸匕。日三服。當微利者。止服。熱則除。鄒潤安

曰。玩百合知母湯。可以見汗。則傷氣。邪搏於氣分。為消渴熱中也。玩百合雞子黃湯。可以見吐。則

傷上。邪擾於心。為煩懊不寐也。玩百合代赭湯。可以見下。則傷血。邪搏於血分。為血脈中熱也。玩百

合地黃湯。可以見不經吐下發汗。則係百脈一宗。悉致其病。無氣血上下之偏矣。所謂百脈一宗

何。平人氣象論曰。胃之大絡。名曰虛里。出於左乳下。其動應衣。為脈宗氣。是最近於心。乃著邪焉。

是以見證行臥不安。如有神靈。皆心中輾轉不適之狀。口苦小便數。身形如和。其脈微數。皆熱鬱氣

悅之徵。以此例之。本經百合主邪氣。腹滿心痛。蓋有若合符節者。而治法始終。不外百合。則以心

本不任受邪。心而竟為邪擾。則不責將之謀慮不審。即責相之治節不行。今邪阻於上。而不下行。

為肺之不主肅降。無能遁矣。故欲徵其愈期。極宜驗其小便。凡溺時必肺氣下導。小便乃出。今氣
注於頭。即欲下行。上先有故。則肺形之軒舉。不隨氣之支結。不降。亦又何疑。乃頭中之不適。復分
三等。其最甚者。至氣上注而為痛。其次則不痛。而欲漸漸然。又其次則因小便痛而快。然即此驗
其軒舉支結之淺深微甚。既瞭如指掌矣。況合之以百合地黃湯下云。大便當如漆。百合滑石散
下云。微利者止服。熱則除。則百合之利大小便。又與本經脛合矣。

〔三〕括蕞牡蠣散 括蕞根 牡蠣熬等 為細末。飲服方寸匕。日三服。鄒潤安曰。百合病至一

月不解。而變成渴。以百合湯洗之。而仍不差。則病為傷中上之陰無疑。雖然。僅曰渴。不曰欲飲。水
且不煩不熱。究竟病無駐足之所。僅渴之一端。為得所依藉耳。於此見昔之百脈一宗。悉致其病
者。今則上焦已化。而在下者尚未化也。上焦已化。百脈之病已蠲其半。百合遂無所用之。而下焦
之未化者。不得不選用牡蠣。使之召陽歸陰。而其主腦尤在治上焦之已化者。故方中配以從陽
化陰之括蕞根。兩物等分。標名則升括蕞於牡蠣之上。為一方之統攝也。

〔三〕甘草瀉心湯 甘草四兩 黃芩 人參 乾薑各三兩 半夏半升 黃連兩 大棗十二枚 傷寒 水一

斗。煮取六升。去滓。再煎取三升。溫服一升。日三。王晉三曰。甘草瀉心。非瀉結熱。因胃虛不能調

劑。上下水寒上逆。火熱不得下。降結為痞。故君以甘草大棗和胃之陰。乾薑半夏啟胃之陽。坐鎮
下焦。客氣使不上逆。仍用苓連。將已逆為痞之氣。輕輕卻之。而痞乃成。泰矣。

〔三〕赤豆當歸散 赤小豆三升浸令芽出。曝乾。當歸十分 杵為散。漿水服方寸匕。日三。汪按。赤小豆乃赤豆

紅半黑之相思子為赤小豆。醫者亦多誤用。然相思子不能出芽。即此方可微其謬。

三十四三妙散 茅山蒼木用生川黃柏炒為末。搗生薑煎沸湯調服。王晉三曰。此偶方之小制也。

蒼木生用。入陽明經。能發二陽之汗。黃柏炒黑。入太陽經。能除至陰之濕。一生一熟。相為表裏。治陰分之濕熱。有如鼓應桴之妙。

三十五生薑瀉心湯 生薑四兩 甘草炙 人參 黃芩各三兩 半夏半升 黃連 乾薑各一兩 大棗十二枚 水一

斗。煮取六升。去渣煎取三升。溫服一升。日三。徐洄溪曰。汗後而邪未盡。必有留飲在心下。其證甚雜。而方中諸藥。一一對證。內中又有一藥治兩證者。亦有二藥治一證者。錯綜變化。能攻補兼施。寒熱互用。皆本內經立方諸法。其藥性又皆與神農本草所載無處不合。學者能於此等方。講求其理。而推廣之。則標縱在我矣。

三十六半夏瀉心湯 半夏半升 黃芩 乾薑 甘草炙 人參各二兩 黃連一兩 大棗十二枚 水一斗。煮取

六升。去渣。再煎三升。溫服一升。日三。方中行曰。半夏乾薑。辛以散虛滿之痞。黃芩黃連。苦以泄心膈之熱。人參甘草。甘以益下後之虛。大棗甘溫。潤以滋脾胃之液。曰瀉心者。言滿在心膈。而不

在胃也。三十七大黃黃連瀉心湯 大黃二兩 黃連二兩 麻沸湯二升。漬之。須臾絞去滓。分溫再服。尤在涇曰。

成氏云。此導虛熱之方也。按所謂虛熱者。對燥矢而言也。蓋邪熱入裏。與糟粕相結。則為實熱。不與糟粕相結。則為虛熱。非陰虛陽虛之為。本方以大黃黃連為劑。而不用枳朴等藥者。蓋以泄虛熱。非以瀉實熱也。雄按。不但不用枳實等藥也。二味僅以麻沸湯須臾即絞。其味甚薄。乃可泄虛熱。若久漬味厚。雖無枳朴亦能下走腸胃也。汪按。尤氏解釋極精妙。夢隱更以煎法

釋之亦妙

〔三〕附子瀉心湯

大黃_{二兩}

黃連_{二兩}

黃芩_{二兩}

附子_{一枚}

以麻沸湯二升漬三味須臾絞

去渣內附子汁分溫再服

徐洄溪曰前方乃法之最奇者不取煎而取泡欲其輕揚清淡以滌

上焦之邪此法更精附子用煎三味用泡扶陽欲其熱而性重開痞欲其生而性輕也

鄒潤安曰心之為體於卦象離今被邪逼則外陽內伐內陰沸騰故半夏甘草生薑三瀉心

治陰邪未化者也大黃黃連附子二瀉心治陰邪之已化者也陰邪之已化不逼心陽則在內之

沸亂略定惟在外之邪氣尚阻則取二黃之泄熱蕩去其邪邪去正自安矣惡寒汗出者在上之

陰邪纔化在下之陰氣復逆故輕取二黃之氣以蕩熱除穢重任附子之威以追逐逆陰使之異

趨同歸相成而不相背也其未化者陽餒胸於陽位而恣肆於陰分邪盤踞於清道而潰泄於下

焦非乾薑半夏生薑之振散陰靈不足以廓清心之外郭非人參黃連之養陰泄熱不足以安擾

心之內訌也又曰余治瘧發時先嘔者用半夏瀉心吐瀉交作者用生薑瀉心胸痞下利者用

甘草瀉心皆應如桴鼓

〔三〕小承氣湯

大黃_{四兩}厚朴_{二兩}枳實_{三枚}水四升煮取一升二合去滓分溫二服初服湯當更衣

不爾者盡飲之若更衣勿服雄按於大承氣湯既去芒硝而減枳朴復以大黃同煎而緩其蕩

滌之性古人謂之和胃之劑故曰小承氣湯

〔四〕牛黃清心丸

陝西牛黃_{二錢}

鏡面硃砂_{五錢}

生黃連_{五錢}

黃芩_{二錢}

山梔_{三錢}

鬱金_{二錢}

為末蒸

餅為糊丸如黍米大每服七八丸

王晉三曰此丸古有數方其義各別若治溫邪內陷包絡神

昏者惟萬氏此方為妙蓋溫熱入於心包絡邪在裏矣草木之香僅能達表不能透裡必藉牛黃

昏者惟萬氏此方為妙蓋溫熱入於心包絡邪在裏矣草木之香僅能達表不能透裡必藉牛黃

幽香物性。乃能內透包絡。與神明相合。然尤在佐使之品。配合咸宜。萬氏用苓連山梔。以瀉心火。鬱金以通心氣。辰砂以鎮心神。合之牛黃相使之妙。是丸調入犀角。羚羊角。金汁。甘草。人中黃。連翹。薄荷等湯劑中。頗建奇功。雄按周公謹云。局方牛黃清心丸。止是前八味。至蒲黃而止。自山藥以後。二十一味。乃補虛中山芋丸。當時不知何以誤併為一。因循不曾改正。貽誤後人匪細也。凡此之類。讀書者不可不知也。一方用牛黃雄黃黃連黃芩梔子犀角鬱金硃砂各一兩。真珠五錢。冰片麝香各二錢五分。研煉蜜丸。每重一錢。金箔為衣。蠟置功。效較萬方為勝。此方較萬方太輕。錢水片麝香各二錢五分。研煉蜜丸。每重一錢。金箔為衣。蠟置功。效較萬方為勝。

四十一至寶丹

生烏犀角

生玳瑁

琥珀

鏡面硃砂

雄黃

西牛黃

龍腦

麝香

錢一安息香

一兩五錢為末酒研飛淨

一兩熟膏用水安息尤妙

金箔

銀箔各五十片

先將犀玳為細末入餘藥研勻并

將安息香膏重湯煮凝成後入諸藥中和搜成劑丸如梧子大蠟護臨服剖用人參湯化下三九

至五丸

本事方有人參南星天竺黃王晉三曰此治心臟神昏從表透裡之方也黃犀玳珀以

有靈之物內通心竅硃雄二箔以重墜之品安鎮心神佐以腦麝安息摻剔幽隱諸竅東垣云永

雄牛麝入骨髓透肌膚抱扑子言金箔雄黃合餌為地仙若與丹砂同用為聖金餌餌之可以飛

昇故熱入心包絡舌絳神昏者以此丹入寒涼湯藥中用之能祛陰起陽立展神明有非他藥所

可及徐氏云安神定魄必備之方真神丹也若病因頭痛而即神昏不語者此肝虛魂升於頂當用牡蠣救逆以降

之又非至寶丹所宜輕試

四十二涼隔散

一名連翹散子

連翹

四大黃

芒硝

甘草

黃芩

薄荷

梔子

為粗末每服

三五錢加竹葉七片水一盃半煎一碗去滓入生白蜜一匙微煎溫服與四物各半服能和營泄