

景岳全書卷之二十七必集

雜證謨

會稽 張介賓 會卿著

會稽 魯超 謙菴訂

眼目

經義 共三十一條

五臟生成篇曰諸脉者皆屬於目○肝受血而能視

五閱五使篇曰目者肝之官也○肝病者皆青

金匱真言論曰東方青色入通於肝開竅於目

邪氣臟腑病形篇曰十二經脈三百六十五絡其血氣皆上於面而走空竅其精陽氣上走於目而爲睛

大惑論曰五臟六腑之精氣皆上注於目而爲之精精之窠爲眼骨之精爲瞳子筋之精爲黑眼血之精爲絡其窠氣之精爲白眼肌肉之精爲約束裏擷筋骨血氣之精而與脈並爲系上屬於腦後出於項中故邪中於項因逢其身之虛其入深則隨眼系以入於腦入於腦則腦轉腦轉則引目系急目系急則目眩以轉矣邪其精其精所中不相比也則精散精散則視岐視岐見兩物目者五臟六腑之精也營衛魂魄之

所常營神氣之所常生也故神勞則魂魄散志意亂是故瞳子黑眼法於陰白眼赤脉法於陽也故陰陽合傳而精明也目者心使也心者神之舍也故神精亂而不轉卒然見非常處精神魂魄散不相得故曰惑也

脈度篇曰蹠脈氣不榮則目不合○肝氣通於目肝和則目能辨五色矣

寒熱病篇曰足太陽有通項入於腦者正屬目本名曰眼系頭目苦痛取之在項中兩筋間入腦乃別陰蹠陽蹠陰陽相交陽入陰陰出陽交於目銳皆陽氣盛則瞋目陰氣盛則瞑目

衛氣行篇曰平旦陰盡陽氣出於目目張則氣上行於頭夜則氣行於陰而復合於目

口問篇曰心者五臟六腑之主也目者宗脈之所聚也上液之道也口鼻者氣之門戶也故悲哀愁憂則心動心動則五臟六腑皆搖搖則宗脈感宗脈感則液道開液道開故泣涕出焉液者所以灌精濡空竅者也故上液之道開則泣涕不止則液渴液渴則精不灌精不灌則目無所見矣故命曰奪精解精微論曰夫心者五臟之專精也目者其竅也華色者其榮也是以人有德也則氣和於目有亡憂知於色是以悲哀則

泣下泣下水所由生○夫水之精爲志火之精爲神水火相
感神志俱悲是以目之水生也○厥則目無所見夫人厥則
陽氣並於上陰氣並於下陽並於上則火獨光也陰並於下
則足寒足寒則脹也夫一水不勝五火故目皆盲是以氣衝
風泣下而不止夫風之中目也陽氣內守於精是火氣燔目
故見風則泣下也有以比之夫火疾風生乃能雨此之類也
決氣篇曰氣脫者目不明

類狂篇曰狂目妄見耳妄聞善呼者少氣之所生也

藏氣法時論曰肝病者虛則目睭睭無所見耳無所聞善恐如

人將捕之取其經厥陰與少陽

熱病篇曰目中赤痛從內眡始取之陽蹻○目不明熱不已者

丸

繆刺篇曰邪客於足陽蹻之絡令人目痛從內眡始刺外踝之下半寸所各二痏左刺右右刺左如行十里頃而已

論疾診尺篇曰目赤色病在心白在肺青在肝黃在脾黑在腎黃色不可名者病在胸中○診目痛赤脈從上下者太陽病從下上者陽明病從外走內者少陽病

經筋篇曰足太陽之筋支者爲目上網○足陽明之筋上合於

太陽爲目下網○足少陽之筋支者結於目眴爲外維○足
陽明之筋引缺盆及頰卒口僻急者目不合熱則筋縱目不
開

癲狂篇曰目眴外決於面者爲銳眴在內近鼻者爲內眴上爲
外眴下爲內眴

評熱病論曰水者陰也目下亦陰也腹者至陰之所居故水在
腹者必使目下腫也

脉要精微論曰夫精明五色者氣之華也赤欲如白裏朱不欲
如赭白欲如鵝羽不欲如鹽青欲如蒼璧之澤不欲如藍黃

欲如羅裹雄黃不欲如黃土黑欲如重漆色不欲如地蒼五
色精微象見矣其壽不久也夫精明者所以視萬物別黑白
審長短以長爲短以白爲黑如是則精衰矣

五常政大論曰赫曦之紀其病瘡瘍血流狂妄目赤○陽明司
天燥氣下臨肝氣上從膽痛目赤

六元正紀大論曰少陽司天之政初之氣候乃大溫其病血溢
目赤三之氣炎暑至民病熱中喉痺目赤○少陰司天之政
民病目赤皆瘍二之氣陽氣布風乃行其病淋目寘目赤氣
鬱於上而熱三之氣大火行民病目赤○火鬱之發民病目

赤心熱甚則瞀悶懊憹善暴死○木鬱之發甚則耳鳴眩轉
目不識人

至真要大論曰少陽之勝目赤欲嘔○太陽司天面赤目黃善
噫

氣交變大論曰歲金太過燥氣流行肝木受邪民病兩脇下少
腹痛目赤痛眞瘍

師傳篇曰肝者主爲將使之候外欲知堅固視目小大○目下
果大其膽乃橫

五藏生成篇曰徇蒙招尤目冥耳聾下實上虛過在足少陽厥

陰甚則入肝○凡相五色之其脉

詳前面病門

海論曰髓海不足則腦轉耳鳴脛痠眩胃目無所見懈怠安臥風論曰風氣與陽明入胃循脈而上至目內皆其人肥則風氣不得外泄則爲熱中而目黃人瘦則外泄而寒則爲寒中而泣出○風氣循風府而上則爲腦風風入係頭則爲目風眼寒

經脈篇曰五陰氣俱絕則目系轉轉則目運目運者爲志先死

志先死則違一日半死矣

診要經終論曰太陽之脉其終也戴眼反折

詳三十七卷死生門

三部九候論曰目內陷者死○瞳子高者太陽不足戴眼者太陽已絕此決死生之要不可不察也

論證

共四條

眼目一證雖古有五輪八廓及七十二證之辨余嘗細察之似皆非切當之論徒資惑亂不足憑也以愚論之則凡病目者非火有餘則陰不足耳但辨以虛實二字可盡之矣蓋凡病紅腫赤痛及少壯暫得之病或因積熱而發者皆屬之有餘其有既無紅腫又無熱痛而但或昏或澁或眩運或無光或年及中衰或酒色過度以致羞明黑暗瞪視無力珠痛如掘

等證則無非水之不足也虛者當補實者當瀉此固其辨矣
然而實中亦有兼虛者此於腫痛中亦當察其不足虛中亦
有兼實者又於衰弱內亦當辨其有餘總之虛實殊途自有
形氣脉色可診可辨也知斯二者則目證雖多無餘義矣

一眼科有風熱之說今醫家凡見火證無論有風無風無不稱
爲風熱多從散治而不知風之爲義最當辨析夫風本陽邪
然必有外感方是真風因風生熱者風去火自息此宜散之
風也若本無外感止因內火上炎而爲癢爲痛者人亦稱爲
風熱蓋木屬肝肝主風因熱極而生風者熱去風自息此不

宜散者也如果風由外感必見頭痛鼻塞或爲寒熱或多涕
淚或筋骨痠疼而脉見緊數方可兼散如無表證而陰火熾
於上者則凡防風荆介升麻白芷細辛川芎薄荷羌活之類
皆不宜用雖曰亦有芩連梔柏自能清火然宜升者不宜降
用散者是也宜降者不宜升用清者是也若用藥不精未免
自相掣肘多致可速者反遲病輕者反重耽視日久而醫瘴
損明無所不致又孰能辨其由然哉此不可不察其陰陽升
降之道也○外有升陽散火辨在二卷中亦宜參閱

一眼目之證當察色以辨虛實經曰黃赤者多熱氣青白者少

熱氣故凡治黃赤者宜清肝瀉火治青白者宜壯腎扶陽此固不易之法也至於目黃一證尤宜辨其虛實不可謂黃者必由熱也蓋有實熱而黃者有虛寒而黃者實熱之黃如造麵者然此以濕熱內蓄鬱蒸而成熱去則黃自退非清利不可也若虛寒之黃則猶草木之凋此以元陽日剝津液消索而然其爲病也既無有餘之形氣又無煩熱之脉證惟因乾涸所以枯黃凡此類者其衰已甚使非大加溫補何以回生一切不可因其色黃槩熱爲熱而再加清利鮮不危矣

一翳瘡當分虛實大都外瘡者多由赤痛而成赤痛不已則或

爲弩肉或爲癩皰此皆有餘之證治當內清其火外磨其瘡
○若內瘡者外無雲翳而內有蒙蔽綱目謂其有翳在黑睛
內遮瞳子而然龍木論又云腦脂流下作翳者足太陽之邪
也肝風衝上作翳者足厥陰之邪也故治法以鍼言之則當
取三經之俞如天柱風府大衝通里等穴是也又聞有巧手
妙心能用金鍼於黑眼內撥去雲翳取效最捷者此雖聞之
而實未見其人也○又有所謂內瘡者察其瞳子則本無遮
隔惟其珠色青藍或微兼綠色或瞳人散大別無熟壅等證
而病目視不明或多見黑花等證此悉由腎氣不足故致瞳

子無光若有所瘴而內實無瘴也治當專補腎水氣虛者尤當兼補其氣○又有七情不節肝氣上逆或挾火邪而爲蒙昧不明若有所障者雖其外無赤痛然必睛珠脹悶或口鼻如烟此亦有餘之證氣逆者先當順氣多火者兼宜清火若氣不甚滯火不甚盛必當滋養肝血然有餘者多暴至若因循日積者多不足也又當以此辨之

論治

共六條

一火證眼目赤痛或腫或澁或羞明脹悶凡暴病而火之甚者宜抽薪飲加減主之○火之微者宜徙薪飲黃芩黃連湯之

類主之○若陰虛而火盛者宜加減一飲煎瀉自散滋陰地黃丸之類主之○若久病不已或屢發而多火者宜黃連羊肝丸明目羊肝丸或固本還睛丸之類主之

一真陰不足本無火證而但目視無光及昏黑倦視等證悉由水虧血少而然宜濟陰地黃丸左歸丸之類主之○或兼微火者宜明目地黃丸固本還睛丸之類主之○若陰中之陽虛者宜大補元煎左歸飲人參養營湯十全大補湯之類主之

一風熱腫痛之證察其果有外感方可從散宜芎辛散明目細