

傷外瘡科 未暇盡校

卷十六 火鬱門

丹溪心法 第十冊

火鬱門

脇痛七十四

丹溪心法

○脇痛肝火盛。木氣實。有死血。有痰流注。肝急木氣實。用蒼朮川芎青皮當歸之類。痛甚者肝火盛。以當歸炮薑丸姜汁下。是瀉火之要藥。死血用桃仁紅花川芎。痰流注以二陳湯加南星蒼朮川芎。肝苦急。上食辛以散之。用枳芎川芎蒼朮。血病入血藥中行血。治咳嗽脇痛。以二陳湯加南星香附青皮青黛入姜汁。脇痛有瘀血。行氣藥中加桃仁不去尖。并香附之類。有火盛者當伐肝木。左金丸治肝火。

脇痛

有氣鬱而胸脇痛者。看其脉沉澁。當作鬱治。痛而不得伸舒者。蜜丸。龍會丸最快。脇下有食積。一條扛起。用吳茱萸炒黃連。控涎丹。一身氣鬱。及脇痛痰挾死血。加桃仁泥丸服。右脇痛用推氣散。出炭氏方。左脇痛用前藥為君。加柴胡。或小柴胡湯亦可治。

八方

小龍會丸

當歸

草龍胆酒洗山梔炒

黃連炒

川芎

各半刀

大黃

煨半刀

芦荟

三糸

木香一糸

一方有黃芩柴胡各半兩無大黃木香

一方有柴胡甘草青皮無當歸梔子

右為末入射香少許。粥糊丸如菉豆大。每服五十九。姜湯下。仍以琥珀膏貼痛處。危會丸亦治有積因飲食太飽勞力行房脇痛。

當歸危會丸 治內有濕熱而脇痛。先以琥珀膏貼痛處。却以生薑汁吞此丸。痛甚者須炒令熱服。

草危胆

當壯

大校子

黃連

黃芩各一刃 大黃

芩芩半刃

木香

黃栢一刃

射香半刃

右十味為末 麴糊丸

一方加柴胡川芎各半兩。又方加

青黛半兩

蜜丸治脇痛

麴丸降肝火

抑青丸

瀉肝火

脇痛

黃連半斤

右為末蒸餅糊丸服

附諸方

推氣散 治右脇疼痛脹滿不食

只壳

桂心

片子姜黃各半刀 一本作姜蚕

甘草炙一斗半

右為末每服二斗姜棗湯調下酒亦可

枳殼散 治左脇痛刺不可忍者

只实炒

川芎各半刀粉草 炙一斗半

右為末每服二斗姜棗湯下酒亦可

鹽煎散和劑方治男婦人一切冷氣攻上胸脇刺痛不能已及

脾胃虛冷嘔吐泄膀胱小腸氣婦人血氣

縮砂仁

去殼

甘草

炙

茯苓

去皮

草果仁

去皮煨

肉豆蔻

川芎

洗

茴香

炒

葶澄茄

大麥芽

檳榔

良姜

枳殼

蒼朮

陳皮

去白

羌活

厚朴

右以咀每服三升水一盞入鹽少許煎至七分去渣空心溫服

沉香升氣丸

御藥院方

治一切氣不升降脇肋刺痛胸膈痞塞

沉香

檳榔

各二升半

人參

訶子煨去核

大腹皮

炒各半兩

白朮

紫蘇葉

香附子

炒

神麴

炒

麥蘖

烏藥各一兩

陳皮

去白

甘草

炒

姜黃各四兩

京三稜煨

脇痛

蓬莪朮煨

益智炒去殼

厚朴去皮姜製各二兩

右咬咀每服三升水一盞煎七分不拘時去渣溫服

分氣紫蘇飲 治男子婦人脾胃不和胸膈噎塞腹脇疼痛氣

促喘急

見喘類

氣

調中順氣丸按萃方治三焦滯水飲停積脇下虛滿或時刺痛者

木香

白豆蔻仁

青皮去白

陳皮

去白

三稜

炮各一兩

大腹子

半夏湯泡七次各二兩

縮砂仁

檳榔

沉香各半兩

右為末水為糊丸如梧桐子大每服三十九至五十九陳皮

湯送下

復元通氣散 和劑方 治氣不宜通或成瘡癰并閃挫腰脇氣滯

不散

方見腰痛

枳殼黃散

治悲哀傷肝氣痛引兩脇

方見氣滯

一方 治脇下疼痛如神効

小茴香

一兩炒

枳殼

五錢 麩炒

右為末 每服二錢 鹽湯調下

十棗湯 治脇痛甚効 病人氣實可用 虛人不可用

甘遂

芫花

慢火炒紫色

大戟各等分

右為末 水一大盞 棗十枚切開 煮取汁半盞 調五分 人實更
加一錢 量虛實加減

控涎丹

見痛風

脇痛

二陳湯

見痰類

左金丸

見火類

小柴胡湯

見溫熱

琥珀膏

見積聚

○或謂予曰脇痛之症多是肝火上升不得條達之故而局方鹽煎散沉香升氣散分氣紫蘇飲調中順氣丸俱是辛溫之劑但能行氣開鬱豁痰消積而已其於降火未之有也病源是火而用辛溫之藥治之則是以火濟火而痛愈甚矣予曰不然古人之方必經有驗而筆之於書豈肯妄作而誣後人哉但後人不善於用也丹溪曰脇痛肝火盛木氣實有死血有痰流注予每度之凡左脇痛甚者即是

跌仆

肝火盛木氣實也宜用龍會丸左金丸辛涼之劑以治之
凡右脇痛微者即是痰流注并食積宜用鹽煎散順氣丸
等藥辛溫之劑以治之是也又嘗論夫左脇痛胃脘痛二
証婦人多有之以其憂思忿怒之氣素蓄于中發則上衝
被濕痰死血阻滯其氣而不得條達故作痛也故治婦人
諸痛諸疾必以行氣開鬱為主而破血散火兼之庶乎得
法矣諺云香附縮砂婦人之至寶山藥從谷男子之佳珍
此之謂也

跌撲損傷七十五

庚集

丹溪心法

○跌撲損傷須用蘇木和血黃連降火白朮和中童便煎炒

在下者可先須補接後下瘀血 在上者宜飲韭汁或和粥喫
切不可飲冷水血見寒則凝但一絲血入心即死

入方

治跌撲損傷

跌撲出血者姜汁香油各四兩酒調服之

治顛傷骨折及血出者

用滑石甘草為末人參湯調服次用生姜自然汁一盞米
醋一盞獨核肥皂四個敲破按於姜汁米醋中紗片濾過
去渣入牛皮膠煎成膏藥貼之遍身者皆可

接骨散

沒藥

乳香各五兩自然銅一兩煨淬

滑石 一兩 龍骨 三錢 赤石脂 三錢

麝香 一隻另研

右爲末好醋浸沒煮多爲上乾就炒燥爲度臨睡服時入麝香抄以茶匙留舌上溫酒下分上下食前後服若骨已接尚痛去龍骨赤石脂而服多儘好極効

○世以自然銅爲接骨藥然此等方儘多大抵在補氣補血補土俗工惟在速効以罔利迎合病人之意而銅非煨不可服若新出火者其火毒金毒相扇挾香挾藥毒雖有接傷之功而燥散之禍甚於刀劍戒之

又方

冬瓜皮

阿膠 各等分

炒乾爲末以酒調飲醉爲度

附諸方

加味芎藭湯

方三因

治打撲傷損敗血流入胃脘嘔黑血如豆汁

當歸

白芍藥

芎藭

荆芥穗

百合

水浸半日等分

右吹咀每服四錢水一盞酒半同煎七分不拘時服

紫金散

楊氏家藏

治打撲傷折內損肺肝嘔血不止或有瘀血

停積於內心腹脹悶

紫金藤皮

二兩

降真香

續斷

補骨脂

無名異

煨細酒淬七次

琥珀

別研

蒲黃

牛膝

酒浸

當歸

洗焙

桃仁

去皮尖各一兩

大黃

紙裹煨

朴硝

別研一兩半

跌仆

右爲末每服二錢濃煎蘇木當歸酒調下并進三服利卽安

復元活血湯

方按粹

治從高墜下惡血留於脇下及疼痛不可忍

柴胡

五錢

花粉

當歸

各三錢

紅花

甘草

各一錢

大黃

酒浸一及

川山甲

三錢炮

桃仁

五十個酒浸研如泥

右咬咀每服一兩水

一盞酒半盞

加桃仁泥煎至八分服以

利爲度

當歸導滯散

聖惠方

治落馬隊車打撲傷瘀血大便不通浮腫痛

昏悶畜血內壅欲死

大黃

一兩

當歸

二錢半

麝香

少許

右爲末每服三錢熱酒下和劑方只大黃當歸二味等分酒

調下或以酒煎服亦可

大湯心法
鷄鳴散 治從高墜下及木石壓傷瘀血凝積痛不可忍並以

此藥推陳致新

大黃 酒蒸 桃仁 七粒去皮尖 當歸尾 五錢

右爲末酒一碗煎去渣五更鷄鳴時服取下惡血卽愈 若

氣絕不能言急以熱小便灌之卽甦

奪命散 方 治刀刃所傷及從高墜下木石壓損瘀血凝積心

腹疼痛大小便不通

大黃 黑牽牛 各二兩 紅蛭 用石灰慢火炒令乾黃色半兩

右爲末每服二錢用煎酒調下約行四五里再熱酒調牽牛

末二錢崔之須下惡血成塊以盡爲愈

已上諸方辛涼疎導瘀血之劑

○
花藥石散

和劑方

治一切金刃所傷打撲傷損身體出血者急

於傷處糝藥其血自化爲黃水如有內損血入臟腑熱煎童子小便入酒少許調一錢服之立効若牛舐腸出不損者急送入用細絲桑白皮尖茸爲線縫合肚皮縫上糝藥血止立活如无桑白皮用生麻縷亦得並不得封裹瘡口恐作膿血如瘡乾以津液潤之然後糝藥婦人產後敗血不盡惡血奔心胎死腹中胎衣不下並用童子小便調下

硫黃土色明淨者四兩搗爲粗末花藥石

一兩搗爲粗末

右二味相拌和勻先用紙筋和鹽泥固濟瓦罐子一個候泥乾入藥於內再用泥封口候乾安在四方磚石上書八卦五行字用炭一秤籠疊周圍自巳午時從下着火令漸火上徹

直至經宿火冷炭消又放經宿罐冷取出細研以細絹羅了
羅極細磁盒內盛依前法服

沒藥降聖丹

和劑方

治打撲閃肭筋斷骨折挛急疼痛不能屈

伸及榮衛虛弱外受遊風內傷經絡筋骨緩縱皮內刺痛肩
背拘急身軀倦怠四肢少力並皆治之

自然銅

火煨醋淬十二次研為末水飛

川烏頭

生去皮劑

骨碎補

煨去毛

白芍藥

沒藥

別研

乳香

別研

當歸

洗焙一錢

生乾地黄

川芎

各一錢半

右並生用為細末以生姜自然汁與蜜等分煉熟和丸每一
兩作四丸每服一丸槌碎水酒各半盞入蘘木少許同煎至
八分去蘘木熱服空心食前