

藏腑圖說症治合璧卷下

新津童慈菴先生 鑒定

蜀都茂亭氏羅定昌纂輯
西岐紹棠氏王釗參訂

十二經中。臟腑脈絡。互相連貫。其病症千變萬化。其治法亦千變萬化。原不可以言語形容。唯精於醫術者。臨症審察。不使有一毫差謬。自然病無遁情。人無死枉。蓋病機之發。無一不本於臟腑。有一臟專受其病者。有兩臟兼受其病者。有數臟併受其病者。有臟病傳之於腑者。有腑病傳之於臟者。有臟腑一時同



凡例

新津童慈菴先生

鑒定

蜀都茂亭氏羅定昌纂輯
西岐紹棠氏王釗參訂

一仲景傷寒爲萬世醫方之祖。茲輯症治要言。仍倣傷寒例。首序太陽。次序陽明。少陽。太陰。少陰厥陰。以足太陽膀胱居前。手太陽小腸居後。各經俱照此例。方中仍首列桂枝湯。所以尊仲景示不忘本也。

一仲景方下所註太陽病。即是頭痛、發熱、頸項強痛、鼻鳴、乾嘔身



痛腰痛。骨節疼痛。所註陽明病。即是胸腹脹滿。譫語潮熱。舌燥口乾。大便硬祕。所註少陽病。即是口苦。咽乾。目眩。往來寒熱。胸脇苦滿。默默不欲飲食。心煩喜嘔。頭角疼痛。所註太陰病。即是腹滿而吐。食不下。自利。時腹自痛。所註少陰病。即是上吐下利。手足逆冷。但欲寐。所註厥陰病。即是嘔逆。吐瀉。手足厥冷。消渴。氣上撞心。心中疼熱。飢不欲食。食則吐。此病情不必俱見。只要現某經病象一二樣。即是某經之病。無論外感內傷。總不能越此病情。業醫者當先熟此。

臟腑圖說症治合璧卷下

目錄

足太陽膀胱經症治

手太陽小腸經症治

足陽明胃經症治

手陽明大腸經症治

足少陽三焦經症治

手少陽膽經症治



南京中医药大学图书馆版权所有

足太陰脾經症治

手太陰肺經症治

足少陰腎經症治

手少陰心經症治

足厥陰肝經症治

手厥陰心包絡經症治



南京中医药大学图书馆版权所有

藏腑圖說症治合璧卷下

新津童慈菴先生 鑒定

蜀都茂亭氏羅定昌纂輯
西岐紹棠氏王釗參訂

十二經中。臟腑脈絡。互相連貫。其病症千變萬化。其治法亦千變萬化。原不可以言語形容。唯精於醫術者。臨症審察。不使有一毫差謬。自然病無遁情。人無死枉。蓋病機之發。無一不本於臟腑。有一臟專受其病者。有兩臟兼受其病者。有數臟併受其病者。有臟病傳之於腑者。有腑病傳之於臟者。有臟腑一時同



病者有內傷者。有外感者。有虛弱者。有因病而致虛者。有因虛而致病者。必須確審其病。果在何臟。果在何腑。有無兼病。有無併病。有無傳變之病。或由內傷或由外感或因病致虛或因虛致病。何臟何腑之病稍輕。何臟何腑之病較重。輕者可以緩治。重者必先急治。尤當察其虛實。辨其寒熱。觀其所現脈象。在於何臟何腑。應以何方藥爲主治。然後依其兼病併病。輕者重者。緩者急者。隨病加減施治。斷不可亂易古方。更不可膠執成說。或加或減。總要與病情相宜。如此斟酌。則盡善盡美矣。謹就圖

說中所列之臟腑十二經絡病機。依次分疏清楚。辨其虛實寒
熱。較其緩急輕重。附以古今治驗方藥。加減機宜。俾知醫者。溯
委窮源。可以生死人而肉白骨。卽不知醫者。對症用方。亦可以
保性命而去沈疴也。臟腑全圖內。所列十二經絡病情。雜症紛
繁。間有與本經相合者。連類附及。不能於本經之外。廣收博採。
以炫閱者眼目。恐論說支離。反使學力淺薄者。開卷茫然。棄取
無從下手。不唯有負作者苦心。轉以誤人疾病。若果能從此十
二經絡症治中。細心討究。則了然於心。况此症治中。病情之重

輕感受之寒熱脈象之虛實方藥之加減無不條分縷晰纖細畢具。不唯可以治一病。即治千病萬病亦無難也。



一近時醫者。動謂仲景經方。難於取法。不如時下醫書。近効諸方。易於記誦。便於取用。豈知時下所用近效之五苓散。腎氣丸。大柴胡。大小青龍等方。無一不出自仲景。彼所謂時方者。皆經方也。茲輯將取用仲景之方。逐一依經標出。使業醫者恍然而悟。自己日在仲景範圍之中。迷而不覺。從此精進。或可一挽頽風。有心活人者。當不以予言爲謬。

一時下醫書。載列各方。每多將前人名目刪抹。彼此抄襲。竟不知出於何人。見於何書。更有冒竊古人之方。更一名。易一藥。而卽

以爲已方者尤可鄙笑。茲輯所錄古今醫方出自某人某書。仍存其名。使用方者知其有所自來。其所不知者。仍闕疑以俟。古今醫書不下數百餘種。論脈絡者或未論及病形。論病形者或未論及脈絡。其中病象虛實。方藥加減。每多散漫無歸。茲輯先論脈絡。次論病情。後論方藥加減。寒熱虛實。辨以外顯病情。定以內診脈象。認脈認症。當補當清。均各和盤托出。雖未足以括十二經症治之全。而觸類引伸。已用之而不窮矣。

古今醫方藥味分兩。無不斟酌盡善。數百年鈔刻相沿。其中分

雨難免不無差謬。且古方今病療治又各不同。方中何藥於病爲宜。何藥於病爲忌。何藥當重。何藥當輕。何藥當加。何藥當減。總要與病情脈象相宜。諺云。醫不執方。合宜而用。並非謂某病定用某方全藥。某方藥味定要依照本方分兩。其所以照錄古方藥味分兩。不肯增損一字者。一以表古人慎重方藥之心。一以杜後世師心自用之弊。

一茲輯症治要言中。分晰病情處。用連、三點。分別脈象處。用瓜子圈。分別藥方處。用連、三圈。俾閱者易於查考。

治要言

卷八

四



南京中医药大学图书馆版权所有
1961

足太陽膀胱經

膀胱之脈。起於目內眞。上額。交顳。入腦。下項。循行肩膊。夾脊。抵腰。循脊膂絡腎。屬膀胱。其支者。從肩膊貫胛。復從腰脊下行。由膝後曲處貫脚肚。至足小指外側。至陰穴止。太陽爲諸陽之長。風寒之來。必先由太陽而入。太陽傷風之症。頭痛發熱。有汗惡寒。發熱者。發於陽也。無汗惡寒。發熱者。發於陰也。若其人頭項強痛。鼻鳴乾嘔。晝惡寒。浙漸惡風。翕翕發熱。無論有汗無汗。脈來浮緩者。傷於風也。桂枝湯主之。若其人頭痛身痛。腰痛骨節痛。發熱惡風。無

汗而喘。脈陰陽俱緊者。傷於寒也。麻黃湯主之。若發汗後而煩渴。
脈浮數者。津液爲熱所耗。非細故也。急服五苓散。若其人發熱惡
寒。身疼痛無汗。而煩躁。脈浮緊者。風寒兩傷也。大青龍湯主之。若
發汗後。其人發煩熱。目瞑而流鼻血。及未經發汗。流鼻血而脈浮
緊者。仍以麻黃湯主之。若其人無身體疼痛。又無發煩目瞑。只流
鼻血者。受寒甚輕。寒隨衄愈。不可再服麻黃湯。若其人形似傷寒。
頭痛發熱渴而不惡寒。脈來不弦緊而弱者。瘟病也。銀翹散與九
味羌活湯主之。此治太陽外感之法也。膀胱與腎相表裏。以小腸

爲嚮導膀胱熱甚則下焦壅塞小便不通膀胱寒甚則氣化不行小便遺溺膀胱熱甚溺塞者左尺之脈必洪大導赤散合四苓湯膀胱寒甚氣化不行小便遺溺者桂附地黃丸去澤泄加益智仁主之

足太陽膀胱經列方

桂枝湯仲景 治太陽中風陽浮而陰弱發熱頭痛自汗惡風惡寒

鼻鳴乾嘔及陽明病脈遲汗出多微惡寒表未解者

桂枝 芍藥 生薑三兩 甘草二兩 大棗十二枚 热服須臾啜稀

熱粥以助藥力。溫覆取微似汗。不可令如水淋漓。汗出病癥。停後服服一劑。盡病症猶在者。更作服。太陽病發汗。遂漏不止。惡風小便難。四肢微急者。加附子。若太陽症未罷。醫者誤下。表邪乘虛入裏。胸不滿而肚腹時痛者。本方減甘草一半。加芍藥一倍。若大實大痛者。依本方加大黃。若下之後。病微喘者。表仍在也。本方加厚樸。杏仁。若傷寒八九日。風濕相搏。身體痛煩。不能轉側。不嘔不渴。脈浮虛而濇者。加附子去芍藥。若汗後身痛。脈來沈遲者。本方加芍藥。生薑。