

精校
醫學正傳

上海會文堂書局發行



醫學正傳卷之七目錄

婦人科經候

論

脈法

丹溪方法 凡三十三條

固經丸

崩漏有虛有熱

加味四物止血方

崩漏因氣所使方

婦人病宜用當歸說

帶下是溼熱為病

帶下是胃中痰積

肥人帶下濕痰方

治白帶方

結痰帶下小胃丹

又治白帶方

羅先生治帶方

治帶黃荊子方

帶下必須斷厚味

四物湯為婦人眾疾總司說

一人頭風帶下方

東垣治帶主寒

調經升陽除溼湯

赤白葵花治帶說

涼血地黄湯

固真丸

酒煮當歸丸

烏藥湯

丁香膠艾湯

助陽湯

水府丹

當歸芍藥湯

黃芪當歸人參湯

柴胡調經湯

升陽舉經湯

益胃升陽湯

當歸附子湯

柴胡丁香湯

調經補真湯

延胡苦楝湯

人參補氣湯

桂附湯

黃芪白朮湯

補經固真湯

增味四物湯

溫胃補血湯

立効散

四聖散

溫經除溼湯

桃仁散

通經下取方

通經丸

膠艾湯

加減四物湯

元戎加味四物湯

香附一物方

艾附丸

地黃通經丸

益母丸

苦楝丸

丹溪活套

祖傳通經秘方

又月經不通方

祖傳血崩方

又補傳血崩方

已試醫驗一條

婦人科胎前論

附期嗣法

脈法

丹溪方法凡四條

固胎飲

安胎飲

安胎丸

又丹溪方法凡三條

懷妊嗜物說

胎動說

胎漏方

又胎漏方

又胎漏方

胎痛方

心腹諸痛方

又妊娠心腹痞痛方

心腹諸痛凡四方

川芎散

妊娠腰痛如折方

妊娠腰脚腫痛方

胎腫方



北京中醫藥大學圖書館藏

惡阻方

半夏茯苓湯

孕婦嘔吐醫按

參橘散

小膠艾湯

又膠艾湯

妊娠下血不止方

妊娠下血如月信來方

胎孕無故下血方

胎動衝心煩悶方

妊娠因舉重仆跌方

妊娠遺尿失禁方

子煩方

治子煩犀角散

治子煩當歸飲

治子煩竹瀝湯

產寶澤瀉散

張仲景方法

木通散

金生白朮散

鯉魚湯

紫蘇飲

天仙藤散

安榮散

地膚子湯

治子淋方

冬葵子散

車前散

忘憂散

葛根湯

防己湯

消風散

天門冬飲

百合散

緩息丹

八味丸

丹溪參朮飲

丹溪轉胞論

安胎散

如聖散

加味四物湯

苧根湯

桑寄生散

羚羊角散

歸涼節命散



白扁豆散

芳窮補中湯

當歸芍藥湯

芩朮香連丸

妊娠泄瀉方

芳蘇散

升麻六物湯

妊娠傷寒體痛方

傷寒安胎方

又妊娠傷寒方

催生散

妊娠咳嗽方

妊娠嗽紅痰方

小產下血不止方

小產後心腹痛方

安榮湯

兒在腹中叫哭方

又治鳴胎方

丹溪束胎丸

丹溪達生散

臨月養胎方

催生散

紅莧馬齒墮胎說

難產多是氣血虛說

難產多見於安逸說

金匱當歸散

金液丸

催生鉛丹

如神丹

如聖散

香桂散

來甦散

霹靂奪命丹

無憂散

催生奪命如神丹

芳歸湯

奪命丹

黑龍丹

胞衣不下方

枳殼散

藥石禁

飲食禁忌篇

臨產須知凡十九條

難產說

灸難產法



南京中醫藥大學圖書館藏

橫倒產方

又治橫生方

又橫逆不順方

礙產說

兒身向未順說

治盤腸產法

子死腹中方

下死胎牛膝丸

子死腹中不出方

又治子死腹中方

生子下血過多方

胞衣不下方

丹溪活套

祖傳經驗秘方

又祖傳催生驗方

祖傳治胞衣不下三退飲

婦人科_{產後}論

脈法

丹溪方法凡十六條

嚴氏清魂散

愈風湯

新產不可用芍藥

產後乳汁不通方

產後泄瀉痢方

乳母小水短少說

產婦損破尿脬

黑神散

人參當歸散

當歸黃芪湯

失笑散

三聖散

抵聖散

當歸羊肉湯

茯苓散

當歸散

黃芪湯

增損四物湯

四物一黃散

產寶黑龍丹

烏金散

調經散

正脾散

栢子仁散



琥珀散

交感地黃煎丸

七珍散

調中湯

定痛散

麻仁丸

羊肉湯

滋腸五仁丸

固經丸

熟乾地黃散

拒勝湯

八味理中丸

旋覆花湯

四神散

當歸養血丸

豬腎子飲

當歸黃芪飲

當歸散

桃仁膏

硫黃湯

乳汁不通方

漏蘆湯

鍾乳散

母豬蹄湯

丹溪活套



醫學正傳卷之七

花溪恆德老人虞搏天民編集

婦人科上月經

論

內經曰二陽之病發心脾有不得隱曲女子不月其傳為風消為息奔者死不治難經曰心出血肝納血肺出氣腎納氣蓋婦人百病皆自心生如五志之火一起則心火亦從而燔若夫經閉不通之証先因心事不足由是心血虧耗故乏血以歸肝而出納之用已竭經曰母能令子虛是以脾不磨而食亦少所謂二陽之病發心脾者此也二陽者因陽明也食少故肺金亦失所養而氣滯不行則無以滋腎陰況月經全藉腎水施化腎水既乏則經血日以乾涸以致或先或後淋瀝無時若不早治漸而至於閉塞不通甚則為癥瘕血膈勞極之証不易治也又如崩漏不止之証先因心火亢甚於是血脈泛溢以致肝實而不納血出納之道遂廢經曰子能令母實是以肝腎之相火挾心火之勢亦從而相扇所以月水錯經妄行無時而泛溢也若不早治漸而至於崩中不息甚則化為白濁白淫血枯發熱勞極之症不可治矣經曰邪氣盛則實正氣奪則虛所謂心血不足者正氣奪也心火亢甚者邪氣盛也邪氣者相火也丹溪曰天非此火不能生物人非此火不能有生但貴乎

適中凡動必聽命乎心君則無已上諸証大抵經閉不行與夫經漏不止其初皆由心
不足以致月經不調早不調治直至危篤求醫雖妙手莫能為矣東垣經閉不行有三論
崩漏不止亦有三論學者宜參究其論以治之不可拘泥也

脈法

脈經曰寸口脈微而濇微則衛氣不足濇則榮氣無餘衛不足其息短其形躁血不足
其形逆榮衛俱虛言語謬誤跌陽脈微而濇濇則胃氣虛虛則短氣咽燥而口苦胃氣
濇則失液少陰脈微而遲微則無精遲則陰中寒濇則血不來此為居經三月一來
脈微血氣俱虛年少者亡血也乳子下利為可不者此為居經三月一來

脈微弱而濇年少得此為無子中年得此為絕產

寸口脈沈而遲沈則為水遲則為寒寒水相搏跌陽脈伏水穀不化脾氣衰則驚澹胃
氣衰則身體腫少陽脈卑少陰脈細男子則小便不利婦人則經水不通經為血不
利則為水名曰水分

寸口脈沈而數數則為出沈則為入出則為陽實入則為陰結跌陽脈微而弦微則無
胃氣弦則不得息少陰脈沈而滑沈則為在裏滑則為實沈滑相搏血結胞門其藏
不瀉經絡不通名曰血分 經水前斷後病水名曰血分此病難治先病水後經斷

名曰水分此病易治

婦人帶下六極之病脈浮則為腸鳴腹滿緊則為腹中痛數則為陰中痒痛則生瘡強則陰戶掣痛

婦人帶下脈浮惡寒漏下者不治

婦人寸口脈浮而弱浮則為虛弱則為血浮則短氣弱則有熱而自汗出跌陽脈浮而濇浮則氣滿濇則有寒喜噫吞酸其氣時下小腹則寒

少陰脈滑而數者陰中生瘡

少陰脈數則氣淋陰中生瘡

少陰脈弦者白腸必挺核

少陰脈浮而動浮則為虛動則為痛婦人則脫下

婦人漏血下赤白日下血數升脈急疾者死遲者生

婦人漏下赤白不止脈小虛滑者生大緊實數者死

婦人疝瘕積聚脈弦急者生虛弱小者死

少陰脈浮而緊緊則疝瘕腹中痛半產而墮傷浮則亡血惡寒絕產

肥人脈細胞中有寒故令少子其色黃者胸上有寒



婦人月經一月再來者經來其脈欲自如常而反微不利不汗出者其經二月必來

方法

丹溪方法凡
三十三條

丹溪曰經候有枯閉不通者有不及期與過期者有妄行者有色紫黑及淡者有成塊者有作疼者夫經不通或因墮胎及多產傷血或因久患潮熱銷血或因久發盜汗耗血或因脾胃不和飲食少進而不生血或因痢疾失血治宜生血補血除熱調胃之劑隨証用之或因七情傷心心氣停結故血閉而不行宜調心氣通心經使血生而經自行矣虛中有熱月事不來以四物湯加黃芩治之

常過期者血少也以芩歸參朮兼痰藥治之

過期紫黑有塊作痛血熱也以四物湯加香附黃連治之

過期色淡挾痰者以二陳湯加芩歸治之

常不及期者血熱也以四物湯加黃芩黃連香附肥人多兼痰藥治之

血枯經閉者以四物湯加紅花桃仁治之

痰多佔住血海地位因而下多者目必漸昏肥人多有之以南星蒼朮川芎香附作丸服之

肥人軀脂滿經閉者以導痰湯加芩歸黃連不可服地黃泥膈故也如用必以薑汁炒

肥人少子亦由痰多脂膜閉塞子宮不能受精而施化也宜服上藥

瘦人子宮無血精氣不聚亦令無子以四物湯養血養陰等藥治之

經水未行臨經將來作疼者血實也一日瘀血鬱滯也以四物湯加桃仁香附黃連紅花或加玄胡索莪朮木香有熱加柴胡黃芩

經水行後而作疼者氣血俱虛也以八物湯加減煎服

夫血為氣之配因氣而行成塊者氣之凝將行而痛者氣之滯行後作痛者氣血虛也色淡者亦虛也而有水以混之也錯經妄行者氣之亂也紫者氣之熱黑則熱之甚也今人悉指為風冷而行溫熱之劑禍不旋踵

調經散治經水或前或後或多或少或踰月不至或一月兩來皆可服

川歸酒洗一錢半

麥門冬去心二錢

吳茱萸擇去閉目者沸湯泡七次焙乾半錢

人參去蘆一錢

半夏湯泡七次一錢

白芍藥一錢

川芎一錢

牡丹皮去心一錢

肉桂半錢

阿膠珠

甘草各七分半

右細切作一服水二盞加生薑三片煎至一盞空

心稍熱服

月經過期不行宜服和經湯

當歸一錢半

川芎半錢

熟地黃一錢

白芍藥一錢

桃仁三十箇去皮尖研

紅花 三分

香附米 一錢

熟桂 半錢

木通 八分

蓬莪朮 一錢

甘草 五分

蘇木 一錢

右細切作一服水一盞半煎至一盞空心溫服

月經先期而來宜服安經湯

歸身 一錢

川芎 半錢

白芍藥 八分

生地黃 一錢

阿膠 半錢

艾葉 半錢

條芩 一錢

甘草 半錢

香附 一錢

黃柏 半錢

知母 半錢

黃連 半錢

右細切作一服水煎空心服

經不通用馬鞭草杵汁熬膏為丸或燒存性為丸紅花當歸煎湯送下

固經丸治經水過多不止

黃芩

龜板

白芍藥 各一兩

樗根白皮 七錢

黃柏 炒三錢

香附 童便浸一宿焙乾二錢半

右為細末酒糊為丸如梧桐子大每服七十九白湯下

崩漏有虛有熱虛則下溜熱則流通急則治其標用白芷煎湯調下百草霜服或棕櫚

灰或狗頭骨燒存性或伍靈脂半生半炒俱以酒調服後以四物湯加乾薑調補之

緩則治其本四物湯加芩連參芪香附乾姜之類

四物湯加荊芥穗條芩止血神効
崩漏多因氣所使而下香附末一錢炒黑歸身一錢白芍藥一錢酒炒熟地黃一錢川

芩黃芪蒲黃地榆人參各半錢白朮一錢升麻三分煎服甚者加棕栲灰為末酒調服
婦人血病宜用當歸若肥白人與人參黃芪同用瘦黑人宜與生地黃香附同用
帶下是溼熱為病白屬氣赤屬血以二陳湯加蒼朮治溼為主氣虛入參朮血虛入芩
歸

帶下是胃中痰積流下滲入膀胱當升之無人知此以二陳湯加蒼白朮升麻柴胡甚
者上用吐法以提其氣下用二陳加二朮仍用瓦龍子以燥其溼痰

肥人帶下多是溼痰用海石半夏南星黃柏蒼朮川芎香附檮皮冬加乾姜瘦人少有
此病有者是熱以滑石檮皮川芎海石青黛丸服

結痰帶下以小胃丹津液嚥下數丸候積下後以補藥調治

一方治白帶

檮白皮

山茱萸

苦參

香附各五錢

龜板酥炙

枳子各二兩

黃柏一兩

乾姜

貝母各二錢半

白芍藥七錢半

右為細末酒糊為丸服

又方

白芷

四兩以石灰半斤淹三宿漉去灰以白芷炒焦為末清米飲調空心服之

又方以黃荊子一味炒焦為末米飲調服上可治心痛下可治白帶以其能燥溼痰也

羅先生治帶用十棗湯神祐丸玉燭散此法實者可用虛者不可峻攻
帶下必須斷厚味凡用藥寒月少加姜附臨機應變用之

一人上有頭風鼻涕下有白帶用南星蒼朮酒芩辛夷川芎黃柏炒焦滑石半夏牡蠣
粉丸服

四物湯乃婦人眾疾之總司也

當歸 川芎 白芍藥 熟地黃 右細切等分水煎服

東垣治崩漏帶下多主於寒學者宜再思之不可一途而論經曰陰虛陽搏謂之崩觀此
可知

東垣曰葵花白者治白帶赤者治赤帶用之果驗

東垣調經升陽除濕湯治女子漏下惡血月事不調或暴崩不止多下水漿之物皆因飲
食不節勞倦所傷或素有心氣不足致令心火乘脾必怠惰嗜臥困倦乏力氣短氣急
脾主滋榮周身者也脾胃虛而心胞乘之故漏下月水不調也況脾胃為血氣陰陽之
根蒂也當除溼去熱抑風氣上伸以勝其溼又云火鬱則發之

當歸 酒洗 獨活 各半 蔓荊子 七分 防風 炙甘草 升麻

藁本 各一錢半 柴胡 羌活 蒼朮 黃芪 各一錢半



医药大学图书馆

右細切作一服水五盞煎至一盞去粗空心溫服少時以早飯壓之可一服而愈
如灸足太陰脾經中血海穴三七壯亦已 此藥乃從權之法因風勝溼為胃氣下
陷而氣迫於下以救其血之暴崩也住後必須服黃芪人參炙甘草當歸之類數服
以補之於補氣升陽湯中加和血藥便是也若遇夏月白帶下脫漏不止宜用此湯
一服立止

涼血地黃湯治婦人血崩是腎水陰虛不能鎮守胞絡相火故血走而崩也

黃芩

荊芥穗

蔓荊子

各一分半

黃柏

知母

藁本

細辛

川芎

各二分

黃連

羌活

柴胡

升麻

防風

各三分

生地黄

當歸

各半錢

甘草

一錢

紅花

少許

右細切作一服水三大盞煎至一盞去粗空心稍熱服

東垣酒煮當歸丸治癰疽白帶下症脚氣腰以下如在水雪中居火炕以厚衣重蓋猶寒肌

肉消瘦小便與白帶長流而不禁固面白目青目眊無所見身重如山行步欹側腿
膝枯細大便閉澀心下痞悶懷食不下面垢背寒此上中下三陽俱虛脈沈緊而澀
按之空虛洪而無力尤為中寒之証乃氣血俱虛之極也

茴香

五錢

黑附子

炮

良姜

各七錢

當歸

一兩

右四味細切以好酒一升半煮至酒盡焙乾

炙甘草 苦楝 生用

丁香 各半

木香

升麻 各一

柴胡 二錢

炒黃鹽 全蝎 各三錢

玄胡索 四錢

右與前四味同研為細末酒煮麪糊為丸如梧桐子大每服五七十九空心淡醋湯送下忌油膩冷物及酒溼麪等

固真丸治白帶久下不止臍腹冷痛陰中亦痛目中溜火視物昏花齒惡熱飲但喜乾食此皆寒溼乘於胞內肝經陰火上溢故目中溜火其惡熱飲者陽明經中伏火也法當大瀉寒溼以此丸治之

黃柏 酒洗

白芍藥 各半

柴胡

白石脂 各一錢火煨水飛研

白龍骨 酒煮水飛日乾

為末 當歸 酒洗各一錢

乾姜 四錢炮

右除龍骨石脂水飛日乾另研外餘共為細末麪糊為丸如雞頭仁大日乾空心白湯下少時以早飯壓之是不令熱藥犯胃也忌生冷硬物酒溼麪

東垣烏藥湯治婦人血海疼痛

當歸 一錢

甘草

木香 各五分

烏藥 半錢

香附 二錢

右細切作一服水二盞煎至一盞食前溫服